






Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CFMAGL 1.7.290





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.  
Images reproduced by courtesy of the Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.  
CTMA01.1.7.290







1 L. 7

1. 7. 290











~~Manuscriptum~~ 2 ff 13.4

361

Questi Autori Greci tradotti dal Oratio Padovano furono del 1555.  
ristampati da esso, e riconetti, e poi ristampati più volte  
e da H. Stefano nel 1563. in foglio, e di poi ex secunda  
recognitione in lusu Ephesium A. 1555. cum Basilae 1561. in 4.  
Vide de Arysto Cappadoc quid sentiat in sua Bibliotheca Regia lib. IV.  
Jo: Albertus Fabricius a 100.

Ex libris Equitis Antonij Francisci Marmei

XV  
A R E T  
R V F. in  
CRAS

Ex legat. D. Equitis Arbitrii  
Francisci de Marmis







# ARETAEI CAPPADOCIS

MEDICI INSIGNIS AC VETVSTISSIMI

LIBRI SEPTEM

Nunc primum e tenebris eruti

A IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

*accuratissime in latinum sermonem uersi.*

## R VFFI EPHESII

MEDICI CLARISSIMI,

De corporis humani partium appellationibus

LIBRI TRES.

AB EODEM IVNIO PAVLO CRASSO

*latinitate Donati.*

Quae in omnibus his libris scitu ac memoria digna habentur,

INDEX LOCVPLETISS.

Operis calci appositus demonstrabit.



*Boat...*

*Edg...*

VENETIIS APVD IVNTAS.

M D L I I

Cum summi Pontificis Senatusq; Veneti  
Decretis ad Annos decem.

71

*Marchiz...*



AR ET ALI CAP AD OCIS

MEDICI IN SIGNIS AC VITVSTISSIMI

LIBRI SEPTIM

Nunc primum e typis trad

A IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

Academice in latine sermone

R VETI EPHEII

MEDICI CLARISSIMI

De corporis humani partium appellationibus

LIBRI TRES


AB EODEN IVNIO PAVLO CRASSO

Latine Donat

Quia omnibus his libris in ac memento digna habentur

INDEX LOCORVM

Operis calci apponitur demonstrabit



VENETIIS APUD IVNIO

M D C C I

Qua summi Pontificis S. S. Leonis XIII  
Decretis et Privilegiis



# ILLVSTRISS. PRINCIPI

ALBERTO SENIORI,

Marchioni Brandenburgensi, Prusie, Stetini, Pomerania,  
Vandalorum, Cassubiorumq; Duci, Burggraui  
Norimbergensi, ac Rugie Principi,

I V N I V S P A V L V S C R A S S V S S. P. D.



**D**ico longè omnium pulcherrima, diuinisq; operibus  
consimilia nobis à dñs fuisse concessa, veritatem  
scilicet eloqui, & mortalibus benignè facere Pytha-  
goras ille philosophorum sapientissimus assererat. Id  
ego mecum sæpe animo reputans **A L B E R T E**  
princeps Illustrissime verissimam tanti philosophi  
sententiam esse cognoui. Deus nanque cùm res omnium summa, per-  
fectissima, verissimæque sit, cuiusque veritatis fons est vberimus.  
idem cùm sit perquam beneficus & liberalis, in omnem mundum  
munera sua longè latèque diffundit: & quicquid est, à Deo vitam  
& perfectionem, quantam eius natura capere potest, adipiscitur. qua-  
propter ego Deum imitari, eiusque muneribus aliquo pacto defungi  
cupiens, vt primum per etatem licuit, veritatem docere, atque hu-  
manum genus pro virili parte iuuare constitui. Inde factum est, vt  
annos propè viginti in nostra Patauina Academia per totam Euro-  
pam celeberrima Hippocraticam medicinam publicè non infrequenti  
auditorio interpretatus fuerim. Verùm cùm ab eo docendi officio ni-  
mijs laboribus deterritus corpusculi que nostri valetudini consulens de-  
stitissem, alia ratione veritatem patefacere, humanòque generi opem  
ferre querebam. Ea verò est, aut aliqua per me vtiliter inuenta lite-  
rarum monumentis commendare, aut veterum autorum obsoleta do-  
cumenta illustrare, in hominùmque memoriam reuocare. Cùm in hac  
animi fluctuatione versarer, fortè liber quidam græcè manu scriptus,  
veterimus, & cariosus in manus meas incidit: in fronte libri nomen  
auctoris inscriptum erat Aretæi videlicet Cappadocis: de morbis age-  
bat, qui singulatim humani corporis membra corripiunt: ipsum auidè,

\* ij v



Ut mihi moris est, & ter & quater perlegi. perlectus liber cum gaudio, tum moerore animum perfudit meum. Quippe gaudis sum tam egregij autoris librum, qui vetustatis iniuria hominumque socordia in tenebris tot secula iacisset, in lucem Dei beneficio fuisse vindicatum. Indolui vero non mediocriter ipsum non sanum, non integrum, sed multis mendis inquinatum, multis magnisque vulneribus concisum & laceratum ad manus nostras delatum esse: Ceterum hæc fragmenta colligere, utque pluribus vsui forent, latina facere, ac publicare satius esse iudicavi, quam ea in totum carie, tineis, situque deleri permittere. Scriptor enim mihi plurimi faciendus visus est: nam salutaria in primis documenta proponit: auxiliaque pellendis morbis præsentanea recenset. quo quid magis expetendum mortalibus sit, nescio. quid enim cetera vitæ bona affecto languentique corpore proficiunt? præterea summopere lectorem detinet, atque delectat. nam & quatenus materię conuenit, grandiloquus est cum ampla & sententiarum gravitate, & maiestate verborum, vehemens, varius, copiosus, ad permouendos animos acerrimus, ipsa quoque vetustate venerabilis. Qua vero tempestate vixerit, apud nullum græcum latinum ne scriptorem hæterus reperire, aut certis coniecturis assequi valui. Natione Cappadox fuit, ut libri testatur inscriptio. in qua regione, licet barbara, tres tamen gentes Græcæ Dorica, Ionica, & Aeolica floruerunt. Galenus cum huiusce Aretæi nusquam meminerit, alioquin veteres medicos sæpe commemorans, nullam de eo notitiam habuisse videtur. Paulus Aegineta semel eum initio quarti sui voluminis, Aetius vero Amidenus frequentius nominavit. Sua patria lingua ionica scribit: Hippocraticamque dicendi formam, idest breuitatem cum gravitate coniunctam emulatur. Hippocrate nanque fuit ætate posterior: siquidem eum nonnunquam testem adducit: eiusque vel integros aphorismos in suis voluminibus conscripsit. Nulli sectæ addictum se Aretæus aperte demonstrat: in quibusdam enim ab Hippocrate, Galeno, Aristoteleque dissentit. De nonnullis etiam morbis propria quædam à nullis alijs tradita, rationi tamen consentanea, scituque dignissima exponit. Quam multos in eo transferendo labores tulerim: quantum temporis atque olei absumpserim, vix queam dicere, cum plurimis undique vulneribus confossus esset. ex tribus tamen collatis exemplaribus multa, quæ deficiebant, restitui: quæ erant deprauata, castigavi: quæ confusa erant, in ordinem redegi. per coniecturas etiam certissimas ab artis medicæ peritia



peritiâ desumptas, non paucos locos librariorum incuria vitiatos an-  
 tiquæ & sanæ lectioni restitui. De quibus autem ambigebam, neque  
 sinceram veritatem eruere, mihi quæ penitus satisfacere poteram, eos  
 asterisco notavi: aliorumque iudicijs pensandos castigandosque reli-  
 qui. Utque in summa dicam, quantum huic libro opis attulerim, qui  
 candida mente, & liuore purgata ipsum curiosè lectitabunt, & cum  
 græcis exemplaribus conferent, facileprehendent. Libellus præte-  
 rea quidam Ruffi Ephesi De medicinalibus appellationibus inscriptus  
 Francisci Frigimelici medici nobilissimi, & omnibus reconditis disci-  
 plinis ornatissimi opera cum ad me allatus esset, auctoris præstantia  
 atque eruditione cognita, eum quoque eadem de causa latinitate do-  
 nandum, Aretæoque adiungendum esse iudicaui. Vterque enim vetus  
 scriptor est: Vterque græca oratione artem medicam literis commen-  
 dauit. Fuit sanè Ruffus Traiani Adrianiq; Caesarum temporibus me-  
 dicus eximius Ephesi natus vrbe Ionie celeberrima, minorisque Asiæ  
 Metropoli. Hic multos de medendi facultate libros eruditissimè com-  
 posuit, magnique Galeni testimonio laudari commeruit. nam de atria-  
 bile neminem exactius luculentiusque, quàm Ruffum, differuisse com-  
 memorat. Verùm ex tot eius doctissimis libris hic vnus, quod ego sciam,  
 vix reliquus est. in quo singularium corporis partium græca vocabula  
 enumerat: nec non & earum positum, figuram, numerum, vsum, fa-  
 cultatesque declarat. Igitur hunc libellum perutilem, dignumque, qui  
 ab eruditis perlegatur, latina lingua donare, & in manus studioso-  
 rum proferre haud alienum duximus. Neque hic parum diligentia ad-  
 hibendum fuit, cum græcis vocibus latinas respondentes indagare-  
 mus: neque id in omnibus semper assequi possemus. Interdum enim lin-  
 guam nostram vocabulorum inopem (nisi forsitan hoc ignorantia no-  
 stra factum sit,) inueniebamus. At vbi nos latina deficerent, græ-  
 cis, quemadmodum & in alijs doctrinis fieri solet, pro latinis vsi su-  
 mus. Porro illud monitos lectores velim, huiusce libelli primam par-  
 tem à Ruffo bis eisdem ferè verbis fuisse conscriptam, eademque ferè  
 ad vnguem repetita. Quo id consilio fecerit, diuinare nequeo. Ego verò  
 cum ita manu scriptum librum offenderim, ita & transferre, & ade-  
 re libuit. neque enim ex toto partes hæc similes sunt: Sed nonnulla, quæ  
 in altera desunt, in altera reperiuntur: nonnulla, quæ in altera obscu-  
 rè ac breuibus perstricta sunt, in altera clarius ac fusius explicantur.  
 Hos itaque perueteres ac præstantissimos artis medicæ scriptores, ne  
 eorum



eorum, qui de humano genere bene meriti sunt; memoria prorsus evanesceret, divulgare cum mihi in animo esset, meaque commendatione apud vulgus eos minus probatum iri suspicarer, sub tuo nomine id facere optimum esse censui Illustrissime ac Sapientissime Princeps. Te vero potissimum inter Christiani nominis principes delegi, cui has lucubrationes meas dicarem, quod te constans fama & sanctissimis moribus, & vera religione insignem, bonarumque disciplinarum alumnus, & parentem celebrat. non potui igitur non te maxima veneratione atque amore prosequi: cum nihil sit in terris optimo principe dignius, nihil amabilius: nihil, si modò humana divinis conferre fas est, quod magis Deo simile dici queat. Verus enim princeps ille est, qui ut dignitatis fastigio, perinde & virtute ceteris mortalibus præstat. Qui talis autem agnoscitur, is tanquam terrestris Deus, aut saltem Dei vicem gerens inter homines, suspiciendus, ac sanctè pieque observandus est. Idcirco & antiquitus populi & civitates viros probitate vitæ excellentes ad magistratus & ad imperia prouehabant: eosque vel inuitos imperare cogebant. Ut Scylax de regibus Indiæ memoriæ commendauit. Te vero huiusmodi esse, huiusque de causis tanto imperio dignum iudicatum, Maxime atque Optime Princeps, nemo tam rerum imperitus est, qui nesciat. Ea enim in te omnia sunt, quæ in summo rege inesse debere omnis testatur antiquitas. Porro familiæ tuæ, maiorumque tuorum splendorem, ac fortia facta consultò prætereo, quando quidem Quæ nos, (ut poeta ille dicebat,) non fecimus ipsi, vix ea nostra puto. At quæ tua propria sunt, & verè regia ornamenta, ea planè digna sunt, quæ ab omnibus in cælum ferantur, ab omnibus memoriæ ac literis prodantur. Admirabilis prudentia, quam propriam regum esse virtutem Aristoteles voluit, in primis apparet. per eam enim tantam molem tuæ latissimæ ditionis tam in bello, quam in pace scientissimè gubernas ac moderaris: populisque tuis ventura incommoda longè prospiciens & cauens eos in summa tranquillitate conseruas. Iustitia præterea, quæ cuiusque regni firmissimum vallum ac munimentum est, nullo vnquam in principe, quam in te clarius enituit. nam sua cuique pro meritis tribuis: diuites potentioresque non depressis: pauperes atque humiles sustines, foves, à contumeliisque defendis. Liberalitatem autem tuam, & erga omnes, sed præcipuè literarum cultores munificentiam quis vnquam satis pro meritis laudauerit? Plurimos enim ære tuo non in Germaniæ modò verum etiam Italiæ  
gymnasus



gymnasium vberissime fouisti atque sustentasti: scholam Regiomontanam  
instituiſti: doctiſſimisque viris, qui ſtudioſam iuuentutem erudirent;  
vndique accitis exornaſti: bibliothecam quibulibet veterum ſcripto-  
rum libris reſertiſſimam proſuſiſſimis impenſis condidiſti. quam qui vi-  
derunt, cum antiqua illa Philadelphi Aegyptij bibliotheca certare con-  
tendunt. Nempe fortitudinem, quanta in te ſit, res in bello ſtrenue ac  
fortiſſime per te geſtae omnibusque vel remotiſſimis gentibus manife-  
ſtae declarant. Humanitatem & clementiam incredibilem non modo  
ſubditi, ſed & finitimae & longinquae nationes teſtantur: cum nemini  
vnuquam te adire volenti occludatur acceſſus: nemini vnuquam irrita ce-  
ciderit, modo fuerit honeſta petitio. Iure itaque Homeri poetarum principis  
carmina illa de te cani poſſunt, quibus bonus princeps paſtor populorum  
dicitur: Iuppiter deorum hominumque pater appellatur. Quid mirum  
ergo, ſi tu virtutibus adeo fulgens, in tanta fortunae amplitudine poſi-  
tus, (quae duo in eodem rara inuentu ſunt,) me ad te amandum, & quo-  
quo modo poſſem, colendum illexiſti, vel potius attraxiſti? Ac non ve-  
reor, ne flagitiſa quadam aſſentatione aucupari tuam gratiam videar:  
neque enim tu iſ es, qui ſis neſcius eos magis, qui te non admirentur, in-  
uidos, quam eos, qui laudent, aſſentatores eſſe iudicandos. Nam quae  
de te haecenus praedicauimus, neque mea commenta ſunt, neque ſolus at-  
teſtor: ſed haec paſſim Germani, Sarmatae, Itali homines, neque vulgaris  
notae, ſed grauiſſimi quique viri vno ore fatentur, ac celebrant. Hiſce  
ego rebus impuſus, ſed tua potiſſimum lenitate manſuetudineque fre-  
tus benigniſſime Princeps hoſtibi dedicaui libellos, non me latet, quam  
ignobile, quam ſordidum munuſculum: At me legiſſe memini Arta-  
xerxi Perſarum regi cognomento Memori agreſtem quendam hau-  
ſtam e proximo flumine aquam caua manu obtuliſſe: neque ab eo re-  
iectum, ſed comiter acceptum & phiala aurea, ſtola perſica, multisque  
daricis donatum abiſſe. Dices forte, quid principi cum medicorum li-  
bris? multa & praecelara priſcorum regum exempla adduci poſſunt,  
Attaliregis minoris Aſiae, Gentij Illyriorum, Iuba Mauritaniae, Mi-  
thridatis regum barbarorum maximi. Hi omnes medicinae ſcientiam  
adamarunt, diligenterque coluerunt: Quod niſi iam plus equo vaga-  
tus eſſem, tibi valentiſſimis argumentis oſtenderem, principi viro ni-  
hil medicina charius, nihil iucundius, nihil fructuoſius in vita accide-  
re poſſe. Itaque ne tuas aures grauiſſimis in adminiſtranda republica  
negociis occupatas diutius inani loquacitate fatigem, finem faciam, ſi

haec



hæc pauca ad iecero, me in his Vertendis autoribus fidelẽm, quàm ele-  
gantem atque disertum esse maluisse. cum in arte medica res specten-  
tur, non verba pendentur. Sterilis quoque materia est morborum na-  
tura & curatio: neque magnæ, (in alieno præsertim libro) facundiæ  
capax: quæ alioquin nobis tenuissima est. Sed iam aliud opus, quod deus  
fortunet, sanè quàm pulchrius meo iudicio, longèquẽ vtilius amicis no-  
stris hortantibus, ac propè impellentibus aggressi sumus: Vbi non alieni  
scriptoris sententijs adstringemur, sed proprijs viribus nitentes spatia-  
bimur. latius excurret oratio, amana interdum quæret diuerticula: ca-  
sus mirabiles, euentus varios, aliaque incunda dictu, ac legentibus  
non minus frugifera, quàm blanda narrabimus. Interim hos libellos no-  
stri erga te animi veluti arrabonem qualemcunque mittimus, grandio-  
rem librum, & magis operosum, si hos non respueris, missu-  
ri posterius. Vale.



# ARETAEI CAPPADOCIS

## MEDICI INSIGNIS

### DE CAUSIS ET SIGNIS ACUTORVM MORBORVM

Liber Primus sine principio,

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Hæc sunt integri Libri Capita. Ex quibus  
prima quatuor perierunt.

De Phrenitide. Cap. I.

De Lethargo, seu Veterno. Cap. II.

De Tabe. Cap. III.

De Apoplexia. Cap. IIII.

De Accessione morbi comitialis. Cap. V.

De Tetano seu Rigore. Cap. VI.

De Angina. Cap. VII.

De Affectibus columellæ. Cap. VIII.

De Tonfillarum ulceribus. Cap. IX.

De Pleuritide. Cap. X.

De causis & signis accessiōis morbi comitialis, Cap. V,  
sine principio.

hebetudines, vertigines, tendonum grauitates, venarum colli reple-  
tiones & distentiones. nausea frequentius quidem à cibis; non mini-  
mè tamen & ab inedia pusilla quædā nausea sequitur: & vberior pitui-  
tæ fit vomitus. paucis assumptis cibis fastidiunt, & crudi sunt. flatibus  
replentur: præcordia elata habet. Hæc sanè perpetuò comitantur. Cum  
vero accessio appropinquat, splédores quidam purpurei, aut nigri, aut  
omnes vnà permixti ob oculos in orbem versantur, ac discunt: vt in  
cælo Iris prætenta esse videatur. foedum odorem sentiunt: aures sonāt,  
iracundi fiunt: bilis præter rationem acceditur. Quidam igitur leui de  
causa, vtpotè ob animi angorem, ceciderunt: aliqui intentè fluminis de-  
cursum, aut rotā, quæ circuuoluitur, aut turbinem, qui in orbem agi-  
tur, conspicati: alios autem rerum graueolentiam, vt gagatis lapidis  
odoratus prostrauit. His vtique in capite vitium inhæsit, atque inde no-  
xam inferens ortum habet. Nonnullos verò & corripit à neruis procul  
à capite positus incipiens, quicūque principium in consensum affectus  
inducunt. Itaque magni manuum, aut pedum digiti conuelluntur: vn-

A



# A R E T A E I

de & dolor, & stupor, & tremor sequitur. atq; hæc in caput impetum **E**  
 faciunt, si & malum surrepens caput inuasit. His porro fragor quidam  
 redditur perinde, ac si ab ligno, aut lapide verberentur. cumque ab hu-  
 mo surrexerunt, quædam tanquam si ex insidijs vapulassent, comme-  
 morant. hoc sanè pacto illi, quibus primò id malum incidit, decipiun-  
 tur. Quibus verò familiare & consuetum est, simul atq; morbus in di-  
 gitum impetum dedit, aut inde exortum est, visitatos, qui adsunt, adiu-  
 tores inclamant, futuramq; ab experimento calamitatem prospiciunt:  
 obsecrant quoq; ut membra, vnde oritur, constringant, reflectant, di-  
 rigant. quinetiam ipsimet sibiipsis affecta membra, tanquam inde mor-  
 bum eximentes trahunt, velluntq; atque ita sibi met auxiliantes, non-  
 nunquam & nos ad ægritudinis notitiã impulerunt. Nonnullos uti-  
 que ceu inuadente fera pauor corripuit, aut adumbrationis opinio in-  
 cessit, atque ita prociderunt. At in ipso morbi insultu sensibus captus  
 homo iacet: manus ipsi neruorum distentione conuelluntur. crura ve-  
 rò non solum distracta sunt, sed etiam huc atq; illuc à tendonibus proij-  
 ciuntur. Id genus calamitas iugulatis tauris haud absimilis est: ceruix in-  
 curuatur, caput variè distorquetur. siquidem nonnunquam primum,  
 ceu arcus, inflectitur, quando pectori maxilla adhærescit: nonnunquam  
 verò in scapulas refringitur: veluti his, qui per vim crinibus trahuntur,  
 vsu venit. quando modò in hanc, modò in illã partem ad humeros ad-  
 mouetur. Sic laborantes magno hiato os aperiunt: id siccum habent,  
 linguam prælogam: ut periculum sit, ne aut magno vulnere faucietur,  
 aut penitus abscindatur. Interdum cõuulsione dentes inter se collidun-  
 tur: oculi inuersi sunt: palpebræ cum palpitatiõe frequenter dehiscunt.  
 quòd si quando conuiuere velint, palpebræ non committuntur, sed al-  
 ba oculorum cernuntur, ac subapparent. Supercilia nonnunquam, ut  
 his, qui ad iram concitantur, in glabellam attrahuntur: nonnunquam  
 ad tempora vehemèter admodum reuelluntur: ut cutis circa frontem  
 valde prætenta sit, atq; in superciliorum medio rugæ euanuerint. Ma-  
 læ rubentes palpitant. Labia interdum quidem in acutum clauduntur: **H**  
 interdum verò ad obliqua dilatantur: quando in ridentis speciem den-  
 tibus circuntenduntur. Malæ rubent quidem, sed cùm morbus incre-  
 uit, & faciei liuor accedit: ceruicis vasa distenduntur: vox, ut in strangu-  
 latu, aufertur. etiam si vehementer inclames, non sentiunt. eorum vox  
 nihil nisi gemitus & suspirium est. respiratio verò suffocatio quædam  
 est, veluti in his, qui laqueo strangulantur. Inter initia arteriarum mo-  
 tus vehemètes sunt, & celeres, & parui: in fine verò magni, tardi, & lan-  
 guentes: in vniuersum autem ordine carentes. Penis quoq; arrectio se-  
 quitur. Hæc utique circa accessionis finem patiuntur. Vbi ad mali remis-



tionem perueniunt, tunc sponte urinam reddunt, alius fluit: nonnullis etiam adstrictis compressisque vasculis genitura excernitur. id vero & dolore irritante, & humiditate erumpente accidere potest. siquidem & istis neruorum dolores fiunt. Ad hæc os vehementer humidum habent: pituitam multam, crassam, & frigidam: eam si trahas, in longum, veluti filum, ipsius multitudinem deduces. Porro temporis longitudine, et laboris vehementia, quæ intra pectus sunt, feruent. spiritus vero intus coercitus omnia concutiet. eorundem quoque et conuulsio & perturbatio sequitur. inter respirandum præterea humores & os & nares inuadant. spiritus cum humore effertur. Cum præcedens vero strangulatio remittit, omnia item remittere videntur. Quinetiam, ut magnis procellis concitatum mare, spumam ore profundunt: quando & tanquam iam dudum expulso morbo resipiscunt, & resurgunt. Cæterum cum à morbo quiescunt, ab initio, membris segnes sunt: capitis grauitate premuntur: dissoluti sunt, languidi, pallentes: consternati animo ob lassitudinem morbiq; verecundiam contristantur.

## De Tetano, seu Rigore. Cap. VI.

**T**etani musculorum, qui in maxillis sunt, & tendonum distentiones sunt, dolorem quidem magnum inferentes, celerrime vero necantes, haud facile quoque sanabiles. At noxæ ab hoc malo cum omni corpore communicantur: omnia enim cum principiorum vitij consentiunt. Species verò conuulsionis tres sunt, cum rectum corpus riget, aut retrorsum flectitur, aut prorsus versus incuruatur. Recto quidem corpore Tetanus dicitur, cum neutram in partem detortus homo, atque inflexilis contentus est. At conuulsiones, quæ retrorsum, aut in priorem partem fiunt, à tentione et loco nomenclaturam accipiunt. Nam in auersam partem ægrotantis reclamationem Opisthotonon vocamus, neruis, qui eo loci sunt, male affectis: Emprosthotonon autem, si in priorem partem homo deflectitur, neruis antè positis laborantibus. Tonus enim neruorum, tentionisq; vocabulum est. Causæ autem istorum infinite sunt. nam ob vulnera fieri solent, membrana, aut musculis, aut neruis punctis, ex quo plerunque moriuntur. A vulnere enim conuulsio letale est. Conuellitur autem & ex abortu mulier: verum & hæc raro admodum euadit. & ab aliquo vehemènti ceruicis ictu nonnulli conuelluntur: Et frigus longe excellens horum vitiorum causa esse potest. Quapropter hyems omnium maxime horum vitiorum ferax est, secundo loco, ver & autumnus, æstas autem minime, nisi vulnus præcesserit, aut peregrini morbi grassentur in vulgus. Mulieres sanè magis, quam viri, neruorum distentione tentantur: frigida enim sunt. verum ipsæ fre-



quentius liberantur, quoniam humidæ sunt. Quantum ad ætates attinet, pueri assidue hoc morbo vexantur: sed non admodum pereunt, quod illis vsitatum & familiare id vitium sit. Iuuenes aut rarius, quam pueri, id patiuntur: sed crebrius intereunt: viri minimè. At senes inter omnes magis & eo vitio corripiuntur, & eo necantur. In causa est frigiditas & ariditas senectæ, & mortis natura. Cæterum si frigiditas cum humido coniungatur, minus noxiæ sunt conuulsiones, minusque ab ipsis discrimen impendet. Affectum hunc ista comitantur, omnes subito atque affatim corripit, labor & intentio tendonum adest, et dorfi, et musculorum, qui in maxillis & pectore sunt. Inferiorem enim maxillam superiori annexunt adeo, ut neque vectibus, aut cuneis per Iouem facile diduci possint. Quod si quis vi detes abducens humorem instillauerit, non demittunt, sed effundunt, aut ore continent, in naresue retrudunt. Isthmus enim simul inhaerescit, ac tonsillæ duræ atque intentæ eius, quod deuoratur, in prelfioni non cedunt. Facies est rubida, variegata, oculi ferme rigentes, qui vix circumuoluantur, strangulatio vehemens, spiratio vitiosa, manuum crurumque distentio, musculi palpitantes, facies varijs modis distorta, buccæ & labia tremunt, maxillæ quatuntur, dentes strident. In alio verò quodam & aures mouebantur. Ego sanè vidi, & miratus fui, lotium supprimi usque ad insignem meiendi difficultatem, aut sponte effundi, cum vesica premeretur. Hæc utique omnibus conuulsionis generibus communia: propria verò cuiusque hæc sunt, Tetani quidem in rectum totius distentio, nullam prorsus in partem detorta, neque declinans. recta quoque sunt crura & manus. Opisthotonus verò retrorsum incuruat hominem, ut reflexum caput inter scapulas locetur. guttur extat: maxilla inferior plerumque dehiscit, & rarò cum superiore committitur. in respirando stertunt, venter & pectus prominent, lotium his minus contineri potest. abdomen intentum est, & si percutias, resonans. manus retrorsum extentione detorquentur, crura inflectuntur. e contra riò poplites vitiosè curuantur. At si in priorem partem contrahuntur, conuexa quidem his terga sunt æqualiter cum parte pectori opposita, quam Metaphrenon Græci appellant. coxendicibus extra pulsus, dorsum totum rectum est: vertex, caputque in pectus vergunt: mentum ossibus pectoris affigitur: manus confertæ sunt, & cohærentes: crura extenta. Dolores omnium atroces, vox omnium flebilis. suspirant autem mullantes profundius. Si pectus & spiritû morbus occupauerit, facile migrant è vita. Bonum quidem ægrotanti, quod laboribus, distortionem, turpitudineque liberatur. præsentibus quoque hominibus minus triste, seu filius, seu pater sit. Verum si in vita adhuc perdurent, spiritu licet vitiato, nihilominus permanente, prorsus versus non arcus modo



instar, verum et orbis incuruantur: vt caput genibus adnexum habeant, cruraq; ac terga in priorem partem refracta sunt adeo, vt genu articulus in poplitem depulsus esse videatur. Inhumana calamitas, iniucundus aspectus, triste intuenti spectaculum, et malum insanabile. ob inuersionem aut vel ab amicissimis hoibus non agnoscuntur. Votum quoq; illis, qui adsunt, prius impiu, nunc honestu efficitur, agru vita defungi, quo vna cu vita doloribus et acerbis malis liberetur. Quinetia neq; medicus presens atq; aspiciens, ad vitam, aut ad doloris leuamen, aut ad figura emendationem quicq; opis afferre pot. Nam si membra dirigere velit, viuentem sane hoiem distraxerit discerpseritq;. Igitur victis a morbo nihil ultra subuenies cotristatur dutaxat. Hac vero est medici magna ifelicitas.

## De Angina.

## Cap. VII.

**A** Ngina pacutus affectus est. spiritus enim compressio est. Duę vero eius species sunt: aut enim instrumentoru spirandi phlegmone est, aut solius spiritus in seipso causam habetis affectus. Instrumentorum quidem, tonsillarū, epiglottidis, faucium, columellæ, summæ arteriæ. Quod si depascitur phlegmone, etiam linguæ & maxillarum interius: cum ob phlegmones excellentem magnitudinem linguam extradentes proferunt. oris enim cauernam implet, & ipsius quod abundat, extra dentes exeritur. Hoc malum Synanche græce, Angina latine, & Cynanche, idest, Canina angina nominatur: aut qm huiusmodi animalia assidue hoc malo vexantur, aut quod etiam sana linguam exere consueuerunt. Alteri autē generi contraria eueniunt, instrumento rum collapsio, & singulorum naturæ insignis macies, et strangulatio vehemens: vt ipsismet in pectore, latentioribusq; partibus circum cor atq; pulmones abdita esse inflammatio videatur. Anginam hanc appellamus, quasi interius vrgentem, atque angētem. Ego vero existimo ipsius solius spiritus id vitium esse, praua conuersione ad calidissimum siccissimumq; conuersi, nulla corporis parte inflammatione laborante. Id autem mirandum nō est: nam in \* Charonæis strangulatus citra vllum corporis affectum acutissimi contingunt: immo vel vnica inspiratione prius, quam corpus aliquod maleficium contrahat, homines moriuntur. Quin etiam & à rabido cane, qui in faciem, dum spiritus adducitur, tantummodo inspirauerit, & nullo pacto momorderit, in rabiem homo agitur. Talem igitur respirationis mutationē interius fieri haud est ex his, quæ fieri nequeant: quando quidem & alia infinita eorum, quæ in homine sunt, eandem speciem cum exterioribus causis obtinent. succi perdentes intra corpus sunt, & exterius. morbi quoque medicamentis perniciosi assimiles. & à medicamentis talia vomunt, qua-

\* Aliter  
coronæ  
is.



lia ob febres vomere solent. Quocirca neque à ratione alienum est in pestilentia, quæ Athenas afflixit, nonnullos existimasse in puteos Piræi à Peloponensibus venena fuisse coniecta. homines enim pestilentis morbi cū letalibus medicamentis similitudinem ignorabant. Adest sanè Canis angina laborantibus tonsillarū, faucium, totius oris inflammatio: lingua extrà dentes & labia prominens: saliu effunditur: pituita crassissima ac frigida defluit: facies rubicunda & inflata est: oculi exerti, patentes, valde rubent: potus in nares refunditur: dolores acerbissimi sunt, sed stragulatione vexati eos obscurius sentiūt: pectus & cor ardēt: frigidi aeris desiderium adest, & admodum exiguum inspirant eousq; donec demum intercluso ad pectus aeris transitu strangulentur. Nempe quibusdam cum pulmone vitium facile communicatur. hi vero per mutationē moriuntur. febres ignauæ oriuntur, molles, nihil proficientes. At si alicui in bonum res vertitur, abscessus secundum aurem hinc atque inde exterius, aut interius in tonsillis fiunt. Quod si cū torpore non admodum tarde fiant, euadunt quidem, sed cum dolore atque discrimine. Sin autem morbo in abscessum mutato tumor maior subest, in acutum abscessu insurgente repente strangulantur. Hæ sunt planè caninæ anginae species. Anginam aut collapsio, gracilitas, pallor commitantur: oculi caui, interius demersi; fauces & gurgulio retracti; tonsillæ multò magis subsidentes, vocisq; priuatio. Huiusce speciei strangulatus longè, quàm prioris, violentior. quippe cū in pectore malum fit, vbi spirandi initium ponitur. eodem die moriuntur, qui celerrime. nonnunquam & ante, quàm medicum accersierint. nonnulli & accersito medico nihil profecerunt; mortuus est enim ager ante, quàm medicus arte vteretur. Quod autem in melius vertitur, inflammata omnia, quæcūque extrorsum phlegmone impulerit. quare ex tynanche, idest, angina, fit cynanche, idest, canis angina. Bonum quoque est, si in pectore magnū oedema oriatur, aut insigne erysipelas. Egregius vero medicus aut cucurbitula in pectus malū detrahit, aut sinapim ossibus pectoris, aut partibus iuxta maxillas imponens extrinsecus \* vlcera, difflationemque molitur. Quibusdam sanè breui tempore vitium his auxilijs exterius tractū fuit, absolutum vero subito recurrit, & \* ad interiora reuersum est. Causæ vtique infinitæ sunt, refrigerationes magis, exustiones minus, plagæ, ab ossibus pisciū penetrationes in tonsillas, frigide potus, ebrietates, saturitates, & mala à respiratione pdeūtia.

\* Alia les-  
sio at-  
trahit,

\* Alia  
suffoca-  
uit.

#### De affectibus Columellæ. Cap. VIII.

**C**orpus solidum ex palato pendens, inter tonsillas positū, Colum-  
na et Gurgulio nominatur. Vua enim affectionis nomē est. Colu-



- A** mella natura nervus est, sed humidus. nam in humido loco situs est. Iste itaque Gurgulio pluribus incommodis afficitur. Etenim phlegmone crassescit, equalisq; a basi vsque ad extremum terminum efficitur in lorum protetus, ac rubore suffusus. Columna huiusce vitij appellatio est. Si in extrema tantum parte rotundatur, & increfcit, liuet, atq; subnigricat, Vua huiusmodi affectus cognominatur: omnia eni vut similia sunt, & figura, & color, & magnitudo. Tertius affectus est membranarum ab vtraq; parte iacentium, quæ veluti squamæ latæ, aut vesperilionum alæ cõspiciuntur. id genus morbi Lorum vocatur: loris enim similes sunt membranarum in latum explicationes. At si in tenuem &
- B** oblongam membranam Columella desinat, veluti vrinaculum in extremis habens, Craspedon Græci hunc affectum nominant. quod montis radicem vel pedem significat. latino caremus vocabulo. Prouenit autem & id ex fluore, quæadmodum & alia vitia. Fit verò & per abscessionem obliquè factam ab vno tantum latere membranam relinquentem medico. Sin autem bicornis Columella reddatur, geminis membranarum hinc atq; inde pendentibus, nomen quidè nullum obtinuit, verum affectus ipse perspicuus est. omnia verò hæc facile fuerit introspectientè dignoscere. Omnibus ipsis stragulatus accidit, & egrè cibum potumq; deuorant. tussis quoque omnibus adest, sed præcipuè Loro vexatis, &
- C** Craspedo. quædam enim arteriæ titillatio à membranarum oritur: nonnunquã verò & aliquid humoris in arteriã clanculum instillatur, vnde ad tussim prouocantur. Vuam autè & Columnã maior spiritus difficultas sequitur, et magis impedita deuoratio. in his enim humor in nares repellitur, quoniã tonsillæ vnâ malè habentur. Senibus Columna accidere consuevit: Iuuenibus autè ac viris Vua. siquidem hi sanguine referti sunt, & inflammationi magis obnoxij. Pubescentes & pueros membranarum vitia sæpius infestat. Secari autem omnia citrà noxam queunt. sed in Vua adhuc rubentibus locis sanguinis effluuium, & dolores, & phlegmones incrementum superueniunt.

**D** De Tonsillarum vlceribus. Cap. IX.

**V**lcera in Tonsillis fiunt aliqua mitia, familiaria, non lædentia: Aliqua aliena, pestifera, necantia. Mitia quidè sunt munda, exigua, non altè descendentia, non inflammata, dolorem non excitantia. Pestifera sunt lata, caua, pingua, quodã concreto humore albo, aut liuido, aut nigro sordentia. Id genus vlcera Aphthæ nuncupantur. Quòd si concreta illa sordes altius descenderit, affectus ille Eschæra est, atque ita græcè vocatur, latine Crusta. Crustam verò circūueniunt rubor excellens, & inflammatiõ, & venarum dolor, quemadmodum in carbun-



\* Aliter  
exterius.

culo; & exiguae raræq; pustulae, quas Graeci Exanthemata vocant, oriē-  
tes, hisq; aliae superuenientes in vnum coalescunt: atque inde latum vl-  
cus efficitur. Id si intērius in os depascendo serpit, ad Columellam vsq;  
peruenit, ipsamq; exedit, & linguam etiā occupat, & gingiuas, & fre-  
na, id est, dentium alueolos, dentesque inde labefactantur, & denigre-  
scunt. In collum etiam phlegmone erumpit. atque isti haud ita multis  
diebus post phlegmone, febribus, foetore, inediaq; cōsumpti intereunt.  
At si in pectus per arteriam id malum inuadat, illo eodem die strangu-  
lat. pulmo enim & cor neque talem odoris foeditatem, neq; vlcera, ne-  
que saniosos humores sustinent: sed tussis spirandiq; difficultas enasci-  
tur. Causa maleficij tonsillarum est frigidorum, asperorum, calidorū, F  
acidorum, adstringentiumq; deuoratio. quandoquidem hae partes pe-  
ctori ad vocem spiritumq; ædendum inferuiunt: & ventri ad alimenti  
transmissionē, & gulæ ad eiusdē deuorationem obsequio sunt. Inter-  
nis verò partibus si quod contingat incōmodum, ventri videlicet, gu-  
læ, & pectori, ad isthmum, & tonsillas, & loca ibi posita mali cōsensu  
& eructationes perueniunt. Quapropter pueri vsque ad pubertatem  
maximè hoc morbo tentantur. præcipuè nanque pueri multum frigi-  
dumq; aerem inspirant. quoniam in his plurimū caloris inest, & ad ci-  
bos intemperantes sunt, & varia concupiscunt, & frigidam potant, &  
excandescunt ac ludentes altiùs vociferantur. Puellis quoque vsq; ad E  
menstruæ purgationis tempora hæc vitia vsitata sunt. Regio Aegypti  
horum affectuum planè foecunda est. aer enim spirādo siccus adduci-  
tur. varios præterea cibos suggerit. radices enim, herbae, atque olera ibi  
largè proueniunt, & acria semina, & potio crassa, vtpotè Nili aqua. sibi  
verò Aegyptij ex ordeo, & ex flocibus seu vinaceis potiones acres cōfi-  
ciunt. Syria quoque, maximè illa, quæ Coele, id est, caua nominatur, hu-  
iusmodi morbos procreat. vnde ægyptia & syriaca vlcera id genus ap-  
pellant. Modus verò mortis quàm miserrimus accidit. Dolor quidem  
acer, & calidus, qualis in carbūculo, spiritus vitiat. exhalāt enim ma-  
ximæ putredinis odorem, eūdemq; vehementer in pectus spirādo ad-  
ducunt. Immūdi adeo sunt, vt neq; suum ipsorum odorem ferre que-  
ant. Pallida his seu liuida facies, febres acutæ, sitis, vt igne accēsi videā-  
tur: Potum, veriti dolores, non admittunt. tristantur enim, cū tonsil-  
læ comprimuntur, aut potus in nares resilit. cūque decumbunt, sur-  
gunt, vt sedeant, decubitus non ferentes. quòd si sedent, quiete caren-  
tes, iterum decumbere coguntur. plerūque autem recti stantes obam-  
bulant. nā quiescere nequeūt. solitudinē fugiunt dolorē tollere dolore  
tentātes. Inspiratio magna est, frigidū enim aerem ad refrigerationem  
desiderāt: expiratio verò parua. Nā veluti igne exusta vlcera cū sint,  
à calido



## LIBER PRIMVS

**A** à calido præterea spiritus incenduntur. raucitas adest: vox nihil significat. Atque hæc in peius ruunt, cum subito in terrâ collapsis anima deficit.

### De Pleuritide, id est, morbo, lateris. Cap. X.

**S** Vb costis, dorso, & internis pectoris ad iugula usque tenuis membrana robustaq; ossibus inhaerens substrata est, cui nomen succingens inditum est. In hac cum phlegmone suborta fuerit, ignis adest cum tussi & sputis varijs. Pleuritis morbus iste à Græcis appellatur. Opus est autem omnia hæc inter se consonare, atque conspirare ab una causa pendentia. Quotquot enim ex his sparsim alia ab alia causa proueniunt, & si omnia simul ingruunt, Pleuritis non vocatur. Hunc affectum comitatur dolor acutus ad iugula ascendens, ignis acer. Decubitus in latus inflamatum facilis est. in sua enim ipsius sede collocatur. in oppositam verò partem decubitus dolorem concitat. à pondere enim, & phlegmone, & suspensione in omnes membranae continuas partes ad humeros usque & iugula, quibusdam verò & in terga, & in dorsi scapulas dolor protenditur. Pleuritida veteres Græci appellarunt, Latini morbum lateris, vel costarum. Eam verò sequitur difficilis spiritus, vigilia, ciborum fastidium, malarum rubor hylaris, tussis arida: sputa egre exeuntia, pituitosa, aut biliosa, aut abunde cruenta, aut subflaua: & hæc ordinem non seruantia, sed alias alia aduenientia ac recedentia. Ex omnibus verò peius est, si cruentum sputum desit. Delirant autem: & nonnunquam comate occupantur: atque in soporem grauem inclinantes mentis alienatione patiuntur. Itaque si in malum vertatur morbus omnibus in peius vergentibus, intra septimam isti in syncopam lapsi consumuntur. At si in secunda hebdomada educi sputa incipiant, & mala augeantur, decimoquarto die pereunt. Nonnunquam sane intra huius temporis spatium omnium in pulmonem transitus est. Trahit enim in seipsum pulmo rarus, & callidus, & ad proxima trahenda sese commouens. Tuncque morbi transpositione repente homo strangulatur. Cæterum si diem hunc agrotus transierit, atque intra vicesimum non moriatur, in empyem, hoc est, pectore suppuratum euadit. Hæc profecto, si morbus ad perniciem tendat, eueniunt. At si in melius vergat, sanguinis è naribus larga profusio cum impetu succedit: tuncque repente morbus discutitur. quoniam et somnus oritur, & pituitæ reiectio aduenit, postea biliosorum tenuium, deinde multò tenuiorum, rursus verò cruentorum, crassorum, carnis formam referentium. Quod si post cruenta iterum exeat bilis, post ipsam pituita, secuta est hæc in primum restitutio. Hæc si tertio die incipiunt, & facile extusciunt, leuia, æqualia, humida, rotunda, septimo die liberantur. quoniam & venter biliosa exturbat, spiratio conquiescit, mens ad se redit, febres decrescunt, ciborum

B



appetētes sunt. Si secūda verò hebdomada hæc inchoatur, decimo quārto die sanatur: sin minus, in empyema, hoc est, pectoris suppurationem morbus vertitur. Id verò rigores indicāt, doloresq; punctorij. sedere cupiunt, spiritus deterius ducitur. tunc metus maior est, ne pulmo pus multum subito attrahens hominem suffocet: qui prima & maiora mala euaserat. Verū enim uerò si inter costas morbus irreperit, easq; diiunxerit, & plegmones fastigium extrorsum deprompserit, aut versus intestina eruperit, plerunque homo ad sanitatem redit. Inter anni tempora hyems maximè huius morbi ferax est: secundò autumnus: ver minus, nisi interdum frigidum sit: æstas verò minimè. Quantum ad ætates attinet, in primis senes pleuritidi sunt obnoxij: qui etiam sæpius, quàm alij, liberantur. neque enim magna phlegmone in arido corpore excitari potest, neque in pulmonem transitus facilis est. quippe qui est in senectæ, quàm in alia ætate frigidior. quando & spiratio parua est, & omnium attractio imbecilla. Iuuenes autem & viri haud ita frequenter in hunc morbum incidunt: verum neque admodum frequenter euadunt. nam neque ab exigua causa, neque ob exiguam phlegmonem ægrotant. In magnis autem maius inest periculum, & pueri minimè pleuritide corripiuntur, minusq; ab ea periclitantur. quando quidem puerilia corpora rara, & humidiora, humida, fluxaq; sunt, ac multa est in eis diffusio, & digestio. quocircà neq; magna contrahitur phlegmone. ea est huius ætatis in hoc morbo scilicet citas.



# ARETAEI CAPPADOCIS

DE CAUSIS ET SIGNIS

ACVTORVM MORBORVM.

Liber Secundus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Hæc insunt in secundo Libro.

De Pulmonaria. Cap. I.

De Sanguinis reiectione. Cap. II.

De Syncopa. Cap. III.

De Ardoribus. Cap. IIII.

De Cholera. Cap. V.

De Voluulo. Cap. VI.

De Iecinoris acutis morbis. Cap. VII.

De Cauæ venæ acuto morbo. Cap. VIII.

De Renum acutis affectibus. Cap. IX.

De Vesicæ acutis affectibus. Cap. X.

De Vteri strangulatu. Cap. XI.

De Satyriasi. Cap. XII.

De Pulmonaria, Cap. I.



**O** B DVO potissimum viuunt animalia, escam videlicet & spiritum. ex his multo magis vitæ conducit spiratio. hanc enim si quispiam supprimat, non diu feret inco-  
lumis: sed protinus interibit. Huius instrumenta multa parata sunt. Initium sunt Nares: via est Arteria: locus continens Pulmo. Pectus autem pulmonis est vallum & conceptaculum. Verum cætera vt instrumenta solum animali subseruiunt, pulmo vero attrahendi causam in se continet. Naque in ipso medio calidum viscus sedet cor vitæ spirandiq; principium. Id pulmoni quoq; attrahendi frigidi aeris cupiditatem inijcit. si quidem ipsum incendit; verum cor est, quod attrahit. In primis igitur si cor affectum est, nõ diuturna est mortis dilatio. Si pulmo male habet, pusillam quidem ob causam difficulter spirat, male vitæ agit, mors tardissime aduenit, si q̃s medelam adhi-

B ij



## A R E T A E I

bet. Si vitium infigne fuerit, qualis est phlegmone, strangulatus sequitur, vocis spiritusque sublatio: subitanea pncies imminet. Hæc est ægritudo ea, quam Græci Peripneumoniam Latini Pulmoniam dicunt. vomica scilicet pulmonis. Eam febris acuta comitatur, doloris carentia, si solus pulmo inflammatur. Quippe qui naturaliter dolore immunis sit, ob corporis raritatem lanis æssimilis: Asperæ arteriæ in ipso insertæ sunt, cartilaginosa, & ipsæ dolorem non sentientes. Musculorum pulmo expers est: nervos habet exiguos, graciles, ad motum ciendū opportunos. his de causis pulmo dolorem non pcipit. At si quæpiam ex membranis eū ambientibus & ad pectus deligantibus inflāmur: adest tunc & dolor. spiritus est deprauatus, calidus: sedere volunt laborātes. ad spiritum ducendum corpus rectum statuitur: ad id enim hic est situs aptissimus. rubescit facies, sed malæ præcipuæ. oculorum album nitidissimum ac pingue est. summae nares simæ sunt. venæ tēporum, vel etiam colli elatae apparent. cibos auersantur. arteriarum pulsatus initio magnos habent, inanes, creberrimos perinde, ac si festinare coacti sint. calor in exterioribus membris modicus humectusque est: in interioribus ingens aridus. Inde fit spiritus calidus, sitis, linguæ siccitas, frigidi aeris auiditas. mentis ambiguitas supuenit. tussis adest plerumque: sicca. sin aliquod sputum mouet, id vel spumans pituita est, aut aliquid exquisite biliosum, aut cruentum, floreo colore valde perfusum. id vero cruentum alijs pnciosius est. Quod si mortifera magis ægritudo redditur, vigiliæ augescunt, somnus paucus, torpidus, haud absimilis sopori, qui à Græcis Coma nominatur. cogitationes vanæ insurgunt, mens alienatur. nō admodū ecstasi corripitur. præsentia mala ignorat. nam eos si de morbo interrogas, nihil periculi instare respondent. eorum algēt extrema: liuescunt vngues \* curuanturque. motus arteriarū parui, frequētissimi que sunt, et deficientes: quando ipsis proxima mors est. nam septimo die plerumque moriuntur. Porro si nonnūquam morbus subsistit, & aliquantulum in melius vergit, vehemens de naribus sanguinis eruptio conspicitur: aut per alium cum pturbatione multorum biliosorum & spumantium succorum deiectio. qui ex pulmone in sacrum ventrem depulsi fuisse videri possunt, si multi liqdiore & facile deijciuntur. Nōnūquā vero & per vrinarias semitas euocantur: Cæterum quibuscunque hæc simul eueniunt, hi q̄primum ægritudine subleuantur. Quidam vtique sunt, quibus magna vis puris in pulmone procreatur: aut ex pleuritide fit permutatio, si maius bonū suboritur. Quod si ad intestina aut vesicam ex lateris morbo sanies deriuata sit: tunc quidem continue pulmonis vomica liberantur: sed diuturnum vlcus, quod demum sanescet, in latere patiuntur. Quibus vero in pulmonem pus irrumpit: nōnulli ob

\*Ailas  
vigilant,



subitanæam & copiosam effusionem, & reiiciendi infirmitatem suffocantur. At quicunq; suffocationis periculum ex tumoris eruptione subterfugiunt: hi longo tempore pulmonis vlcere cruciantur, & in phthisim prolabuntur. Verum ex abscessu & phthisi pauci admodum senes liberantur; sicut neq; à pulmonia iuuenes & florentem ætatem agētes.

### De Sanguinis exitu ab ore. Cap. II.

**S**anguis ab ore duobus modis emittitur. primo ex ipso ore, capite & vasculis, quæ ibi sunt. via est palatum & fauces, vbi est gulæ & arteriæ principium. screantes vero & cum parua tussi, vel etiam citatiore in os sanguinem eructant. nam cum ab ore fertur, neq; screatu opus est, tum expuere dicimur. cum vero paucissimus & guttatim sanguis exit, aut etiam si copiosus de capite, vel ab ore eruperit: nōdum reiectio est appellanda; sed idem vel sputum, vel sanguinis eruptio, græce hæmorrhagia dicitur. sin ab inferioribus ascendat à pectore visceribusq; ibi latentibus, pulmone, aspera arteria, locisq; spinæ finitimis: huiusmodi nō sputum, sed reiectio latinè, græcè anagoge vocitatur, ascensionis, ac viæ, per quam fertur, nomen habēs. Signa vero vtriusq; communia exigua & pauca sunt, quantum & locus permittit, in quem reiectio & sputum conueniunt. Singulorum autem propria, magna, & multa, & periculosa sunt. quibus vtranq; effusionis sanguinis speciem internoscere leue est. Igitur si a capite sanguis decurrit, vbi multus est, plura maioraq; aderunt: pauca minoraq; vbi raro paucusque expuitur. caput graue est, dolet. sonant aures. facies rubet. venæ distentæ sunt. vertigo infestat. Et ante hæc causa euident fuit. percussus, frigora, calores ingentes, vinum largius epotum. Quippe id subito ac valde caput implet, repenteq; multum sanguinis effracta vena profundit. modica ebrietas rarefacta vena sanguineum sputum mouet. Interdum per nares sanguinis consuetum profluuium sistitur ad palatum vero conuersum reiectionis imaginem præbet. Igitur si de capite profluit, titillatio in palato gignitur. creber screatus fit. post quem sputum erumpit. inde irascuntur, tussiq; magnopere agitantur. Si ex palato in arteriam defluit, tum per tussim sanguinem extrudunt: idq; multos falsos habuit ex profundis visceribus reiectionem fieri suspicantes. Nonnunquam & ex capite decurrit in gulam, sicq; cum nausea euomitur. falsoq; multis ita persuasit, vt ex gula ferri sanguinem crederet. Qui expuitur sanguis, haud ita crassus est, colore ater, leuis, æquabilis, alienæ materiæ non permixtus. screantibus enim confestim in linguam cadit rotundus, auulsioniq; obediens. Tu vero si palatum etiam intropicias, id sordidum, vlcerosum, & sæpius cruentum videbis. Huic simplex curatio breuisq; suffecerit, adstringen-



tia videlicet medicamenta palato adhibira, & ea frigida. siquidem calefacientia, & quæ rara faciunt corpora, & quæ dilatant, fluxum maiorem citant. Eaquæ sit à capite cadentis sanguinis coniectura. At caput quoque vel per venæ sectionem, vel per nares, vel per aliam diffilationem euacuandum est & hæc mature facienda sunt. nam si diutius sanguis feratur, quædam erit eius cursui exercitatio, eiusquæ loci membra suscipiendo sanguini assuescent. vlceratur autem & arteria: vnde tussis, non scretus exoritur: atquæ inde fit corruptionis initium. Si vero à pectore inferioribusquæ visceribus sanguis effluerit: reiectio latine, græce anagoge nuncupatur. Vtiq; valde mortifera est, si ab aliquo principe membro effracto sanguis manuerit, aut à concaua cordis vena sanguinem ab iecore illi suggerente, aut à magna arteria secundum dorsi spinam discurrente. nam erumpente sanguine, perinde ac si iuguletur homo ac stranguletur, mors instat celerrima. Quibus autem ex pulmone, aut costa, aut aspera arteria profunditur, non æque cito intereunt; verum tamen in suppuratione pectoris, græce empyema dicitur, & in phthisim incidunt. Minus periculi ab aspera arteria porteditur. Si gula aut ventriculus sanguinem vomunt, non ita terribile est: et si valde copiosus sanguinis vomitus est. nequæ longa curatio est, neque varia. Si à iecore aut liene prodeat, non facile id fit, nequæ continenter. namquæ in ventriculum & intestina expeditius hæc viscera sanguinem propellunt. haud ita tamen, quin credendum sit, hæc eadem ad superiora, videlicet, pulmonem & arteriam posse retrudere. Siquidem in febribus à liene & iecinore per nares illam sanguis erumpit, quæ è regione patienti visceri opponitur. Locos, vnde fit exitus, iam recensuimus: eorumquæ periculi vel mortis discrimina. Effusionis autem sanguinis tres sunt modi, vel rupta vena aliqua, vel exesa, vel rarefacta. Rumpitur quidam repente vel ictu, vel ferendo onere, aut tollendo, vel ab edito loco defiliendo, vel clamore, vel magna excandescencia, aliaue id genus causa: cum subito in arteriam copiosus sanguis effunditur. Si ab erosa parte, hominem interrogare opus est, num prius tussierit, difficulter spirauerit, nausea vomitusue antea infestauerit? in his enim diuturnis affectibus copiosa & acris fluctione pseuerante vascula exeduntur. Vbi igitur detrite & attenuata, ad extremum consumptæ fuerint ambientes membranulæ, hæc atquæ illac sanguine perfluunt. At rarefactio citra rupturam est proinde non subitanea, nequæ cum multo aut crassi sanguinis exitu. nam cum rarescunt venarum corpora, tenuis pars excernitur. Quod si multus in aliquo inani spatio sanguis collectus rursus emittitur, crassior seipso redditur: non tamen multo crassior, nequæ ater, quale concrementum, aut grummus est: sed copiosior. ut potest qui vnum in locum prius confluxerit. Id genus autem repentinè exi-



**A**rus plerunq; foeminis, quibus menstrua nō respōdēt, euenire solet: idq; singulis mēsis euenit. ijsdēq; mēstruē purgatiōis circuitibus apparet: necnō ijsdē statis cessatiōis diebus supprimitur. ac nisi mulieri laborātū succurratur, per multos circuitus sāguinis emissio reuertetur. Nempe quibusdā vasa rupta sunt, sed multitudine reiectio euariat. Et ab arteria, an à vena feratur, interest. Quāter est sāguis, crassus, & facilē spissescēs, qui à vena mittitur: prēterea minus discriminis affert, celeriusq; cōpescitur. Ab arteria flauus tenuisq; plabitur, haud ita cogitur, citius hominē perimit, & maiori negotio supprimitur. nam arteriæ agitatio sanguinis fluore mouet, vulnusq; frequenti concussione dehiscit. Erosionis autē curatio magnam diligentiam postulat, cum sit longa, difficilis, & periculosa. Etenim parte mēbri deficiente, ad solidationem vlcus non ducitur. vlcus enim, non vulnus efficitur. Rupturæ verò facilior solidatio, quia vulneris oræ se contingunt. & hæc secundo periculi ordine cōsistit. Minimus in rarefactione metus subest. spōte enim sanguis conquiescit, & adstrictio refrigeratioq; in medēdo satis est. Cæterum & sedes, vnde sanguis pficiscitur, obseruādæ sunt. Siquidem multa sunt communia indicia, & erroris occasio in promptu est, curatioq; diuersa. A gula igitur haud ita sepe per rarefactionem solet sanguis effluere: cum ob cibos potionesq; refrigeratio & adstrictio eius ptes cōdenset. Quinetiam rosiones haud frequenter fiunt, ac minūs, quā rarefactio, gulam infestant. quippe fluctiones erodētes nō multum temporis in ea subsistūt: sed aut expuuntur, aut ad inferiora pelluntur. Frequentius gulæ incidit ruptio. itaque si interdum rupta est, nō tam magnæ, sicuti à pectore, sanguinis pfusiones fiunt. in causā est venularū, quæ ibi sunt, arteriarumq; tenuitas. sanguis verò exiens nō magnoperè nigricat, subflauus est, non exactè, læuorem habet, aut saluæ pmixtus est. cum nausea et vomitu reijcitur. leuis tussicula citatur, modò humidum quippiam mouens, modò arida. id euenit, quoniam gulæ affectum arteria quoq; participat, secūdum illam extenta & adhærescens. morsus vel adstrictio vlcis inter deuorandum percipitur: idq; præsertim, si benè frigida, aut calida, aut acerba sint, quæ deglutias. nonnullos autem & gulæ ipsius dolor inuadit ad interscapulum vsq; interdū pertinens. vomunt pituitosa. nōnunquam, si morbus producit & inualefcit, cibum reijciunt, cibos summoperè fastidiunt. febres haud ita multum continuæ, sed erraticæ sunt. E vētriculo niger cōcretusq; sanguis euomitur, etiam si ab arteria fluxerit. Si à vena, multò nigrior, compactiorq; est. nausea multa adest: pituitosus, biliosusq; vomitus. si prius homo comedit, cum cibis mixtus sanguis eijcitur. in eodē enim loco cibis sanguisq; colligitur. ructus crebri fiunt, & virus olentes. quòd si



multa materia collecta est, angor animi vertigoq; sequitur. cum mate- **E**  
 riam vomuerunt, subleuantur. resoluuntur tamen, penitus exaestuant,  
 assidueq; dolet ventriculus. Ab aspera autem arteria paucus sanguis,  
 vehemeter flauus, per tussimq; expellitur qui nisi expellitur, continens  
 tussis inhaeret. sensus vero & dolor in gutture est, paulum supra aut in-  
 fra. vox rauca & obscura fit. Si à pulmone, repente vberiorque sanguis  
 emanat: idq; magis, si erosio in causa sit, tussis permolesta est; sanguis  
 vero exacte flauus, spumans, rotundus sic, vt pars eiecta à parte disun-  
 cta sit. Caeterum & in communi vase corruptio eorum, quae de pectore  
 exeunt, alia est. comparatione autem permixta discernas: alioqui pecto-  
 ris partes specie carnosas pulmonis esse partes censueris. verum pecto- **F**  
 ris grauitas, indolentia, ruborq; in facie multo magis in pulmonis vitio  
 reperitur. Si in pectore noxa sit, in parte priori, secundum os pecto-  
 rale, quod vocant, dolor laceratam partem ostendit. ingens tussis ad-  
 est, vix aliquid extrudens. sanguis non multum flauus est, modice  
 crassus, spuma carens. Quod si & pulmone in transitu noxam impertiat,  
 aliquid etiam spumae consequitur. quandoquidem ex pectore in arte-  
 riam per pulmonem iter datur. Si à membrana costas vestiente, per tuf-  
 sim quidem sanguis funditur: sed niger, leuis, tetri odoris virosiq; qua-  
 lis ex putridis rebus exhalat. dolor succingentis membranae acutus ve-  
 xat. multi ex his cum febre, vt pleuritici solent, intereunt. Tempus an- **G**  
 ni humidum calidumq; sanguinis emissionem maxime procreat. tale  
 est humidum & calidum. Ver: secundo loco Aestas, Autumnus minus,  
 Hyems minimè. Aestate maxime moriuntur ob sanguinis effluuium:  
 quo tempore haud ita magnae phlegmonae oriuntur. Vere secundo  
 phlegmonis & vrentibus febribus consumuntur. Autumno plurimum  
 Tabes, quas Graeci Phthoas dicunt, eueniunt. Vt semel autem dictum  
 sit, omnem sanguinis reiectionem quantumuis modicam, quauis iam  
 rupta vasa coierint, comitatur moeror, diffidentia, vitae desperatio:  
 Quis enim est adeo firmo & costanti animo, qui se iugulationi simile  
 quoddam passum esse conspiciens, non futuram mortem vereatur, & **H**  
 perhorrescat? grandiora nanque animalia & robustiora, quales tauri  
 sunt, sanguinis profusione celerrime perduntur. Verum hoc haud ma-  
 gnopere mirandum est. Illud summa admiratione dignum, quod in so-  
 la ex pulmone reiectione, quae omnium saeuissima est, homines ani-  
 mum non despondent, cum tamen in extremo discrimine versentur.  
 Pulmonis indolentiam huiusce rei causam ego statuo. quilibet enim do-  
 lor, quamuis exiguus, interitus metum iniecit, & plerumque terribior est,  
 quam periculosior. contra indolentia in plurimis vel magnis morbis à  
 morte securitatem praestat: damnosiorque est, quam terribior.

De



## A De Syncopa. Cap. III.

**R**Ecce planè medicus & vulgus, recte, inquam, huic affectui nomen indiderūt. O Cyphon, cuius mali est nomen? Ecquid enim maius, ecquid celerius syncopæ facultate? ecquidnam aliud nomen ad hanc rem appellandam significantius? quid vero corde ad mortem vitæ potius? Neque syncopam cordis ægritudinem esse, aut vitalis in eo potestatis detrimentum, non credendum est. tanta est mortis celeritas, & talis morbi species. Quippe is affectus vinculorum potestatis vitam fouentis dissolutio est, hominis constitutioni aduersarius.

**B** hanc enim tenaciter corripit, non dimittit, sed dissoluit ac dissipat. Neque id magnum est miraculum. Nā & alij affectus quorundam membrorum, quibus inhaerescunt, indeq; accenduntur, proprii sunt & periculosi. Inguinum quidem tumores pestiferi & permaligni (Bubonas Græci nuncupant,) iecoris soboles sunt, nullaq; alia ex parte prodeunt. Tetanus autem neruorum labes est. Comitialis morbus caput obsidet. Pari igitur ratione & syncopa cordis & vitæ ægritudo est. Quicumque vero stomachi affectum syncopam esse opinantur, quoniam cibis vi-  
noq; in nonnullis & frigida vires refectæ sunt, & ægritudo sublata: ijdem mihi videntur capillorum capitis, & cutis affectum esse phrenitici releuatur. Verum cordi stomachus vicinus perniciosus est vnde in cor tam noxia, quàm vtilia deriuantur. Etenim per pulmonem etiam, vt spiret, aerem cor accersit: verum tamen pulmo haud ex æquo spirandi facultatis particeps est. cum facultates non in instrumētis, sed vbi est vitæ fons atque roboris, statuatur. At stomachus vitæ neq; principium, neq; sedes est: aliquis tamen ab eius imbecillitate lædi potest. Nam & cibi cordi nocentes non stomacho efficiunt, sed cordi per eum noxam infligunt. Si quidem & ab illis morietes cordis affecti notas representant, articularum motus paruos debilesque, cordis concussionem cum vehementi palpitatione, vertiginem, animi deliquium, torporem membrorum, resolutionemq; copiosum sudorem, qui supprimi nequeat, refrigerationem in toto corpore, sensus vocisq; priuationem. dicendum ne est hæc stomachum perpeti? Sed quæ nam ei propria? Nausea, vomitus, cibi fastidium, singultus, eructatio simplex, vel acida. Illi præterea, quibus cor laborat, sensus aciem exquisitiorem habent, vt videant, vt exaudiant plus, quàm antea. mente etiam sunt firmiore, & animo puriore. proinde non tantum præsentia declarant, verum etiam futura verissima diuinatione prædicunt. Num ne igitur & hæ stomachi potestates sunt? hercule minime, sed cordis, vbi & anima & eius natura inhabi-

C



rat, ad quod & virtutū ibi sitarum calamitas pertinet. Huius vero mor-  
bi est tenoris naturæ destructio autore frigido humidoq; quippe hoc  
oppressi intus & in cute refrigescunt; non sitiunt: frigidum spirant; quā  
uis magnis ac perurentibus febribus, vnde ipsa syncopa dependet, affli-  
gantur. Natura enim robusta & probe temperata omnia superat, om-  
nibus dominatur, ac per humorem & spiritum & solida, horumq; om-  
nium conuenientem ordinem & modum hominis vitam administrat.  
Quod si naturæ nexus, id est, Tenor dissolutus sit: tunc affectus oritur,  
cuius prægrediens causa est comburens febris, quæ græce. Causus dicitur,  
ea vero huiusmodi est.

De Causo, id est febre uistoria. Cap. III.

\* Alias  
mobiles

**I**gnis passim & acer et tenuis est: sed intus maxime. Spiritus tāquam  
ab igne, calidus. Aeris vehemens attractio. Frigidi cupiditas. Lingua  
arida. In labijs & cute squallor. Algent extrema. Lotium quāmbiliosiss-  
simum. Infomnietas. Arteriarum motus crebri, parui, imbecilli. Oculi  
puri, \* lucentes, subrubri. Facies bene colorata. Si morbus vltius cre-  
scit, omnia maiora & sauiora fiunt. Arteriæ minimis motibus et creber-  
rimis agitantur. Ignis aridissimus & acerrimus. Mens delirat; omnia  
ignorat. Siticulosi fiunt. Omnia frigida attrectare cupiunt, parietem, ve-  
stem, pauimentum, humorem. Manus frigent, sed palmæ perquā ca-  
lida. Ungues liuent. Spiratio crebra est. Roscidus humor circa frontem  
& iugula. Cum ad summam ariditatem caloremq; corporis natura p-  
uenerit; tum calidum in frigidum, squallor in imbrem conuertitur. Re-  
rum nanque ad maximam molem incrementa in contrarium statum  
prolabuntur. Vbi ergo naturæ nexus soluti fuerint, ea syncopa est. Tunc  
fudor ingens toto corpore funditur, & nullo pacto compescitur. Spira-  
tio frigida est. Vapor ē naribus multus exhalat. Siti non vexantur. cate-  
ra enim exaruerunt. quinetiam alia instrumenta sitiunt os & gula. Uri-  
na tenuis & aquea redditur. Aluus plurimum adstricta est: nonnun-  
quam tamen pauca quædam biliosa descēdunt. Copiosa & aliena hu-  
miditas redūdat. Ossa quoq; tabescentia diffluunt: & vndique, vt in flu-  
mine, ad exteriora omnia dilabuntur. Animus stabilis & constans est:  
sensus omnis purus & integer: subtile ingenium. Mens vaticinādo ido-  
nea. Primum quidem seiplos de vita migraturos præsentunt, deinde  
præsentibus futura denunciant. Nonnulli vero interdum eorum dictis  
fidem non habendam putāt, sed dictorum euentus homines in eorum  
admirationem concitat. Aliqui præterea ex his cum quibusdam vita  
defunctis sermonem habent: fortasse quidem ipsi soli præ sensus acu-  
mine & puritate eos adesse cernentes: aut forte ipsorum animo viros,



**A** cum quibus versaturi sunt, prænoscere, atque enarrare. Quippe antea in lutulentis humoribus & caligine demersus erat: quos ubi morbus exhaustit, & ab oculis tenebras deterfit, quæ in aere fiunt, prædicant, exutoque sordibus animo veracissimi vates efficiuntur. Sed quorum succi & ingenium adeo extenuati sunt, hi non diu admodum solent esse superstites; cum eorum vitalis potentia iam in aerem cesserit, atque abierit.

## De Cholera,

## Cap. V.

**B** Cholera est materia à toto corpore in gulam, ventriculum & intestina retro fluens motio, vitium acutissimum. Supra enim per vomitum erumpunt, quæ in ore ventriculi & gula congesta fuerant. Infra deiciuntur humores in ventriculo intestinisque natantes. In primis quæ euomuntur, aquæ similia sunt: quæ anus effundit, stercorea, liquida, tetriq; odoris sentiuntur. Siquidem longa cruditas id malum excitauit. quod si per clysterem eluantur, primo pituitosa, mox biliosa feruntur. Initio quidem facilis morbus est, dolore vacans: postea vero tensiones in ore ventriculi & gula: tormina in ventre nascuntur. Si magis sæuiat morbus, & tormina augeſcunt, anima deficit, membra resoluitur, cibos exhorrent, animus consternatur. Si quid acceperint, cum ma-

**C** gno tumultu nausea & vomitus inuadit, tum sincere flaua bilis expellitur: deiectiones quoq; similes sunt; Nervi tenduntur, tibiarum brachiorumq; muscoli conuelluntur, digiti incuruantur. vertigo oboritur. singultiunt. ungues liuent. algent extrema. totum corpus rigore concutitur. Si malum ad vltimum venit, tum vero egrotus sudore perfunditur. bilis atra supra infraq; prorumpit. conuulsione impedita vesica lotium cohibetur; quod tamen, cum in intestina humores deriuentur, abundare non potest. voce priuantur. arteriarum pulsatus minimi sunt ac frequentissimi: cuiusmodi in Syncopa proposuimus. conatus ad vomendum perpetui ac inanes fiunt. inclinatio ad deijciendum

**D** prompta, quam Tinesmon Græci vocant: ficca tamen, nihilque succi egerens. mors demum sequitur doloribus plena & miseranda, per conuulsionem, strangulatum, & inanem vomitum. Id genus maxime æstate grassari consuevit, secundo per autumnum, minus vere, hyberno tempore minime. Inter ætates autem iuuenta, & ea, quæ robustior est, hoc ferè corripuntur: senectæ rarissime: pueri

magis, quàm senes, sed non mortifere.



## De lleo græce vocato, latine Voluulo. Cap. VI. E

**P**hlegmone in intestinis gignitur perniciosum dolorem mouens. quippe innumeri torminibus acerbissimis necantur. In hisce & frigidus flatus & lentus colligitur; nec infra, nec supra facile penetrans. Commoratur autem diu, perq; superiorum intestinorum angustos an fractus reuoluitur. vnde & affectus llei græce, latine Voluuli nomen accepit. Quod si ad tormina compressio & remollitio intestinorum ac cesserit, id vero iam Chordapfus est. quod nomen vltima parte elixationem, remollitionem ue significat. Chorde autem intestinorum vocabulum est: Lactes enim Epicordida Græci veteres nominarunt ner- **F** uos scilicet interiacentes, & vascula, & membranas: quæ intestinorum stabilimenta & fulcimina sunt. Voluuli causa est perpetua ciborum mal torum, diuerforum, inusitatorumq; corruptio: & alia super aliam cruditas. præcipue ab esu ciborum, qui Voluulum excitare consueuerunt. quale est Sepiæ atramentum in ferculis sumptum. idem existimadum de plaga est, de frigore, de frigida potione: si, dum quis sudat, eam large abundeq; ingurgitauerit. Ad hæc his Voluulus accidit, quibus intestinum cum stercore in scrotum procidit; neq; in ventrem repulsum, sed per vim retentum fuit, his inferiora intestina, phlegmone vexari solita sunt. Pueros hic affectus crebro male habet: vtpote quos sæpe crudi **G** tas inesttat. hi tamen sæpius etiam sanescunt, cum ob consuetudinem, tum ob humiditatem intestinorum; lubrica enim sunt. Senes raro afficiuntur, sed multo perniciosius. Aestas magis, quam Ver huius mali referta est: Autumnus, quam Hyems: Aestas vtrunq; superat. Multi quidem vi torminum repente intereunt: alijs intestinum suppurat, deinde nigricans tunc, & putrefactum excidit; atq; ita deficiunt. Mediocrem Voluulum hæc symptomata comitantur, dolor oberrans in stomacho, humiditas superans, exolutio, mollitia, ructus inanes, nihil proficientes. alius flatibus perstrepens, qui ad podicem vsque properant, sed ibi esitus intercluditur. Sin autē ex toto Voluulus occupet: omnia sursum **H** petunt flatus, pituita, bilis: hæc q; vomitu prodeunt. fiunt perpallidi: frigent toto corpore: acerbis dolore cruciantur: male spirant: sitiunt. Quibus vero iam iam mors instat, gelidus sudor emanat: vrina difficulter exit: anus tam arcte clausus est, vt neq; vel tenuem acum possis adigere: sterqus per os redditur: vox aboletur. arteriæ raro inter initia & parum micant: instante morte minime, creberrime; tandem micare desinunt. Hæc sunt, quæ tenuibus intestinis affectis incidunt. Verum & in pleniore intestino, quod Græci Colon vocant, eidem affectus oriuntur, eademq; symptomata eandem formam retinentia. Sed nonnulli, quibus



**A**bus colon suppurat, huiusce morbi discrimen effugiunt. causa est huiusmodi affectus carnosae intestini crassitudo. Dolor autem in gracilibus quidem intestinis tenuis est et acutus: in pleniore vero intestino est redundans humiditas, & incumbens grauitas. dolorq; modo ad costas usq; superiores ascendit, quando & speciem lateralis morbi praese fert; siquidem & isti febricitant: modo sub spurias costas in dextram aut in leuam partem descendit sic, ut iecur aut lienis dolere videantur; item & cilia nonnunquam dolore torquentur. Colon nanq; praegrande est, & quoquo versum se circūuoluens. Quidam sunt etiam, quibus et in sacro osse dolor inhaerescit, & in femoribus, & illis in locis, quibus testes appenduntur, Graeci Cremasteras appellant. Qui hoc genere tentantur, vomitione plerumque inani laborant. quod si quid reiecerint, id est subtile, biliosum, olei simile. In hoc malo periculum tanto leuius est, quanto laxum intestinum tenuibus corpulentius, pinguius, & noxae tolerantius est.

## De acutis Iecoris affectibus.

## Cap. VII.

**Q**uibus iecur male habet, hi non celerius, quam qui corde egrotant, sed maiore cruciatu perimuntur. maxima enim iecoris pars sanguinis concrementum est. Si in huius autem visceris portis aliqua incidat causa mortifera; aequae, ac si ex corde laborarent, celeriter consumuntur. Ratio in promptu est, quia videlicet haec partes membranis, tonis gracilibus & magni ad vitam momenti, grandioribusq; venis contextuntur. praeterea, ut sapientum quidam prodiderunt, hoc loco appetitricis animae domicilium est. Sanguinis utique profluvia e iecore omnium maxima fiunt: neque ab re; venarum enim radicatio iecur est. Itaq; in ipso magna vomica haud ita frequenter, neque in particulis magis praecipuis oritur. homo enim vita excedens praue nit. At exiguae frequentius eueniunt. inde fit, ut mortem quidem euadant, sed longinquo morbo impliciti crucientur. Ipsius enim functionis, qua sanguinem condit, cessatio non conceditur, neq; dilatio: atque hinc ad cor & ad viscera infra septum sanguis diffunditur. At si qua magna iniuria, ut puta verberare, longa ciborum multorum vitiosorumque corruptione, ebrietate, vehementi refrigeratione phlegmone in portis iecoris excitatur, tunc egrotus celerrime iugulatur. Ignis enim in profundo corpore depascitur, obscurus, acer. Venarum motus torpescit. Doloris species variae & diuersae sunt. Nonnunquam enim dextra in parte defigitur adeo, ut acutum telum adactum esse videatur. interdum torminibus similis est. rursus vero interdum dolor cum summa grauitate coniungitur: atq; inter dolendum virium debilitas vocisq; casus



incidit: Transuersum septum, & interna costarum tunica inferius de **E**  
trahitur. quonia inde iecur suspensum onere suo degrauat. Proinde ad  
iugulū ē regione oppositum vehemēs dolor peruenit. Tussicula quā-  
dam imperfecta, seu potius tantum ad tussim inclinatio est. si quando  
vero tussunt, nihil reddunt. vitiose spirant: neq; enim pulmōi trans-  
uersum septum opitulatur, ei ad constringendum ac dilatandum mo-  
rem gerens. paulum aeris adducunt, plus expirant. colore ex atro viri-  
diq; permixto infecti sunt, plūbea scilicet specie. cibos oderūt. q; si quid  
sumpserint, eis inflantur praeordia. ructus biliosi, acidi, graue olentes  
exeunt, nauseant, vomere frustra conātur. venter solutus multa biliosa  
excernit, viscida pauca: sed perpetuo augecūt mala. mens haud ita mul-  
tum delirat: torpida, suspensa, & attonita est. magna est in corpore se-  
gnities. extrema frigent. tremor adest, horrores, singultus: inanis, con-  
uulsioni similis, morbus regius: pura bilis. totumq; corpus bilioso colo-  
re suffunditur. Quin morbus regius ante septimū diem si apparuerit,  
plurimos sustulit. Quibus autem vel sanguinis profusio, vel per aluum  
multorum biliosorum exturbatio, vel vrina syncera plurima effluens  
mortem depulit: post tres septimanas iecur his suppurat. Quod si mul-  
tum temporis cira abscessum praetereat, in hydropem, ineuitabilem  
terminatur. hi siticulosi sunt, parum tamen bibūt. eorum corpus squal-  
let, pinguedine carens. appetūt acida, sed gustatus saporēs non percipit. **G**  
Autumnus hoc malum fert, multorum variorumq; fructuum esum se-  
quente cruditare. Inter aetates florens ei magis obnoxia est.

### De Venae Concauae acuto morbo, Cap. VIII.

**A**B Iecoris portis inter eius extrema magna vena ingreditur: quae  
semper in tenues pluresq; dum scinditur, deniq; in tenuissimas  
visumq; latentes toto iecore dispergitur. Istarum summis osculis aliae  
venarum extremitates committūtur: quae ex gracilibus & pluribus ma-  
iores amplitudine, sed numero pauciores constituūtur. Demum in me-  
dio iecore in venam vnicam grandem coalescunt. Inde haec in duas par-  
titur, quae Iecoris extrema petunt. Harum altera superius primam fi-  
bram penetrans, in eius conuexa egreditur: mox transuersum septum  
perforans, in cor inferitur. Hac vena Concaua nominatur. Altera vero  
quintam fibram, quae inferius iacet, trajiciēs vsque in iecoris gibba \* ad  
spinam peruenit: & eo loco ad coxendices vsq; porrigitur. Ea quoque  
eodem nomine Concaua nuncupatur: quoniam vna & eadem vena est  
ab initio de iecore exoriens. Si quis enim aliquid de superiore vena Ca-  
ua cordi infixā in eam, quae iuxta spinam protenditur, aut à spina per ie-  
cur ad cor velit impellere, eundem descensum ascensumq; inueniet.

\* Alias  
cōcaua.

*in hoc differt ab huius, quae  
fit in affectu pulmonis  
et thoracis:*



- A** Hæc igitur vena, (vt arbitror,) vniuersa ægritudines & acutas & validas patitur. nam tota vna est atque continua. a nonnullis autem medicis ea pars duntaxat, quæ secundum dorsum discurrit, egrotare creditur. quoniam eius, quæ cor intrat, notæ obscuræ sunt. intra pectus enim rei nulli adherens, sed in pectore subleuata protenditur, donec transfuersum septum egressa cordi inseritur. Igitur si quod ingens malum hanc venam corripiat, pectore ambiente delitescit. In hac itaque vena Cedmata oriuntur, (Sunt autem Cedmata diurni affectus ex defluxu materiæ prouenientes,) quando sanguis copiosius erumpens citissimè vitam delet: Per superiora quidem per pulmones & arteriam effluens, si in pectore fiet effractio: Si iuxta principiū, in imum ventrem descendens in intestinis continetur, atq; adeo intestina replentur. cum prius, quàm deiectus sanguis in conspectum detur, homines intereunt; & ventriculus sanguine redundat. Nascitur & circa venam phlegmone, quæ & ipsa si magna sit, celeriter hominem tollit. ignis enim acer mordaxque in ambabus cauitatibus inclusus accenditur, paucusque duntaxat foris apparet, vt tangenti flamma tenuis esse videatur: æger vero sese comburi existimat. pulsatus arteriarum exigui sunt, creberrimi, ac veluti oppressi atque repulsi. frigus adest extremorum, fitis aspera, oris siccitas: facies decolor rubet: omne corpus subrubidum.
- C** est præcordia dura sunt atque reuulsa. dolor in dextra parte maior, & cum eo palpitatio in longitudinem ad ilia vsque perueniens. quibusdam & arteria secundum dorsum inflammatur: quod pulsatio in alteris præcordijs manifestat. nam & ipsa venæ caue in orborum particeps efficitur iuxta illam in sinistro latere posita, vtpotè ea, quæ in omne corpus diducitur, nihil leuaminis afferente, neque cutim emolliente. cutis autem sic affectorum squallida, rugosa, atque aspera est: sed in partibus prominentibus atque osseis, vt in cubitis, genubus, digitorumque articulis magis talis conspicitur. somni tumultuosi fiunt. alius quibusdam nihil reddit, quibusdam exiguum, acre, biliosum. lotium \* acre mordaxque est. mens utique his constat, sed quadam fegnitie torpet, & corpus tabe consumitur. tum quotquot hunc habitum viderunt, eum Causi, idest, ardoris speciem appellarunt. quando quidem quæ adsunt, sub ardoris genere collocantur. Per Autumnum hæc labes exoritur, cum ferum quiddam & immane sapit. Viros ac iuuenes occupat, quibus mala viuendi ratio, laboresque tenuem corporis habitum compararunt. Decimoquarto die hi plerunque moriuntur. quibus morbus diutius trahitur, duplo longiori tempore pereunt. Quotcunque autem aut ab initio pusillam phlegmonem habent, aut magnam paulatim remittentem; mortem quidem euadunt, sed non-

\* Alias  
fluuum.



dum morbo liberantur. Hi longo sanè tempore causo laborant, verum **E** omnia periculosa iam desinunt, dolores, præcordiorum distentiones, & pulsuum malitia, & mentis ignauia. adhuc tamen fastidiosi sunt, languentes, consilij inopes; simulque & ardor, & sitis, & linguæ orisq; ficitas egrum discruciant. multum diuq; trahentes spirant. & subito totum acrem vna spiratione refrigerandi causa adducunt. Verum si frigidam quamplurimam affatim bibunt, breui interuallo molestia leuantur. postmodum ipsis sitis accenditur: rursusq; vberime aquam ingurgitant. & hæc est mali successio & reciprocatio. At egregius medicus, frigidam liberaliter citra noxam propinare potest: ut in alijs ardoribus assoleat. sed longe tutius ardore a vena cava oriente **F** laborantibus eam concesserit. Quod si ventriculus aut vesica potam aquam expellant, neque vomitione opus est: sin id facere nequeant, à multa frigida epota multum vomendum est. homo enim disrumperetur, si tanto bibito humore nihil aut per sudores, aut per urinam, aut per ventrem effunderet.

### De Renum acutis affectibus. Cap. IX.

**R**enes quantum ad corporis speciem attinet, haud ita multum periculis patent; tamen si in aliquod acutum vitium incidunt: glandulosa enim ipsorum natura est. ad mortem vero inferendam bene habiles sunt: ipsorum enim actio peropportuna est, urinæ videlicet à sanguine secretio, eiusdemq; expulsio. sed eam cohibet aut calculus, aut ingenita phlegmone, aut sanguineum concrementum, aut id genus. quando quidem ex consensu affectionis ob formam corporis prouenientis nulla creatur offensio. Urinæ autem interclusio omnia sæua & acerba facit, ignem acrem & fastidium inferentem, dolorem grauem secundum lumbos in dorso, partium distentionem, sed magis circa præcordia. Suppressio autem lotij non ex toto fit, sed stillatim quidem meiunt, multum vero effundere cupiunt. redundant enim sentiunt. Quod si & acre mordaxq; lotium inest, frigent, **H** tremunt, conuelluntur, distenduntur præcordia & replentur. Hæc morbi forma perceptioq; doloris alui inflationi à ciborum multitudine corruptioneque prouenienti similis est. Pulsus initio rari sunt ac segnes: si malum plus vrgeat, parui fiunt, crebri, turbulenti, inordinati. somni tenues dolore vexati, non continui: sed repente à somno perinde ac si quis pupugerit, prosiliunt: postea in soporem tanquam lassitudine oppressi delabuntur. mentis alienatio haud ita magna est: nugantur, facies liuet. At si quando rursus meiendi auiditas redeat, cum distentionibus magnisq; doloribus modicum quiddam, idq; stillatim



**A** latim eijciunt. tum paulum cruciatibus leuantur, postmodum in eadem relabuntur. Inter hos illi celerrime pereunt, qui nihil prorsus emittunt. Quicunque vero non moriuntur, (plures enim liberantur) hi aut calculo in vesicam per vrinae semitas delapso, aut plegmone suppurante, paulatimue per difflationem exhalate discrimen euadut. quamquam enim paulatim & auare effundatur vrina, mortem tamen facile effugiunt: at longo temporis curriculo eorum habitus contabescit, atque iure ista ægrotantes patiuntur, in peiusque labentes ad colliquationem deuoluuntur. Anni vero tempora, loca, ætates hunc morbum ferunt, quæ & in vena caua laborante ferebant. Nonnunquam è renibus sanguis multus subitaneus erupit, multisque diebus continentur effluit: verum nemo ex huiusmodi profluuiio moritur: sed phlegmones ratione, quæ simul cum profluuiio nascitur, & sanguinem coercet. plerunque autem ex retentione, quam ingens phlegmone facit, moriuntur.

## De Acutis in Vesica ægritudinibus. Cap. X.

**V**esica difficiles in acutis morbis dolores patitur, & si ab alijs vitium participet: difficiliore, magisque mortiferos, si per se laborare inceperit. quandoquidem omni corpori & neruis & menti labem comunicare valentissime potest. Quippe vesica neruus frigidus calbusque est, & ab innato calido quamlongissime, quamproxime vero externo frigori posita. Nam in imo sacro ventre ad aures thoracis sita est. nobili quoque munere fungitur, vrinae videlicet emissionem. Hæc porro si tantum calculis, aut sanguinis grummi, aut qua alia propria, peregrinaue calamitate interclusa fuerit, perniciosum est. In mulieribus enim ipsis & vteri phlegmonas comprimit, in viris autem extremum rectum prelongumque intestinum. In plerisque vero ob inuoluntariam præ verecundia retentionem in cœtibus hominum, aut in conuiuijs repleta distenditur, constringereque non valens nihil amplius excernit. Igitur vbi vrina supprimitur, superiores quoque partes, **D**renes videlicet, replentur: vrinae ductus, (græci Vreteras appellant,) distenduntur: ilia dolor ponderosus infestat: nerui conuelluntur: tremunt: horrent: desipiunt. Verum si ad hæc & vlceris accedat, & inflammatio, multa sanè damna eueniunt: Sed mors vlceribus sanè quamce-  
 lerior inuadit. Caterum de ulceribus, abscessu, suppuratione, & id genus alijs, quæcunque non acutissima sunt, in libro de longinquis morbis tractabitur. Quæcunque vero peracuta sunt, & intra quatuordecim dies, aut paulo citius seriusve hominem perimunt, qualis phlegmone est, aut grummi sanguinei, aut calculus in ceruicem delapsus; de istis in præsentia sermonem faciam. Quapropter si quid horum inci-

D



derit, vrina retinetur: abdomen intumescit: dolor acutus totum ven- **E**  
 trem occupat. vesica turget: decimo die luteis sudor exit: pituita vo-  
 mitur primo, deinde bilis: vniuersum corpus friget, sed pedes vehe-  
 mentius. Si malum vires maiores acquirat, tum febres cum singultu ho-  
 minem corripiunt: micant arteriae inordinatis, frequentibus, ac pusil-  
 lis motibus: rubida facies est: sitiunt: animo ancipites sunt: mens non  
 constat: nerui contrahuntur. Medicamentis praeterea venenosus, & can-  
 tharidibus, aut bupreste & pneumatibus vesica deurit: & tota alius  
 maiorem vim patitur: ac prorsus in peiorem statum delabatur: neq;  
 longa mortis mora interponitur. Nonnunquam & sanguinem vesi- **F**  
 ca effundit. flauus autem ac tenuis vesicae sanguis est. Sed perraro hac  
 de causa homines pereunt, quamuis haud facile sanguis supprimitur.  
 Grumi vero & phlegmonae minantur interitum. refrigeratio enim et  
 extinctio caloris ingenti sequitur, quae Necrosis graece dicitur, & gā-  
 grana, & quae eam comitantur mala. Id genus facile hominem tollit.  
 Haec vitia hyeme & Autumno grassantur. In aetate virili, magis etiā  
 in senectā vigent. Reliqua anni tempora & aetates neque assidue hos  
 morbos ferunt, minimeque mortiferi sunt. Pueri omnium maxime  
 his calamitatibus vacant.

De Vuluae strangulatu. Cap. XI.

**I**N medijs ilibus mulierum Vulua posita est, muliebres viscus, ani- **G**  
 malis ferme naturam adeptum. Siquidem per se huc atque illuc ver-  
 sus ilia mouetur: quin etiam ad superiora è regione pectoris cartilagi-  
 nem subit: in latera quoque in dextram videlicet, aut leuam partem,  
 aut ad iecur, aliavè intestina mouetur: & ad inferiora natura procliui-  
 or est. utque paucis absoluam, penitus errabunda est, & iucundis odo-  
 ribus delectatur, ad ipsosque se recipit: contra foede olentibus contri-  
 statur, & ab ipsis longius se proripit. ac prorsus est in homine vulua per  
 inde, atq; in animali quoddam animal. Haec itaque si repente superio- **H**  
 ra petierit, ac diutius ibi commoretur, visceribusque violenter incum-  
 bat; interdum homo veluti comitiali morbo correpta citra neruorum  
 distentiones strangulatur. angustijs nanque iecur, transuersum septū,  
 pulmones, cor celeriter opprimuntur. Qua de causa spiritus priuatio,  
 imbecilitasque adesse videntur. Praeterea & venae somniferae, (Caroti-  
 das graeci vocant,) cordis vitium participantes, affliguntur. vnde capi-  
 tis grauitates & sensuum abolitio cum nouo quodam sopore adue-  
 niunt. Incidit etiam ipsis aliud vitium proxime dicto non absimile: in  
 quo spiritus & vox auferuntur: sed à vulua non prouenit. quippe & vi-  
 ros infestat iustar morbi, quem Catochon nominant. At mulieribus



- A** à vulua malè habentibus tetra odora menta naribus subiecta, iucunda verò naturalibus apposita opitulantur. altero autè affectu laborantibus hæc frustra adhibentur: nihilq; opis afferunt. Præterea membra in vulua morbo agitantur, in altero affectu quiescunt. Amplius tremores spontini, & non spontini, sed ex ambrôthriæ subiectione excitantur. vuluæ refrigerationes vehementes, copiosæ sanguinis profusionis retentio, & id genus alia in causa sunt. Itaq; si in superiora subeunte vulua vexari mulier inceperit, ad obeunda negotia pigrior redditur: exoluitur infirmatur: genua labant: vertigo infestat: extrema debilitantur: caput dolet, grauescitq; in venis ab utroq; nasi latere iacentibus dolorem mulier percipit: quòd si ceciderit, stomacho mordetur, iuxta præcordia ilia, vbi vuluæ domicilium est, inania sunt. motus arteriarum intermittunt, ordine carent, deficiunt. spiritus magnoperè angitur. vox intercipitur. sentiendi facultas impeditur. spiratio ignota obscuraque est. celerissima nec opinatò mors aduenit. nihil enim adest, quod mortem instare significet. color namq; viuus est, ac multo post mortem tempore magis rubent. oculi parum admodum extantes fulgent, haud ita multum intenti, neq; tamen valde remissi & coniucentes. Ceterum si prius, quam malum ad extremum venerit, aliquando vulua in sedem propriam migret, à strangulatione liberantur. quando aluus submurmurat: humiditas adest locorum muliebrium: spiritus asperior manifestiorque redditur. nequaquam tamen ab affectu excitantur, aut subleuantur. imò quàm celerrimè interitus aduenit. nam facillè superiora vulua petit: facillè quoque inde recedit. Quippe vulua suapte natura superfuit. membranæ verò eam sustinentes humidae sunt: humidus est & locus, vbi reconditur. Amplius fuga & apparentia tristium iucundorumque mouetur. quo circa labascit facile, ac veluti arboris ramus huc & illuc, susque deque impellitur. Propterea & iuuenes foeminae id vitij patiuntur, seniores immunes sunt. Quibus enim ætas, & vita, & mens vaga magis & erratica est; his vulua quoque errabunda instabilisque sit necesse est: Quibus verò firma ac stabilis ætas, & vita, & mens fuerit; his & vulua similiter afficitur. Hæc utique à vulua proueniens ægritudo (strangulatus videlicet) mulieribus duntaxat infesta esse potest. Verum tamen còmunes quoq; viris ægritudines in vulua oriari còsueuerunt, phlegmone videlicet, & sanguinis profusio. còmunes etiam sunt, quæ comitantur, notæ. utpote febres, pulsus abolitio, refrigeratio, vocis amissio. In sanguinis autem profusione & maturius mors ingruit, quemadmodum cum quis animal iugulat.



## De Satyriasi. Cap. XII.

**S**atyri Dionysio sacri, qui pictura, quiq; statu is exprimentur, arre-  
cto pene figurantur. quod diuinę rei signum est. Est verò & affe-  
ctus species, qui laborantis penē excitat erigitq; atq; ob Dei figurę simi-  
litudinem Satyriasis nūcupatur. Est autem inexplēbilis coeundi appe-  
titus. Verū neq; si ad veneris opus accedant, quicquā iuuantur: neque  
multo assiduoq; cōcubitu sedatur arrectio. Conuulsiones autem om-  
niū neruorū fiunt, & tendonū distētio, & inguinū, partisq; eius, q̄ inter  
inguina & fēmen est, Plechada gręci nomināt, genitaliū p̄terea inflā-  
matio & dolor. in facie rubor inest, & vapor quidā roscidę humiditati  
similis. porro ipsi egri sese incuruāt & cōprimunt: quiescunt tristes, de-  
missi, vt potē calamitatē suā grauati ferētes. Quod si hoīs verecūdiā  
id malū superet, turpiter admodū lingua intēperantes efficiūtur: Intē-  
perantes quoq; in aluo exonerāda, in venerē lasciuientes, mēteq; inde-  
center titubātes. nā se cōtinere nequeūt. siti laborāt. pituitā largiūs euo-  
munt: qm̄ labris spuma, quē admodū hircis in libidinē ruētibus, isidet.  
q̄netiā haud absimilis odor est. lotiū post longā retentionē effunditur  
album, crassum, geniturę simile. aluus resolutur, costę & axillę spōte  
pruriūt ac titillātur. cōuellūtur: à cibis abhorrēt: sed cū eos assumūt, ra-  
paciter assumūt. cōturbātur. Sin ad interitū agritudo spectat, inflātur,  
venterq; in tumorē effertur. tendones & lacerti oēs cōtenduntur: agrē  
admodū corpus mouetur. membra cōtrahuntur. arteriæ paruo motu,  
debili, inordinatoq; agitātur. Hęc omnia quādoq; discutiūtur, si aluus  
perturbata multas pituitosas biliosasq; humiditates eiecerit: easdem  
quoq; vomitus nō absq; discrimine effuderit. Nempe medela nō vacat  
discrimine, ea per somnū profundū longissimūq; prætatur. Si quidē  
refrigeratio & resolutio stuporq; neruorum multus somnus est: stupor  
verò ac refrigeratio satyriasi medicatur. Id morbi genus vere potis-  
simū atq; æstate sēuire cōsueuit. Inter ætates autē adulescentia iuuen-  
tusq; ei maximē patet: p̄cipueq; illi omnes, quorum natura in venerem  
propensior est. Acutissimū id malū, triste fœdūq; est. nam plerūq; in  
septima die hominē cōsumit. Memoriae proditum est mulieres etiā in  
hanc labem incidere, & eundē in libidinē impetum, ac cetera oīa simi-  
lia perpēti. Verū ego impudicū quendā libidinis ardorē mulieres inua-  
dere mihi persuadeo, mulieres in quā humiditate assuētes, vt ipsius re-  
dundātia pfundatur: sed satyriasi id esse minimē cōcesserim. Neque  
enim ipsarū natura atq; tēperies; cū frigida sit, huic vitio habilis atq; ex-  
posita est. p̄terea neq; partes ad arrectionē idoneas, quē admodū Saty-  
rus, vnde affectui nomē est inditū, mulier obtinet. Quandoquidē neq;  
viri strangulationē ab vtero vexantur: qm̄ viro vterus datus non est.



# ARETAEI CAPPADOCIS

DE CAUSIS ET NOTIS DIUTVR

NORVM AFFECTVVM

Liber Primus.

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

De Longis affectibus. Cap. I.

De Cephalæa. Cap. II.

De Vertiginosis. Cap. III.

De Morbo comitiali. Cap. IIII.

De Melancholia. Cap. V.

De Furore. Cap. VI.

De Resolutione neruorum. Cap. VII.

De Phthisi. Cap. VIII.

De Suppuratione in pectore. Cap. IX.

De Vomica pulmonis. Cap. X.

De Anhelitu. Cap. XI.

De Pulmonarijs. Cap. XII.

De Iecore. Cap. XIII.

De Liene. Cap. XIIIII.

De Morbo Regio. Cap. XV.

De Cachexia, idest malo corporis habitu. Cap. XVI.

De Diuturnis affectibus, Proœmium. Cap. I.



Diuturnarum egritudinũ dolor multus est, tempus colli-  
quationis longum, & medicatio instabilis. vel enim  
haud ex toto deleti sunt, vel ex qualibet leui offensa  
morbi deleti reuertuntur. Nam laborantes æquo ani-  
mo ferre vsq; in finem non audent. quin etiam si æquo  
animo ferunt, in victus ratione nimis longa delinquant. Si verò & do-  
lor adest, laboriosa curatione per sitim, famem, amara medicamina, &  
dolorem excitãtia, aut per sectionem, aut vstionem, quibus in diutur-  
nis morbis egemus, miseri ægroti cruciantur: vt mortem, quã iam pri-  
dem appetebant, effugiant. vbi me hercule in magna animi constantia



diu præstanda, auxilijs variandis, iucundis citrà noxam ægro conceden- E  
dis, ipsoq; decipiēdo medici virtus atq; excellentia dignoscitur. Cate-  
rùm & eger fortis sit, & cum medico aduersus morbum conspiret, ne-  
cesse est. qui nō solum corpus tenaciter arripiens ipsum celeriter tabe-  
facit & exedit: verùm etiam sensum magnoperè subuertit, animamq;  
insanam reddit. Nanq; ab intemperie corporis id genus furorem, atq;  
insaniam, quam græci Melancholiam vocant, proficisci nouimus. de  
quibus in sequentibus dicam. in præsentia de Cephalæa, idest, de vete-  
re capitis dolore sermonem instituiam.

## De Cephalæa. Cap. II.

F  
**S**I caput repente obuia quaq; de causa, per plures etiam dies dolorē  
patitur, hic affectus Cephalalgia græcè nominatur: si multo tem-  
pore dolor infestare asueuit, & per longos, frequentesq; circuitus, ac  
in dies maior violentiorq; insultat difficulter sanationem admittens;  
id genus Cephalæam græco vocabulo appellamus. Eius formę infinite  
sunt. quiquidam enim perpetuus dolor inhæret, exiguus quidem, sed  
non intermittens. nonnullis per circuitus reuertitur, vt his, qui quoti-  
diana intermittente febricitant. nonnullis ab occasu solis vsq; in meri-  
diem: & tunc ex toto remittitur. vel à meridie in vespem, aut etiam  
vltius vsque in noctem permanet: sed non multum hæc durat circui- G  
tio. Præterea dolor modò est in toto capite, modò in dextra magis, mo-  
dò in sinistra, modò circa frontem, aut synciput. hæc q; eodem die in-  
certè & erraticè fieri solent. Quidam dextra tantum parte dolent. qui-  
dam leua: qua tempus, vel auris, vel supercilium unum, uel oculus ad  
medium usque terminatur, uel qua nasus in æquas partes diuidit. ultra  
quem terminum dolor non progreditur, dimidiū tantum capitis oc-  
cupans. Id vitium solum Eterocrania dicitur, haud leue malum: quā-  
uis intermittit, quāuis exiguum esse prima specie uidetur. nam si acu-  
tè interdum impetum faciat, scæda atq; atrocia detrimenta affert. ner-  
ui distenduntur, facies obtorquetur. oculi uel contenti instar cornu ri- H  
gidi sunt: uel huc, atque illuc interius conuelluntur, ac uertiginosè agi-  
tantur. in ipsisq; dolor profundus usque ad intimas tunicas descendit.  
sudor extendonibus immodicus effluit repente: neque cohiberi po-  
test: neque vlla causa præcessit, perinde ac, si quis ligno plagam inflixerit.  
nausea & vomitus biliosus comitantur: homo consistere nequit,  
sed in terram delabitur. Quòd si vitium quādoq; increfcit, de hominis  
vita actum est. At si debilius est, & citrà vitæ periculum, diutius perma-  
net: pigritia multa adest, & capitis grauitas: animi pendent vitam ægrè  
ferunt. fugiunt enim quodam modo lucem, tenebraque his ægritudi-



**A**nem solantur; neque quicquam iucundi, aut intueri, aut audire sustinet. olfactorius in ijs sensus infectus est, neque quicquam eos bene olens oblectat; pariter quoque graue olentia detestantur. vita ipsis inuisa est, mortemque discipiunt. Harum calamitatum fons & origo est cum ariditate frigiditas. Si diu teneat, magisque inualecat ægritudo; post id genus dolores vertigo subsequitur.

## De Vertigine. Cap. III.

**S**i tenebrę oculis prætenduntur, & caput in turbinis modum circumduci videtur, & auribus murmur veluti delabentis cum strepitu fluminis insonat, aut tanquam ventus flatu vela percutiens, aut tibiæ fistularumque cantus, aut veluti stridor plaustris currentis obstrepat; vertigo huic vitio vocabulum est. malum quidem, si capitis symptoma est; malum quoque, si cephalę successit, aut ex ea vetusta ægritudine ortum est. Nam si priora vitia non recesserunt, sed remanet Scotodine, id est, tenebrę oculorum, & apparens motus in orbem, aut longiori tempore cum proprijs symptomatibus nulla adhibita curatione ad summum peruenit; vitium, quod à gręcis Scotoma dicitur, à latinis Vertigo, procreatur. Causam habet frigidam & humidam; aliorumque sæpe morborum, cum insanabilis euasit, initium est, ut furoris, melancholicę, morbi comitialis cuique suis symptomatibus accedentibus. Vertiginis autem forma ita se habet. grauitas adest capitis. splendida quedam oculis inter multas tenebras sese offerit. suimet æger propinquorumque ignarus est. Cumque morbus augetur, tunc tibię soluuntur, atque humi repunt. Nausea fit, atque vomitus pituitę, bilisve tam atrę, quam flauę. quando flaua per vomitum reiecta furor enascitur: atra vero, melancholia; ac pituita exeunte, morbus comitialis efficitur. Omniū quippe morborum talis conuersio est.

## De Morbo comitali. Cap. IIII.

**V**arium ac portentosum morbi genus est Epilepsia, quę dicitur à gręcis, latine Comitialis morbus. terribilis utique in accessionibus, & peracutus, & perniciosus: quando quidem nonnunquam accessio vna hominem rapuit. At si diligenti cura vim morbi sustinet laborans, ægre tamen vitam ducit inter fœditates, ignominias atque dolores. Morbus autem non facile recedit, sed ætatibus melioribus, & pulchriori tempore viget. vexat etiam pueros & adolescentes. interdum secunda fortuna euenit, ut per succedentem prouectiorem ætatem abigatur. quando simul cum ætatis flore euanescit: Sed & tum quosdam abiens deformes efficit, pueros quoque pulchritudinis inuidia perdit, aut ma-



num inutilem reddens, aut faciem torquens, aut sensum aliquem prorsus auferens. Quod si malum hoc penitus infederit, atque radices altius egerit; neque ipsum medicus, neque ætatis mutatio submouent, sed cum ægrotante viuit atque commoritur. Interdum morbus iste membra oculosque conuellens ac distorquens, dolores ciet: interdum & mentem in furorem adegit. Triste mediis fidius est ipsius inuasionis spectaculum: turpis & eius desinentia cum stercore, & lotio, & spontina ventris solutione. Ipsius quoque morbi origo mirabilis, & præter hominum opinionem est: Quippe nonnulli flagitiosis hominibus à luna immitti existimant: cuius rei causa & sacrum morbum hunc nominant. Verum & alijs rationibus id nomen ei fuit impositum: aut ob magnitudinem, oë enim magnum, sacrum dici consuevit: aut quod non humana ope tolli queat, sed diuina: aut quoniam demone correptus esse homo videatur: aut ob hæc simul omnia sacer morbus appellatus est. Quæcunque sane huic tanquam acuto morbo symptomata eueniunt, superius memorauimus. At si diu permanet; neque per intermissiones citra noxam degunt torpentes, abiecti animo, mœsti, hominum aspectum consuetudinemque vitantes; neque ætate procedente mitiores fiunt. vigilant. per quietem multis formidolosis imaginibus terrentur. cibum sumere fastidiunt, sumptum male conficiunt. decolores, facieque plúbea sunt. ob ingenij sensusque tarditatem ægre discunt. auditus hebet. aures tinniunt. G capiti bombi veluti quidam insonant. Lingua in sermone perplexa est ac titubat, aut ex vi morbi, aut ob vulnera, quæ tẽpore exacerbationis accepit. tunc enim ob conuulsionis neruorum motũ lingua in ore varijs modis torquetur. Rationem quoque usque eo morbus conturbat ac deijcit, vt prorsus denique infatuentur. Atque horum omnium causa est cum humiditate frigiditas.

## De Melancholia. Cap. V.

A Tra bilis in acutis ægritudinibus si in superioribus apparet, opido quàm mortifera est: si ad inferiora descendens exijt, non H valde vacat discrimine. In tardis autem longisque morbis, si ad aluũ bilis atra decurrit, in tormina iecorisque dolorẽ finitur: Mulieribus vero purgatio vice mensium aduenit, si in cæteris abest mortis periculum. At si superius, vt puta stomachum, septumue transuersum petit; insaniam parit, quam græci Melancholiam nominant. flatum namque gignit, & ructus foetidos piscium odorem exhalantes. infra vero & flatus cum crepitu transmittit: nec non & mentem simul alienat. Proinde melacholicos iuxta & flatuosos medici veteres sic affectos appellarunt. Porro quidam reperiuntur, in quibus neque flatus, neque bilis atra colligitur: sed ira immoderata,



**A** immoderata, & moeror, & ingens animi cōsternatio. hos quoq; nihilo minus Melācholicos nuucupamus. Bilem quidem in istis redundare iracundia significat, atram vero bilem, iracundiæ vehementia ac feritas. testis autem Homerus est, vbi inquit, Inter hos autem surrexit heros atrides late imperans Agamemnon tristis, furore autem valde præcordia atra circum oppleta erant. eiusq; oculi igni fulgenti similes erāt. Tales euadunt Melancholici, cū ab hoc malo interimuntur. Est autem animi angor in vna cogitatione defixus atque inhærens absque febre. Mihi profecto Melancholia Maniæ, (quæ latine Furor dicitur), initium atq; pars esse videtur. Siquidem furentibus animus modo ad excādescēntiam, modo ad voluptatē cōuertitur. At melancholici in tristitia & animi angore duntaxat versantur. Furentes etiam plurimum vitæ sic transeunt desipientes, & fœda atrociasque committentes. Melancholici vero non vna tantum insanix specie laborant: sed aut venenum ne sibi detur, suspicantur: aut hominum cōsuetudinem perosi, in solitudinem aufugiunt: aut ad superstitosam religionem conuertuntur: aut lucem hanc vitamque odio prosequuntur. Verum si quid interdum ex animi angore laxamenti habeant, exhilaratio voluptasque plurimis aduenit. Hi vero in furem præcipitant. Sed quomodo quibusque sedibus affectis id vitium plerunque contrahitur, subiiciā. Porro si in præcordijs residet, causa circa septum transversum immoratur, bilisq; supra infrave melancholicis prorumpit. Si caput etiam per consensum afficitur: & excādescēntiæ delirium in risum hilaritatemq; per longum vitæ spatium commutatur: hi vero morbi potius magnitudine, quā affectus dolore in furem prolabantur. In vtrisque nimirum ariditas accusanda. Viri sanè & furore & melancholia corripiuntur: rarius autem, quā viri, sed deterius mulieres furij agitantur. Aetas, quæ prope statum est, & ipse status huic malo subiiciuntur. Aestatis tempus & autumnus hunc morbum procreant, ver autem iudicat. Inter notas euidentiores hæ sunt, quod videlicet, quieti aut tristes, \* alias tristitiæ.

**D** abiecti, torpentesq; sunt absq; ratione: nullaque de causa melancholia initium sumit, præterea in iram facile incidunt, male sunt animati, vigilant, ex somnis tumultuose excitantur. ingenti quoque pauore trepidant, cū morbus cremētum suscipit. quando & insomnia vera sunt, terribilia atque euidentia. quotquot enim à naturali statu valde aliena sunt, ea non protinus huic malo insunt, sed per quietem sese offerunt: cū in aliquid impetu rapti sunt, postea facile eos poenitet. mutabiles sunt, turpes, de minimis quibusque solliciti, auari, sed non ita multo post simplices, prodigi, multa largientes, non virtute animi, sed morbi varietate. Quod si malum exasperatur, homines oderunt, ab eisque fu-

E



giunt. de inanibus conqueruntur. vitæ maledicentes, mortem expectant. Atque istorum multis sensus ac mens usque eo stupore fatuitateque capiuntur, ut omnium ignari, sui que met immemores in morem bestiarum vitam degant. corporis quoque habitus in peius labitur: colore foedo, & ex atro viridi que commixto tinguntur: nisi inferius bilis descendat atque exeat, sed quoquo versum per corpus cum sanguine diffundatur. multi cibi capaces, nihilominus tamen extenuati sunt. quoniam somnus in eis neque potu, neque cibo membra confirmat, sed vigilia ad exterius mouet, ac dissipat. proinde & aluus arida est, nihil deiciens. nonnunquam vero deiecit sicca, rotunda, atro quodam biliosoque circumfusa. vrina pauca redditur, acris, biliosa. multum flatuosi spiritus in præcordijs est. ructus putidi feruntur, graue olentes perinde, ac si ex maris lacuna exhalarent. nonnunquam & humidum quoddam acrum bile reijciunt. arteriarum motus ferè parui sunt, pigri, inualidi, crebri, frigori similes. Fama est, ex his quempiam insanabiliter se habere, cum puellam deperiret, medicis nihil proficientibus ab amore fuisse sanatum. Ego vero suspicor, eum ab initio in puellam exarsisse, inde tristem, & languenti animo, quod ea non potiretur, euasisse, suisque popularibus melancholicum visum esse. at iste ubi puellam amata se coniunxit, moestitia recessit: ira, & animi langor discussus est: gaudium tristitiam deleuit: & mens amore medico prorsum sanata est.

\* Aliter affectui.

### De Furore. Cap. VI.

**F**uroris modi specie permulti sunt, genere tantum vnus. est enim ex toto mentis alienatio diuturna, vacans febris. Etenim si febris quandoque coniungitur, id non ratione furoris proprie, sed alio quouis casu incidit. Quippe & vinum mentem inflamat, & per ebrietatem delirare cogit. præterea quædam esculenta amentiam pariunt, ut mandragora & altercus. sed neutiquam hi inter furentes numerandi sunt. nam repente hæc adueniunt, & celeriter conquiescunt: furor autem stabilis ac permanens est. Furori autem nihil simile delirium habet, quod senectæ calamitas est. Est enim sensus, mentis, rationisque marcor & ignauia ex refrigeratione proueniens. At furor ex calida sicque causa exoritur, functionesque tumultuosas præstat. Deliramentum autem à senectute incipiens, nunquam per intervalla desinit, simulque commoritur: Furor vero & intermittit, & diligenti curatione radicitus vellitur. Sed intermissio non sincera est, quando per se furor desinit: cum non congruenter aut medela, aut temporis anni clementia curatur. Nonnullos nanque, qui penitus soluti morbo videbantur, aut veris tempus, aut error in victu, aut ira casu aliquo prorritata denuo



- A** ad furorem reuocauit. Porro illi huic vitio facile patet, qui natura sunt iracundi, acriter excandescentes, negotiosi, faciles, hilares: qui iocosos, puerilibusque delectantur. Illi etiam, qui contrario his sunt ingenio, quicunque videlicet stupidi sunt, tristes, tardi in discendo, in laboribus perseuerantes, et qui cum demum quid didicerunt, facile obliuioni tradunt, hi & melancholia promptius capiuntur, qui & antea in furorem procidunt. Verum & in aetatibus, quibus calor & sanguis multus est, hi furore exagitantur, ut puberes, iuuenes, & viri. In quibus autem calor ex atra bile accenditur, corporisq; habitus ad ariditatem vergit, his in melancholiam cadere facillimum est. Item victus ratio, multi cibi
- B** assumptio, saturitas immodica, ebrietas, luxuria, veneris appetentia hanc egritudinem concitant. Nonnunquam & mulieres, nisi munde tur corpus, furor infestat: cum ipsarum vteri ad virilem congressum apti euaserunt. aliae vero haud ita facile, sed admodum acerbe in furorem aguntur. Cause tales sunt, vir nimirum furiosus fit, si consuetus sanguinis exitus, aut bilis, aut sudoris, aliqua de causa repressus est. Et quibus furor voluptati est, rident, ludunt, saltant die noctuque: irascuntur palam: nonnunquam coronati incedunt, ac si ex aliquo certamine victores redeant: quibus obuiam fiunt, non sunt infesti. ita se habet huiusmodi furoris species. Alij vero ab ira furentes nonnunquam sibi vestes prosciderunt, & seruos interfecerunt, & sibi ipsis manus intulerunt, & obuios quosque male habuerunt. Species utique infinite sunt. Ingenio si, namque ac dociles Astronomiam callent sine doctore: Philosophiaque possident a nemine traditam: Poeticam quoque veluti a musis infusam norunt. Aliquid enim & in morbis emolumenti prebet docilitas. Rudes autem atque indocti homines hoc malo circumuenti grauium pondera ferunt: figulinam exercent, aut fabilem: aut lapides celant. Præterea & monstrosa quedam cogitant. Timebat enim quispiam ne vasa olearia prociderent: Alius non bibebat, se laterem esse existimans, ne humore dissolueretur, pertimescens. Id etiam fama diuulgat, carpentarius quidam olim fuit, cum domi esset, prudens operator: ligna bene metiebatur, scindebat, complanabat, clauis iungebat, aptabatque. in domo extruenda sobrius cum exactoribus operum versabatur, paciscebatur, pro laboribus iustam mercedem poscebat. porro iste in loco, ubi arte suaungebatur, mente constabat: at si in forum quandoque discederet, ad balneum, aut ad aliud quippiam necessarium; instrumenta depolens primo suspirabat, deinde egrediens humeros constringebat: postea cum esset seruorum, fabricæ, locique illius conspectu abiisset, tum penitus insaniebat, & furore rapiebatur. quod si ad eundem locum celeriter recurisset, iterum ad se redibat. Hæc erat inter locum illum & viri

E ij



mentem cognatio. Causa morbi huius in capite. præcordijsque conti- **E**  
 netur: modo utroque membro pariter laborare incipiente, modo alte-  
 rum altero inuicem lædente. Verum præcipua furoris & melancholiæ  
 sedes viscera sunt. quemadmodum caput & sensus in phreniticis ple-  
 runq; laborant. in quibus vis sensoria oblesæ est; & quæ non adsunt, tã-  
 quam iam præsentia conspiciunt: & alijs nõ conspicua, ipsorum sese o-  
 culis repræsentant. At furentes tantummodo vident, quæ videre oportet;  
 sed de illis non sentiunt, ut sentiendum est. Itaque si magnum est  
 malum, promptiore ingenio sunt, sensibus acutiores fiunt, suspitiosi  
 sunt, iracundi nulla de causa, moerentes præter rationem, cum in feue-  
 rum & tetricum furor vertitur. cum vero ad animi hilaritatem incli- **E**  
 nat, læti & alacres fiunt. prius dicti sine lædente causa vigilant. utrisque  
 visio deprauata est. capitis dolor, aut saltem grauitas comitatur. auditu  
 prompti sunt, mente tardissimi. in quibusdam sanè peculiariter sonant  
 aures, & bombis adeo perstrepunt; ut tubarum fistularumq; voces au-  
 dire sese existiment. idq; fit, cum morbus crementum accepit. multo  
 vento instantur, anxij sunt, in fumendo cibo voraces atque auidi. vigi-  
 lant enim, & vigiliam famem fuscitat. verum neque, ut ægri solent, e-  
 maciantur: sed magis peculiaris melancholicis corpulentia est: item pal-  
 lóre quodam suffunduntur. Si quod autem viscerum phlegmone inua-  
 ferit, tunc appetentia nutritiove hebetatur. oculi caui fiunt, non cõ- **G**  
 niuentes: ob quos cœruleæ atræque imagines sese obijciunt, si ad melan-  
 choliæ affectus vergit: sed rubicundiora & punicea visa sunt, si ad fu-  
 rorem inclinatur. plerisque etiam tanquam fulgurans ignis apparet, pa-  
 uorq; eos veluti instantis fulminis occupat. nonnullis vero & rubent  
 oculi, & sanguine suffusi sunt. In summo ægritudinis impetu varijs se-  
 cundum quietem visis perturbantur, immoderateque venerem concu-  
 piscunt. neque eos etiam in publico ventrem exonerare pudet. ad mu-  
 tua & familiaria colloquia pigri sunt. commonefacti & increpiti ad  
 iram excitantur, atque furore penitus insaniunt. Exinde alius alio mo-  
 do furit, quidam immensum spatium decurrunt: & quo peruenturi **H**  
 sint, nescientes; eodem, vnde discesserant, cursu feruntur: Alij per lon-  
 gum iter eos, quibus forte occurrerint, comitantur. Item nonnulli vo-  
 ciferantur, latrocinium, aut vim illatam querentes. Alij ab hominum  
 conspectu in solitudines fugiunt: secumque tantummodo versantur.  
 Cum vero iam inclinatus est morbus, stupidi, quieti, mœstique sunt: in  
 notitiam enim morbi venientes, sua calamitate miseriaque tristantur.  
 Alia reperitur furoris species, qua laborantes propria membra dilace-  
 rant, pia cogitatione Dijs suis tanquam id postulantibus gratificantes.  
 Id furoris genus à persuasionem quadã duntaxat proficiscitur. in cæteris



**A**hi temperantes modestique sunt. excitantur autem tibiꝑ cantu, alioꝝ ue animi oblectamento, aut temulentia, aut presentium hortatu. Deorũ afflatu hic furor prouenit: qui cum remittitur, hilares sunt & curis vacui, tãquam dijs initiati. præterea decolores & macie affecti sunt, diuq; ex vulnere doloribus infirmum eorum corpus est.

### De Nerviꝝ resolutione. Cap. VII.

**A**poplexia, Paraplegia, Paresis, Paralysis, oĩa genere eadem sunt. aut enim motionis, aut tactus, aut vtriusque defectus est: interdum & mentis, interdum & reliquorum sensuum. Sed Apoplexia totius quidẽ corporis & sensus, & mentis, & motionis resolutio est. proinde Apoplexiam fortem soluere nulla facultas potest: debilem vero tollere non facile est. Paraplegia est tactus motusque remissio, sed in membro vno, vt puta manu crureve. Paralysis autem motus tantum ferẽ est actionisq; defectio. Quod si nonnunquam solus tactus deficiat, (raro autem id euenit,) potius Anæsthesia, idest, sensus abolitio, quàm Paresis, idest defectio nominatur. At si Hippocrates apoplectõ, idest, attonitum crus secundum rectum dicat; illud tanquam mortuo simile, inutile, & insanabile vult significare. quod enim in toto corpore est vehemẽs Apoplexia, illud in crure Paraplegiam vocat. Vrinæ autem in vesica aut suppressio, aut retinendi impotentia, Paresis proprie est. Palpebrarum vero & malarum, musculorumq; in maxillis, & genæ in alterutram partem diductio, si per conuulsionem torqueantur, Canina cõuulsio nominatur. Genuum resolutionem, sensusq; per aliquantum temporis stuporem, & exanimationem, & casum Lipothymiam, idest animæ deliquium vocitamus. Verum nonnunquam membra singulatim resoluuntur: supercilium, exempli gratia, solum, aut digitus, aut maiora etiam, vt manus crusve: nonnunquam simul plura: & aliàs dextra tantum, aliàs sinistra; aut vnum post aliud omnia resoluuntur exquisite, aut debiliter. neque tantum quæ distantia sunt, & quæ eodem censentur nomine, cõiugataque sunt, vt oculi, manus, crura: verum etiam coniuncta, cognataque; vt nares vsque ad medium, & lingua vsque ad fines, qui in ipsa media positi sunt. vna tonsilla, & isthmus, ipsaq; gula dimidia resoluitur. Ego sanè stomachum etiam, & intestina, & vesicam, oblongumq; intestinum vsque ad principium, idest, anum idem vitium pati existimo. Sed interiora membra resoluta latent, obscuraque sunt. imperfectæ vero sunt ac dimidiatæ eorum functiones. proinde mihi & membra dimidia pati videntur in duas partes à morbo diducta. Hæc res nimirum documento est, quo dextræ partis facultas & natura à sinistræ partis natura & facultate differat. Quippe



assidens causa æqualis est, & vtrique communes morbi occasiones: si **E**  
 ue frigiditas sit, siue cruditas. Sed vtraque haud æque pati idonea est.  
 Natura vero æque valens est, vbi subiecta sunt æque valentia: idem au-  
 tē inæqualibus inesse nullo modo potest. Igitur si infra caput aliquod  
 principium affectum sit, qualis medullæ dorsi membrana est, quæ no-  
 minis eiusdem sunt & contigua, dextra in dextris, & in sinistris leua re-  
 soluuntur. Verum si caput primo in dextra patitur, sinistra; si in leua,  
 dextra nervorum resolutione laborant. Hoc ideo euenit, quod ner-  
 uorum initia permutata sunt. Neque enim dextri nervi in dextras par-  
 tes secundum rectum vsque ad extremum progrediuntur: sed ab ini-  
 tio enati protinus ad oppositos transeunt, se in vicem in figuram huius **F**  
 literæ, X quam græci Chiasmion vocant, permutantes. Vtque semel di-  
 cam, siue omne simul corpus resolutionem nervorum patiatur, siue  
 aliqua membra, siue ab alterutra, siue ab vtrique parte; nervi de capite  
 fluentes alia ratione patiuntur. Nam sensu quidem, vt paucis dicam, hi  
 priuantur, non admodum autem facile ex se motum amittunt. Quod  
 si per communionem cum his, qui mouentur, aliquid vitij contraxe-  
 rint; paulum & ipsi motus perdiderint. Nam & per se ipsi motum ta-  
 met si minorem naturaliter possident. Nervus enim à musculis ad mu-  
 sculos transeuntes motionis principatum obtinent; & his, qui à capite  
 manant, impertiunt. Nervus enim capitis ab illis plurimum motus par- **G**  
 ticipat: tamen ex se quoque, licet minorem, vim mouendi habent. At  
 que hi nimirum in motu noxam magis patiuntur. Raro autem vsu ve-  
 nit, vt per se iacturam sensus faciant: neque tunc ex toto eam facere vi-  
 detur. At si qua copula nervorum ab osse quopiam enatorum, & ad ossa  
 pertinentium, soluta, aut rupta sit; tum membra proprio situ non con-  
 tinentur, luxantur, locoque dimouentur: non tamen sensu priuantur.  
 Hæ sunt autem Paraplegiæ species. quandoque enim membra resolu-  
 ta in longum porriguntur: neque, quando extrema longissima appa-  
 rent, iterum possunt recuruari. nonnunquam in orbem flectuntur, neque  
 in longum extenduntur: Siquis autem ea, ceu ligna adaptans & poliēs, **H**  
 violenter protrahere nititur, breuiora ea seipsis inueniet. Vtrunq; id vi-  
 tium & in oculis pupilla sustinet. aut enim in amplitudinem magnam  
 diffunditur; idque Platycorien, id est, pupillæ amplificationem appella-  
 mus: aut hæc eadem in angustum contrahitur; idque Phthisis, aut etiā  
 Mydriasis à nobis dicitur. Vesica etiam in suis obeundis muneribus de-  
 prauatur, & Paresim quam vocant, patitur. aut enim per extentionem  
 resoluitur, cum retinendi impotens lotium effundit: aut in se ipsam co-  
 uoluitur, cum vrine plena reddere nihil potest. Morbi huius, Paresis vi-  
 delicet, causæ prægredientes sex numerantur; vulnus, percussio, refri-



**A**geratio, cruditas, venus, vinolentia. Cæterū & animi immodicæ perturbationes, vt repente incusi pauores, timores, animi cōsternatio, & mœror: præterea & in pueris terrores: interdum inopinatum atque ingens gaudium: item risus vsque ad mortem implacabilis nervos resolvere consueuerunt. Hæc vtique morbi prima initia sunt: Sed vltima atque potissima causa est ingenitæ caliditatis refrigeratio, quando ab humiditate aut siccitate iniuriam patitur. ab hac vero magis, quàm ab illa sanatu difficilis læsio est: nec non & à vulnere, neruique intercissione malum insanabile prouenit. Quantum ad ætates attinet, senes & ipsi curationem vix recipiunt: pueri facile ad sanitatem redeunt. Inter anni tempora hyems hanc agritudinem gignit præcipue, secundo vero, tertio autumnus, æstas omnium minime. Habitus corporis pingues natura, humidi, desides, belluini, hoc vitio facile corripitur. Affectus hi iam perfecti talibus signis deprehenduntur, immobilitate, sensu sopito, qui neque calidum, neque frigidum, neque vellicantes aut scalpentes, aut aliter contingentes percipiat. Raro euenit, vt istis extremitates doleant: verum sanitati recuperandæ indolentia non leuiter prodest. Porro morbus hic repente inuadere solet. nonnunquam tamen etiam prælonga habet initia, grauitatem, motum difficilem, torporem, frigoris sensum, aliàs caloris excessum, somnos breues, cogitationes, siue apparitiones vehementiores, atque tunc subito resoluti sunt. Nempe in Canino vocato spasmo, idest, neruorum cōuulsione, omnes faciei partes conuelli, non magnopere vñtatum est. Sed ad dexteræ partes leuæ, ad leuæ dextræ feruntur: quando buccæ atque os huc aut illuc, tanquàm ex sede propria discedente maxilla longius detorquentur. Etenim quibusdam nonnunquam articulus luxatus est, cum valde hiantibus maxilla ad inferiora delapsa fuit. in læsa mala oculi inuersio & strabositas, (vt ita dicam) fit: in palpebra inferiore palpitatio. palpitat & superior aliàs quidem cum oculo, aliàs vero sola. Cōtenduntur & labia seorsum alterutrum: nonnunquam vero & ambo collapsa balbutiunt. quibusdam & exacte occluduntur, postea repente ac late dehiscunt, & solitū sputum cum strepitu eijciunt. conuellitur & lingua: siquidem & ipsa musculus est & nerui: quando ad palatum secundum latitudinem tota coherens subito sese remouit, & concussione sonum reddidit. conuellitur & columella: ac si os, quæ interius sunt, in vnum cogat, inopinatus sonus redditur: si vero dehiscat, columellam intueberis nonnunquam palato secundum latitudinem adhærentem; nonnunquam violentia quadam in longum productam, ac descendentem; fistulæ per similem: quando quidem & ipsa sonum edit. Porro caninæ conuulsiones decipiunt, quippe integræ ac sanæ partes ægrotare spectantibus videntur.



Nam in omnem partem tentione, colore, oculi amplitudine, sanæ partes læsionem pati existimantur. Deprehenduntur vero & ridendo, & loquendo, & conuiuendo. Siquidem læsæ partes omnes cum violentia & strepitu quodam trahuntur: labium risu caret: inter loquendum non mouetur: palpebra non volubilis, oculus intentus ac rigens est: sensus tagendi nihil percipit. At sana membra loquuntur, conuiuent, sentiunt, ridet.

### De Phthisi. Cap. VIII.

**S**lab externa causa abscessu in pulmonibus facto, aut à longinqua tussi aut à sanguinis reiectione & puris extusiant; Pye & Phthisis nominatur. Si pectus autem, costave suppurauerit, materiaque per pulmones traducatur, id genus homines Empyi græce vocantur, Purulentii à latinis dici possent. Quod si et ab his pulmo exulceretur à præterlapso pure corrosus; hoc vitium non ulterius empyma, idest, purulentia, sed Phthoem, idest corruptionem appellato. Simul autem adest & ignis assiduus, qui nunquam intermittere videatur interdum latens sudore atque corporis frigore. Hæc enim propria Phthoem sequuntur, quod videlicet caliditas excitatur, & in noctem emicat, interdum rursus in visceribus delitescit. patet autem istorum angor, & imbecillitas, & colliquatio. Nam si per diem corpus ignem euaderet, cur non fieret tunc homo carnosior, & robustior, & morbi tolerantior? ut enim recessit, grauius magis intenduntur: arteriarum motiones parua & imbecilla fiunt: vigilant, color languet; & alia omnia patiuntur, quotquot febricitantes comitari solent. At species humorum prope infinite sunt, liuidorum, atrorum, purorum ac syncerorum, aut pallido alboque, aut albo & viridi mixtorum, latorum, rotundorum, durorum, glutinosorum, aut rororum diffluentium, aut odore carentium, aut foede olentium. Omnes autem hæ puris forme ac species sunt. Quicunque vero aut igne, aut aqua humiditates explorant ac notant; hi haud ita multum phthoem mihi dignoscere videntur. Namque visio quolibet alio sensu certior est, non modo his, quæ reijciuntur, intuendis, sed etiam agrotantis specie consideranda. Siquis enim vel plebeius hominem viderit pallentem, imbecillum, tussientem, macie confectum; hunc vera Phthoe laborare pronuntiat. Quinetiam quibuscunque quidem ulceratus pulmo non fuerit, nihilominus tamen diuturnis febribus consumpti sunt, sæpiusque duriter, & absque effectu vlllo tussientes nihil reijciunt; hos quoque Phthificos haud ita multum improprie nominarunt. Simul vero & his adest pectoris grauitas: pulmo enim infirmus est: angor, intolerantia, cibi fastidium, vespertina extremorum frigiditas, & matutina caliditas: sudor vsque ad pectus caliditate molestior: per tussim varia, qualia



- A**lia memorauimus, extruduntur: vox rauescit: ceruix non nihil tortuosa est, gracilis, non versatilis, sed veluti rigens atque intenta: digiti tenues, sed articuli crassi sunt: ossium duntaxat species remansit. si quidem & carnes extabescunt. ungues adunci fiunt: digitorum ventres rugosi & lati. nam præ macie neque fasciam ambientem, neque rotunditatem obtinent. quam ob rem & ungues adunci sunt. ea est enim ipsorum requies & fulcimen, quæ ipsorum extremitates replet: quoniã & ipsi laborem sustinent, vt pote qui solida membra sunt. Item nares ipsæ acuminatæ, graciles: mæ extantes & rubidæ: oculi caui, lucidi, micantes: tumida, excarnis, pallida, seu liuida facies est. buccarum tenuia dentibus inhaerent: ridentibus assimulantur. in omnibus denique cadaueris speciem referunt. Hunc in modum & cætera sese habent: tenues enim & carnibus priuati sunt: brachiorum musculi non apparerent: mammarum neque vestigia extant: solæ autem papillæ cernuntur. costas non solum dinumerare perspicue licet, verum etiam ubi definant, intueri facile est. neque enim cum vertebris factæ articulationes occulantur. patent etiam in os pectorale costarum insertiones: quarum interstitia inania & caua sunt, Rhombi figuram secundum ossium circumductum ostendentia. præcordia vacua ad superiora conuulsa sunt. abdomen & ilia spinæ dorsæ cohærescunt. artus conspicui, prominentes, & macri sunt: perinde se habent & tibia, & coxendix, & brachia. at spina vertebris superextat, à priori parte caua, vtrisque musculis per tabem dissipatis. scoptula operta tota sese conspectui offerunt, atque auium alas imitatur. Huiusmodi ærotis si alius perturbetur, actum est: sin ad sanitatem vergant, perniciosæ contraria signis adueniunt. Porro senes in hoc malum frequenter non incidunt, sed minime euadunt. Iuuenes autem vsque ad florentem consistentemque ætatem post sanguinis reiectionem in phthisim prolabuntur: inde sanescunt quidem, sed non facile. Pueri assidue tussi vsque ad phthisim nonnunquam diuexati facile ad sanitatem redeunt. Habitus verò in id vitium
- D**proni sunt graciles delicatique, scetilibus tabulis similes, alarum instar habentes, prominenti gutture, albidæ, rariore pectore. Regionibus autem frigide atque humida huiusmodi affectus germanæ sunt.



**Q** Vibus hominibus in cauis locis è regione pectoris, aut inferius sub tranſuerſo ſepto puris abſceſſus fiunt; ſi per os id eiſciūt, Empyi, hoc eſt, Purulenti vocitantur. Si per alium pus deijcitur, Apoſtematię gręco vocabulo dicuntur. Ac ſi in pectore quidẽ, cū eſt vlceratum, in pulmone verò, cū phthoe laborat, aut in ſubli nente coſtas mēbrana circa latus, aut os pectoris, quod gręci Sternon vocant, aut inferius, vbi pulmo cum ſpina dorſi committitur, cohære ſcitque, aut ſi quo alio pectoris loco vitium ſit; omnibus ad pus excer nendum via per pulmonem munita eſt. Sub interſepto verò in viſceri **F** bus, iecore, liene, renibus per veſicam; in mulieribus etiam per vterum tranſitus datur. Nempe cuidam ego aliquando abſceſſum laxioris in teſtini dextra in parte propè iecur diſſecui: multumque inde puris effu ſum eſt. multum quoque per renes & veſicam ad plures dies emana uit. vnde & ſanitatē homo adeptus eſt. Cauſa verò communes om nium hæ ſunt, plaga, cruditas, frigus, & id genus alia. Porro & quibuſ dam in pectore diuturna tuſſis incumbens, & lateris inflammatio, & vomica pulmonis, & fluētio longinqua, necnon & acuti morbi in ali quod iſtorum decubitus; purulentię originem præbent. At humora lias iners imbecillusque alij inharet, aliàs acris & mordax, & ad mor **G** tem uſque putrefaciens. Nam & ſpecies infinitæ ſunt, quas ſuo loco po ſtea memorabimus. Sed magnum profeſſo miraculum eſt, quomodo id fiat, vt ab exili tenuique membrana nihil craſſitudinis habente, mē brana inquam coſtas interius obt. gente, tanta copia puris effundatur. multum enim colligi in multis deprehẽſum eſt. Huius rei cauſa eſt in flammatiō ex ſanguinis multitudine oriens, ob quam membrana craſ ſeſcit: verum ex multo ſanguine multum in medio pus contrahitur, id ſi ad interiora ſubeat, coſtarum oſſa ſuam propriam ſedem obtinent, ſed phthiſis altera ſpecies ſuperius à nobis memorata ſecundum natu ram eueniet: ſin ad exteriora procurrat, oſſa diſiunguntur. in aliquod **H** enim inter coſtas mediũ ſpatium, ipſius abſceſſus acies exeritur: quā do in hanc atque in illam partem coſtarum oſſa pelluntur. Notarum autem quędam omnium communes, quędam ſingulorum affectuum proprię ſunt: grauitas potius quàm dolor, commune ſignũ eſt. Pulmo enim dolorem non percipit. febres obſcurę, horrores veſpertini, ſudo res in remiſſiōe, vigilia, tumores in extremis pedibus, manuumque di gitis ſubinde conſiſtentes, atque inſurgentes: inquietas, cibi abominatio, totius corporis macies. Quòd ſi & in longum mutatio producitur, ha bitus phthiſicus redditur: neque enim vltra in officio natura perſeue



**A**rat: quoniam concoctio non fit, qualis antea. inde caro consumitur: color, qualis belluæ, efficitur. Spiratio cunctis quidem mala, sed illis peior, quibus ad superiorem ventrem morbus ascendit. quin etiam tussis ab initio tātisper vexat, donec inflammatio, quæ vrget, perseverat. quādo & dolores, & horrores augentur: & caliditas, & vigilia, & spiritus difficultas adhuc magis increfcunt. Venarum motus parui, torpentes, imbecilli fiunt: mens delirat, pectus distēditur. Verum enimuero si ad suppurationem inflammatio veniat, omnia maxima fiunt: sed reiectio parua est cum maiore tussi, & ex violento abscessu. in primis pituita

\* Aliter  
violenta  
extētiōe

**B**adhuc tamen cruenta ac pinguis pituita est. Quod si proxime rumpenda inflammatio est, quæ reijciuntur speciem carnis habent, crassioraq; sunt. At si iam rupta sit, strangulatus discrimen impendet, si multum subitaneum quæ pus emanauit: si pedetentim verò emittatur, exactè sanitas aduenit. Porro si ad inferiora pus transire velit, partes quidem superiores, vbi erat abscessus, acutus dolor occupat: alius verò humida est, primum aquosa cum pituitosis deijciens, deinde cruenta quædam circumfluentia: rursusque carnosa, cum iam effractus abscessus est.

**C**Hæc pus sequitur aut per aluum, aut per vrinæ vias elabens. Sed materiæ ad renes & vesicam transmutationes meliores omnibus sunt. At si pus infra suprave feratur, eius color varius est, pallidus, aut albus, aut cinereus, aut liuidus, aut ater: pus item aut olidum est, aut odore vacans: crassissimū, aut mediocris corpulentia: aut laue equale, aut asperum inæquale. Et frustra caruncularū similia in eo fluitantia rotunda, aut lata sunt, quæ facile abluantur, aut tenacia. Utque in summa de pure dictum sit, quæcunque alba feruntur, concocta, inodora, læuia, rotunda, & celerius extusuntur, aut per aluum deturbantur, hæc tuta & salutaria sunt: quæcunque autem perpallida, biliosa, & inæqualia sunt, ea praua esse scito: Sed multo his peiora, liuida & atra. putredinē enim et exedentia vlcera significant. Ad hæc & habitum simul animaduerte

**D**re conuenit, & quæ morbum comitantur: nam si excretionem bene tolerat, febre vacat, recte concoquit, bene coloratus est, bene ad cibos se habet, si facile extusit, si artiarum motus bonus est, si vires firmæ, egrotus perniciem euadit. At si febris superueniat, omniaq; in deterius conuertantur, de salute desperatum est. Præterea & loci abscessibus occupati simul noscendi sunt: quibuscunque enim in osse pectoris, quod Sternon vocant, empyema idest, purulentia fit, tarde abscedit. nudæ enim, & excarnes, & cartilagineæ partes illæ sunt: eiusmodi verò non facile phlegmones redundantiam suscipiunt, & absque suppuratione multum temporis permanent. Siquidem res frigida cartilaginee sunt,

F ij



sed earum phlegmonæ minime nocent. Ipsius verò habitus colliquationes pravae sunt, breui enim tempore suppurant. Lienis, iecur, & pulmo, & interseptum celerius quidem pus ducunt, sed periculosa & mortifera sunt. E

### De Pulmonis abscessibus, Cap. X.

**Q** Vicumque pulmonia laborant, si pituita sit, nisi diffundatur, superstites erunt. hi verò morbi primum impetum euadentes purulenti fiunt. Futuri quidem, aut iam perfecti abscessus indicia in capite de purulentiis exposuimus. Cum perfectus iam abscessus est, non vi ac laboribus ad eum rumpendum reiiciendumque, quemadmodum in alijs corporibus usu venit, opus est: sed facile per superiora excernitur: cum magis in raritatibus, quam in corporis habitu distentio fiat. Rarus enim ac foraminulentus pulmo est, spongiae similis, humorem haud moleste ferens: qui aliam post aliam inanitatem eo usque, donec ad asperam arteriam deueniat, permutare solet. Circuitus autem humori faciles sunt, quandoquidem flexile atque lubricum pus est. Respiratio etiam sursum spiritum efflat. Sapius autem mortem effugiunt, nisi aliquando quispiam subitanea ac multi humidi attractione stranguletur: quod arteria puris multitudine obstructa aerem non recipiat. Horum nonnulli progressu temporis moriuntur, quemadmodum phthisici aut purulenti extingui solent. Sputa verò cædida sunt, spumantia, cum salina permixta, aliàs cineracea, aut subnigricantia. Et Bronchia, idest, asperæ arteriæ circuli nonnunquam expuuntur ob ulceris varietatem, si altè abscessus penetrat: quando & fragmenta visceris expelluntur. Rauescunt: breue spirant: grauem vocem edunt. ipsorum pectora lateſcunt, & latioribus humiditatis causa indigent. oculorum nigrae partes fulgent, albæ verò albissimæ fiunt, ac pingues: malæ rubent: venæ in facie elatæ ac tumidæ sunt. Mirum est autem in his, quod tenor, quàm pro corpulentia, maior est, animi verò alacritas & constantia tenore potentior. F

### De Asthmate, siue Anhelitu. Cap. XI.

**S** I à cursu, exercitationibus, & quolibet negotio spiritus ægre reditur; Asthma græce, Anhelitus latine vocatur. Morbus quoque ille, quem græci orthopnoeam dicunt, & ipse Asthma nominatur. in accessionibus enim & ipsi anhelant. Orthopnoeam verò appellant, quoniam erecto duntaxat corpore facile spiritum ducunt. decumbentes enim strangulantur. propter extentionem igitur, quæ in spirando adhibetur, affectui nomen Orthopnoea, idest, Recta spiratio inditum est. G



- A** Erectus enim homo ad respirandum extenditur. at si supinus decubuerit, strangulationis instat periculum. Afficitur autem pulmo, simul etiam quæ spirationi conducunt, afficiuntur interseptum & pectus. At si cor vitiatum sit, nunquam diutius vita produci poterit: hoc enim loco spirandi viuendique initium situm est. Causa est frigiditas spiritus, atque humiditas: materia verò, crassi interiusque abditi humores. Huic vitio mulieres opportunæ sunt magis, quàm viri: quâdoquidem & humida & frigida sunt. Pueri facilius, quàm hęc, liberantur: nam ipsorum natura in incremento est, quæ valentissime calefacere potest. Viri tametsi nō facile hoc morbo capiuntur, citius tamen capti pereunt. Differitur autē interitus quibuscunque opere conficiendo, aut lanis elaborandis pulmo incalescit, & acceditur: quemadmodū calcis opificibus, aut ærarijs, aut ferriarijs fabris, aut ignis in balneis excitatoribus. Morbi verò incipientis notæ huiusmodi sunt, grauitas pectoris: tarditas ad opus solitum, & ad aliud quodlibet gerendum: in cursu, aut in accliuo itinere difficilis & egra spiratio: raucescunt, ac tussunt: flatus in præcordijs, atque eructationes præter rationem excitantur: vigilant: noctu parum, & obscure incalescunt: nares acutas, & ad spirationem paratas habent. Si malum in peius ruat, malę rubent: oculi prominent, veluti in his, qui strangulantur: stertunt, dum vigilant, multo magis, cū dormiunt: humida, obscura, sonoque carens vox est: multum & frigidum aerem cupiunt: sub diuo ambulant: quælibet enim domus ipsis ad trahendum spiritum parua & angusta est. Erecti spirant, tanquam omni aere attracto potiri cupientes. præ aeris autem cupiditate & os aperiunt, patefaciuntque, tanquam eo ampliore indigentes. Ipsorum facies præter malas, quæ rubent, pallida est: sudor circa frōtem & iugula emanat: assidua & aspera tussis infestat: reijciuntur pauca, tenuia, frigida, veluti quædam spumæ efflorescentia: inflante spiritu collum intumescit: præcordia reuulsa sunt: arteriarum pulsatus parui, crebri, atque depressi: crura exilia. Quod si hæc vltius crementum acceperint, instat comitialis morbi nonnunquam hominem strangulant. At si vertatur in melius, tussis longior, & rarior fiet: plura excernentur saniosa sputa, & humidiora: multa per ventrem aquea exturbabuntur: vrina copiosa scaturiet, licet nondum quicquam in ea subsidat: vox sonantior, clariorque reddetur: somni longiores, quantum satis fuerit, efficientur: præcordia remittentur: dolor interdum ad scapulas in remissione transiit: anhelitus rarus, lenis, sed cum vocis asperitate fit. Ita sanè morbus effugiunt: Sed in morbi cessationibus, licet ipsi non decumbentes obambulent, secum tamen morbi signa circumferunt.

\* aliter  
minor



De Pulmonarijs. Cap. XII. E

**A**nhelitus species Pulmonarium est, quod greci Pneumodes vocant. Et à pulmone vitium, quemadmodum & anhelitus, oritur. Quæ insunt enim, vtrique communia sunt, & exigua differentia est. Nam spirandi angustia, & tussis, & vigilia, & caliditas vtrunque vitium comitantur. item in cibos odium, & totius corporis extenuatio. Id enim malum cum foedum sit, producitur, neque tamen anni spatium excedit. Nam si autumnus tempore egrotare quis inceperit, vere, aut estate futura vitam finiet: sin hyeme, sequenti autumno moriturus est. Interdum & senes in hanc labem facile incidunt, & exterriti. Ea correptis leui momento ad perniciem opus est. omnes simillime spiratione priuantur. arteriarum motus parui, crebri, infirmi sunt. Sed hæc & in anhelitu reperiuntur. Priuatim verò hi tussunt, tanquam aliquid expulsuri, cum tamen irritus eorum labor sit, nihil enim rejciunt. verum si quid ex pulmone vi extruditur, illud exiguum, album, rotundum, grandinosumque est. Pectus in his latius vtrique est, non obtortum, non ulceratum. Tametsi autem pulmo non suppuret, humorum tamen veluti concretorum plenus est. Temporis intercapedines inter huiusce morbi accessiones longiores sunt. Nonnulli ex his celerius suffocati sunt, quam aliquid deterius omne corpus inuaserit. nonnullis vero in G Hydropem circa ilia, aut in eum, qui Anasarca dicitur, morbus iste mutatur ac definit.

## De Iecore. Cap. XIII.

**I**ecur lieni in generationem equilibre est. dextram enim leuamque partem hæc viscera occupant, naturaliter paria numero, sed facultate tam in sanitate, quam in morbis imparia. In sanitate quidem, quoniam principatum alimenti iecur obtinet. si quidem venarum radicatione iecur est. Quinetiam in morbis ad sanitatem consequendam multo, quam mors, valentior causam habet. Igitur quanto ad sanitatem H iecur melius est, tanto & deterius à morbis afficitur. Etenim celerius et violentius inflammatur: & frequentius perniciosiusque abscessum patitur. At duro tumore, qui Scirrhus græce nuncupatur, affectum velocius, atque dolentius, quam lienis, interficit. Quæ ad inflammationem attinent, in libro de acutis morbis proposui. Quod si in pus conuertitur, dolor acutus ad iugulum vsque, aut & ad summum humerum pertinet. Nam præ onere interseptum, unde iecur suspensum est, detrahit: interseptum verò membranam costis substratam degrauat: ipsum enim illa consequitur: quæ planè ad iugulum vsque & ad summum hume-



- A**rum extenta est, atque hæc omnia simul ad inferiora detrahuntur. Ignis acer cum horroribus in suppuratione exoritur: tussis arida non admodum crebra diuexat: colore herbaceo ægri tinguntur: si largius colorantur, in auriginem incidunt in albidum vergentes: somni haud ita visis imaginibusque vacant. Prudentes verò cum sint in omnibus, in aliquo tamen ad tempus oblato repente delirant, ad seque protinus reuertuntur. Tumor sub mammis, aut sub costis oritur: multi autem membrana Peritonæi tumorem esse falso crediderunt. Verum si tumor sub spuris costis fiat, cum premitur, dolor excitatur: iecur intumescit. humiditate nanque refertum est. At si non sub ossè remaneant, inflatur
- B** membrana signum. Et ipsius quidem circumscriptio & fines patent: post enim fibrarum circumductum in vacuum abdomen comprimēs manus descendit, ac subsidet. Peritonæi verò interminata duritia est: & extremitatis processus nequaquam cernitur. Porro si ad interiora subit abscessus, longè medico natura præstat: aut enim ad intestina, aut ad vesicam pus conuertet. verum multo innocentior est in vesicæ via. At si extra feratur abscessus, ipsum non secare utique malum est: nam si prætermittatur incisio, à pure iecur eroditur, nullaque mortis dilatio est. Si secare autem malis, profluij sanguinis periculum instat, statimque hominem perdi contingit. nam sanguinis è iecore profusio conceri nullo modo potest. Igitur si aliquando necessario ad sectionem venire cogeris, vstorium ferramentum candens perspicuumque ab igne accipito, & vsque ad puris locum intrudito. idem enim tibi & secat & comburit. Quòd si homo periculum euadit, tum pus album effluet, concoctum, læue, olidum, quoniã crassum est. istis febres & acerbæ remittunt, omniaque facile mulcebuntur. Verum si in intestinum pus effunditur, ex aluo primum aquea feruntur, postea humori, in quo sint lotæ carnes, similia: item qualia in torminibus, vbi vlcera intestina sunt, exire solent. interdum cruentum virus, interdum concretus sanguis effunditur. fertur & bilis flaua, syncera, aut porracea, & postrema interitum asserens nigra bilis. Si non suppurat vlcus, & mali odoris quædam veluti putredinem venter expellit, crudum alimentum præterfluit ob ventriculi intestinorumque intemperiem: neque enim bene se habens iecur iterum ea concoquit. postea ignis acer suboritur, omniaque in malum prolabantur. carnes colliuatione tabescunt, motus arteriarum parui sunt, & egra spiratio. vbi haud ita multo post vite finis imponitur. Ceterum quibusdam difficultas quidem intestinorum vlcusque sanata sunt, morbus tamē in aquam intercutem desijt. Quòd si omnia remittantur, pus album sit, læue, æquale, inodorum: venter deijciat, & cibaria concoquat; homo in bona spe est. Optimum vero est



per lotium crifim fieri: hac enim fecurior est, minusque maleficus puris transitus. Verum si à phlegmone iecur non suppurat, nemini dubium fuerit, tumorem durum subsidientem in scirrhum mutari ac stabiliri: quando continuus dolor non infestat: cumque adest, obtusus inersque sentitur: rara verò et caliditas: à cibis alienatio, ab amaris delectatio, à dulcibus contristatio: horrore afficiuntur: subalbicant, virēt: lumbi ac pedes tument: facies corrugatur: venter squallet: deiectiones crebre fiunt. malorum autem colophon aqua intercus. Post aquam intercutem si multa vrina & crassa feratur, multumque in ea limosi subsideat, & cum impetu erumpat, humorem illum intercutaneum effluere posse sperandum est: si tenuis autem, subsidencia carens, paucaque vrina exeat, aquam intercutem auget fouetque. Quòd si pristinas vires natura recipiat, & quandoque per ventrem cum impetu materiam deturbet, post multorum, crassorum, aquosorumque depulsionem & ipsum hydropicum morbum tollere consuevit. Verum id genus auxilij cum periculo est: post enim subitas & copiosas inanitiones, extremosque casus prostratis interdum viribus, quemadmodum in sanguinis profluvio accidere solet, egri interierunt. cum minori autem noxa morbum sudor, si liberalius effluat, dissolvit. Hydropici nanque haud ita multum in summa cute humectari solent. atque morborum iecoris hic finis est. Quando in iecore pus nascitur. \* Adolescentes, & qui vsque ad confluentem aetatem peruenerunt, his vexatur morbis: mulieres minus his patiendis expositæ sunt. Huiusmodi vitiorum causa numeratur victus intemperantia, & longa valetudo. presertim post difficultatem intestinorum, & colliquationes. quandoquidem & eos Syntecticos, idest, colliquatos nominarunt, qui post vlcera iecoris tabefacti moriuntur.

## De Liene. Cap. XIII.

\* aliter  
dolore

**L**ieni familiaris longus morbus est, quem Scirrhum nominant. Purulentia verò haud ita facile, quandoque tamen efficitur: cum dolor non asper, tumor autem ingens spiratione maior exoritur. Siqui dem in dextram partem ad iecur vsque tota communione incrementum visus est. vnde multi vt fallerentur in causa fuit: tanquam non lienis, sed membrana affecta esset. nam peritoneon, quod græci vocant, inflammatione occupari isti existimant. contumax autem atque indomitus instar lapidis tumor est. talis plerunque à Scirrho lienis efficitur: quando & ambiguitas difficultasque maxima simul adest. Verum si forte suppuret, tractabilis est utique: & in parte summa, vbi puris quoque creatio est, tactui cedit. quando verò pus non ducit, tactui omnino resistit. Porro nonnunquam scirrhus totus super ventrem suspensus est, in hanc,



- A** in hanc, atque in illam partem, prout impellitur, delabens: donec, pusillus cum sit, locum ad fluitandum habet. Adest nausea & anxietas: maxime cum instat eruptio. Incrementi autem notæ sunt febres, dolores, & horrores. multoties enim horrent: nonnunquam verò non horrent cum breui caliditate, & dolore vacat. hac de causa interdum & in splene abscessus oriens latuit. rarum enim, & sensu carēs in sanitate quoque viscus est. Turgent isti, atque humoris, tanquam Hydropici, pleni sunt, atro colore viridi admixto suffusi, egre omnia patientes, pectore veluti pondere oppresso grauiter spirantes. euident enim malum est. usque ad superiora spiritu venter impletur crasso, caliginoso, humido quidem
- B** ad speciem, cum tamen non sit humidus. tussis adest, multumque irritantur, sed pauca sicca extruduntur. Venter si quæ infra depellit aquosa, primò paulum subleuat, deinde si largius deijcit, hominem quidem tabefacit, sed nihilominus iuuat. At si & abscessus ruptus fuerit; pus utique purum & concoctum nunquam excernitur, sed subalbidum & cinereum, quandoque seculentum, aut liuidum. quod si & profundior abscessus fuerit, nigra etiam fertur humiditas: quando & aliqua succi lienis, qui simul tabescit, particula exprimitur. Quibusdam præterea & integræ lienis partes exierunt: siquidem & natura dissolubilis lienis est. Cæterum si morbus vlcere non substitit, sed in longum tempus
- C** extrahitur, cibos auersantur, malo sunt habitu, tumidi, aspectu fœdi, multis vlceribus toto corpore, sed maximè in cruribus scatent. rotunda, liuida, concaua, sordida, egre sanabilia vlcera sunt. sicque demum tabefacti interiire. At in exiguo tumore cum duritia et renixu indolentia est. unde fit, ut isti longiorem vitam ducant. Verum si ab affectu supererentur, aqua intercus, aut phthisis necessariò sequitur: & corporis eliquatio superuenit. atque iste sanè perniciosi modus ipso est vita migrare compellit. Pueri ac iuuenes faciliè calamitatem hanc patiuntur, facileque inde liberantur: senes verò non faciliè utique leduntur, sed affecti euadere interitum nequeunt. Quinetiam seniores quidam nescientes ipsi
- D** vitio lienis absumpti sunt: nam & pusillus tumor ipsis causa interitus fuit. Longa quoque ægritudo tabidos facit: & iuuenibus ocium maximè nocet, quicunque à certaminibus exercitationibusque corpus quieti desidiæque tradunt: loca palustria, aque exuberantes, salse, virosæ: inter anni tempora ferinus autumnus.

## De Morbo regio. Cap. XV.

**S**ibile flaua, vitellina, aut crocina, aut nigra cum viridi mixta omne corpus à viscere suffusum sit; affectus hic à græcis Icterus, à lati-

G



nis Regius morbus, siue Arquatus, siue Aurigo dicitur. Difficile utiq; **E**  
 in acutis malum est: quia non solum ante septimum apparens, sed etiā  
 post septimum infinitos necauit. rarò autem ad extremum febrem be-  
 ne iudicauit: ipse verò haud facillè discutitur. Neque vitio iecoris tantū-  
 modo prouenit, ut nonnulli medicorum existimant: sed & ventricu-  
 lus, & lienis, & renes, & laxum intestinum in causa sunt. & ab iecinore  
 quidem nascitur, si phlegmone, aut scirrho viscus illud opprimitur, à  
 solito tamen munere non impeditur. creatur enim in iecinore bilis,  
 eamque in iecinore posita vesica secernit. Verum si meatus ad intesti-  
 num bilem deferentes phlegmone, aut scirrho interclusi fuerint, vesi-  
 ca autem exundauerit; bilis retrò labitur. Cum sanguine igitur misce- **F**  
 tur, qui per totum corpus discurrens, secumque bilem vehens in om-  
 nia membra diffundit: atque ita corporis species bile tingitur. Stercora  
 verò albida sunt & argillam referentia. neque enim bile colorantur,  
 quoniam humoris eius affluxu carent. iccirco & vèter valde siccus est:  
 siquidem bile nec inadet, neque stimulat. color autem ad albedinem  
 vergit. Si morbus regius ab liene ortum habeat, color est ater cum vi-  
 ridi mixtus. ipse enim atra bilis alimentum est: cum sanguinis atrì ef-  
 figies quædam ac simulacrum sit. cuius purgamenta non suscipit, neq;  
 elaborat lienis ægrotans. inde fit ut per omne corpus cum sanguine di-  
 labantur. Propterea lienis arquato laborantes cum viriditate quadam **G**  
 nigricant. ipsorum quoque consueta stercora nigriore colore imbuta  
 sunt. nam quod alimenti in splene abundat, ad vias exitus tanquàm re-  
 crementum propellitur. A' laxo etiam intestino & ventriculo arquatus  
 prouenit. vbi concoquendi facultas in ventriculo & laxo intestino,  
 quod græci Colon nominant, læsa fuerit. nam & in colo concoctio ef-  
 ficitur, & ab ipso alimentum in iecur digeritur. Igitur si aliud alimen-  
 tum crudius iecur suscepit, proprium quidem elaborat, & conficit,  
 alienum verò dimittit. sanguis enim, qui distribuitur, coli cessationem  
 atque inertiam retinens, in omnem partem labens eam disseminat. in  
 colo autem cruditas ipse bilis effectrix est. Hunc sanè in modum ab **H**  
 omnibus visceribus arquatus oriri poterit, non modo ab ijs, quæ ieco-  
 ri escam suggerunt, sed etiam ab ijs, quæ à iecore suscipiunt. Neq; enim  
 per canales duntaxat sensiles, sed multo copiosius per halitus natura in  
 omne corpus alimenta distribuit. qui à toto in totum natura ipsos per  
 solidas ac densas partes dirigente discurrere facillè queunt. gignuntur  
 itaque halitus bile infecti; & corpus, vbi infederint, colorant. Nempe  
 per aluum laborante colo non fit albida excretio: iecur enim creandis  
 succis nullam noxam patitur, exitumque bilis ad intestina patetem ha-

\* Aliter  
 albū cū  
 viridi mi-  
 xtum.



- A** bet. Habitus quoque totius corporis ad morbum regium citandū sum-  
mopere efficax est. habet enim & in toto causam, quæ huiusmodi est.  
In omnibus corporis partibus calor ad concoquendum insitus est: in  
oībus item humorum est creatio ac separatio. sed aliorum alia, singu-  
lis autem propria. vt puta in carne sudor, in oculis lachryma, in articu-  
lis & naribus mucus, in auribus Cypselis græcè dicta, Latini auriū Mar-  
morata, seu Cerumina vocant. Itaq; si ad singula obeunda munera ca-  
lidum fatigatum lassatumque fuerit, ipsum quidem in acre atq; igneū  
vertitur, humiditates autem omnes in bilem abeunt. ignis enim opera  
amara & bile infecta sunt. quod si & in sanguine cruditas incidat, san-  
guis biliosus efficitur, & quoquo versus nutriens dispergitur. Propte-  
rea & vbiq; bilis conspicitur. Planè acerbum id malum est, color ve-  
rò specie horribilis. etenim colore aurum representant: sed non homi-  
nem decet, quod in lapide pulchrum fuerit. At superuacuum mihi vi-  
detur, vnde id nomen Icterus tractum fuerit, explicare: præterquàm à  
terrestribus feris quadrupedibus; quas græci Ictidas, latini Vierras, ali-  
qui Martes vocant. & Sylvestris mustellæ species est. his enim bestijs o-  
culi huiuscemodi colore tincti sunt. Duæ sunt huiusce labis species: aut  
enim in flauum croceumque vergit, simulq; albicat & virescit: aut in  
liuidum nigrumque declinat. atque adeo istorum causa & ipsius bilis  
causa est. Aliqua enim bilis flaua est subtilis, perspicua, tenuioris gene-  
ris: aliqua magis colore saturata, vt crocum, aut vitellum eiusdem spe-  
ciei quis affirmet. Secūda bilis species nigrioris coloris est, porri, aut is-  
fatidis herbæ colorem referens, atra. inter hæc extrema infinitæ sunt co-  
lorum varietates. penes autem calorem atque humiditates istarum mu-  
tatio fit. Quin etiam viscera huiusce varietatis causæ sunt: vt puta si fla-  
uum viscus sit, quale iecur est. aut liuidū, qualis lienis. Quo circa si ab  
aliquo viscere arquatus oritur: à iecore quidem, iecoris notæ sunt: a lie-  
ne, lienis: singulorumque, vnde oritur, membrorum indicia apparent.  
Si nullius membri signa videantur, vniuersi habitus ægritudo est. Per-  
spicua verò sunt & ea, quæ in albis oculis cernuntur. Frontis au-  
tem secundum tempora, in corporibus naturaliter albis præcipuè, &  
in paruo arquato color exquisitior efflorescit. Porro quicumque nigro  
arquato laborant, in his ater color viridi commixtus apparet. ijdem fri-  
gent: imbecilli, desides, tristes, atque demissi animo sunt. tetrum odo-  
rem exhalant: gustatum amarum habent: spiritus non facile ducunt: in  
ventriculo morsum percipiunt: alui excrementa porracia, subnigra, ari-  
da sunt, ægreque descendunt. vrina bene colorata est, ad nigrius ver-  
gens. ad hæc cruditate laborant, cibum detestantur, vigilant, mœrent,

G ij



melancholia agitantur. At in albiore arquato color est ex albo & vi- **E**  
ridi temperatus: mente sunt hilariores: cibos accipere primò eos piget;  
sed ubi coeperunt, nauiter comedunt: facilius, quàm priores, conco-  
quunt: alui purgamenta alba sunt, arida, cretacea. lotium reddunt fla-  
uum, pallidum, crocinum. In vtrisque corpus omne pruriginosum  
est: calor in naribus exiguus quidem, sed mordax percipitur: nam bilio-  
sum distrahit laníatque: Gustatus amarorum quidē non amarus, quod  
mirum est, non tamen dulcis: dulcium verò amarus. in ore nanque bi-  
lis in lingua residens, & prius cibis occurrens sensum hūc ludificatur,  
ac decipit. Lingua enim bile suffusa cibos non sentit. atque antea qui-  
dem ieiunij tempore bilis quiescit: neque iccirco lingua propter consue- **F**  
tudinem egre fert: verum si cibis excitata bilis efferbuerit, ipsa cibis ob-  
iecta prius linguam mouet ac stimulat. Itaque siue amara sit esca, ama-  
ri sensus est, siue dulcis, biliosi perceptio. bilis enim sensio prauertit.  
Falluntur autem, qui amara videri dulcia existimāt. res enim haud ita  
se habet: sed quoniam membrum amaro aliquo delibutum duntaxat  
propter morbi consuetudinem amaritiem non percipit, ideo speciem  
dulcescentis representat. verum in dulcibus & amaris cibarijs idem sta-  
tus reperitur. fallacium igitur ciborum velamentum bilis est. Vtique  
si nullius visceris calefactio euidens fuerit, plerunque sine noxa ar-  
quatus est, sed diuturnior. si perseuerauerit, atque insuper viscus in- **G**  
flammatione vexatum fuerit; in aquam intercutem, & malum cor-  
poris habitum vt plurimum definit. Plerique & sine aqua intercute  
colliquati interiire. Id malum adolescentulis iuuenibusque familiare  
est: quibus & minus officit. Pueris autem, non admodum inusitatum,  
non omnino tamen innoxium est.

De Cachexia, siue malo corporis habitu. Cap. XVI.

**O**Mnium simul vitiorum malus habitus conuersio est. Siquidem  
ab omnibus morbis propagatur & emanat. Verum & ipse so-  
lus citra alios morbos materiam multam lutulentam nactus, à princi- **H**  
pio noua agritudo gignitur. Et habitus quidem malus simplex cōmu-  
nis est, & symptomata multa comitatur: nomenq; ipsum significanter  
inditū est. Gracilitas verò, aut pallor, aut tumor, et siquid aliud insit, ad  
tempus durans in corpore exoritur: Malus autem habitus vnus ingen-  
tis affectus species est. eiūque nomen tale fuit impositum. Nam homi-  
nis ad omnia bonus habitus est: & ad concoctionem, aut ad distribu-  
tionem sanguinis creatio, atque omnis naturæ functio inde prouenit.  
hæc consequitur facilis spiratio, valide vires, floridus color, sed pri-



**A**ma omnium sanitas. Quòd si ad imbecillitatem vitioforum corporis humorum, quæ Cacochymia à græcis dicitur, natura conuersa fuerit; id iam malus habitus est, quem græci Cachexiam nominant. Valetudo hæc vix sanabilis est, malumq; longissimum. longo enim tempore acquiritur, neque ab vno corporis vitio, neque ab vno viscere prodiens. Sed omnium est in deterius conuersio: Quocirca ab hac enascentes morbi ineuitabiles sunt, vt puta aqua intercus, aut phthisis, aut eliquatio. Siquidem & mali habitus causæ colliquationis germanæ sunt. Morbus autem in multum tempus extrahitur: intestinorum difficultas adest continua: quibusdam morborum reuersiones eueniunt. bene vtique cibos appetunt, tametsi multos ingerant, ac repleantur: crudi verò, & non confecti digeruntur. quoniam alimenti elaboratio ad coctionem pertinens, debilis admodum atque inualida est. Labis huius causæ sunt & ab hæmorrhoidibus, quas vocant, venis effluuij suppressio, & vſitatorum vomituum retentio, & ab exercitationibus quies, & sudorum exiccatio, & ab ingentibus laboribus ocium. quando enim horum singula, quæ aderant, non amplius reuertuntur; tunc sequitur corporis grauitas, pallor subinde repetens, venter flatibus refertus, oculi concaui, somni graues torporem afferentes. Verū enim uerò hæc si erraticè, & non statis temporibus fiant; morbi inconstantiam infirmitatemque significant. sin altius exactis radicibus maneat, neque desistere velint; ingentis mali nuncia sunt. Stantibus pedes tibique intumescunt, decumbentibus autem partes decliues atque iacentes. Quòd si decubitus mutauerint, tumor in illas decumbentes partes deuoluitur: humidique aut frigidi in grauitatem fit circuitus. nam si calor humidum euaporet, id verò non effundatur, postea delabetur. Multos vtique cibos appetunt, edaces admodum sunt: celerior concoctione distributio fit crudiorum magis, quàm inconcoctorum. nutritio non perficitur. Sed hoc inde prouenit, quoniam in toto alimentum à natura non concoquitur. in ventre enim atque in omni corpore caloris imbecillitas eadem est. quapropter neque optimus, neque boni coloris sanguis procreatur. cumque crudorum succorum omne corpus refertum fuerit, & ciborum appetentia euanescat; sic malo habitu vsque ad ventriculum grassante, & affectu iam summam potentiam obtinente, tunc sanè tumidi fiunt, imbecilli, & ad omne opus abiecto postratoque animo. Aluus sicciior est: plerunque recrementa bile priuata, alba, aspera, crudaque deiciunt: corpore squalent, sudore carentes & pruriginosi. somnus nequaquam firmus est, sed decumbentes conuiuent: tarde spiritum du-



cunt: arteriarum motus languidi sunt, debiles, frequentes: post quā-  
 libet autem vel exiguam actionem frequentissimi fiunt. Post hæc re-  
 spiratio cum anhelitu fit: venæ in temporibus elatæ apparent: partes  
 enim, quæ circumiacent, emacruerunt: verum & in brachialibus  
 longe grandiores inflatione venæ redditæ sunt: sanguis atro colore  
 viridi admixto infectus est. Ab his phthifis, aut colliquatio hydro-  
 dem anasarca vocatam, aut ascitem adducit: istorumque procreatio  
 ineuitabilis est. Aetates huius morbi feraces sunt in primis senectus,  
 neque mortem euadunt. Pueri & celeriter pati idonei sunt, & libe-  
 rantur facilius. Florentes ætate haud ita valde huic malo patent,  
 non tamen penitus facile sanantur. Tempus anni non  
 vnum hanc fert egritudinem, neq; vno tempore fini-  
 tur: verum autumnus concipit, hyems alit,  
 ver ad vltimam vehementiam per-  
 ducit, æstas verò  
 interficit.



## ARETAEI CAPPADOCIS

DE SIGNIS ET CAUSIS

DIUTURNORVM MORBORVM.

Liber Secundus.

Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

Hæc insunt in hoc libro.

De Hydrope.	Cap. I.
De Diabete.	Cap. II.
De Affectibus renum.	Cap. III.
De Vitijs vesicæ.	Cap. IIII.
De Seminis effluuio.	Cap. V.
De Stomachi vitijs.	Cap. VI.
De Ventris affectu.	Cap. VII.
De Dolore intestini coli.	Cap. VIII.
De Difficultate intestinorum.	Cap. IX.
De Leuitate intestinorum.	Cap. X.
De Affectibus vteri.	Cap. XI.
De Articulorum et coxendicis modis.	Cap. XII.
De Elephantiasi.	Cap. XIII.

De Hydrope, hoc est, Aqua inter cutem. Cap. I.

A



Qua inter cutem, quam Græci Hydropa vocant, iniucundum aspectu vitium est, & toleratu difficile. ab ipso enim perpauci liberantur: idque sceleritate quadam, ac Deorum potius, quàm artis auxilio. Maiora enim omnia vitia soli Dij medicantur. Nam aut in viscere primario morbus delitescens totum in malum habitum conuertit, aut omne corpus ingruente pestilentia in malum succum viscera permutauit, quando sibi vtrique vicissim ad perniciem suffragantur: nullaque est pars noxa carens, quæ vel modicam naturæ opem asserre possit. Est autem ad humectationem fluctio frigida, crassa, qualis est nebula vniuersa: aut conuersio ab humida & frigida causa in talem habitum hominem permutante. Neque enim in inferiori ventre fluctuans humidum Hydropa nuncupamus: quandoquidem neque ibi vitium est, sed cum



## A R E T A E I

morbum consequitur tumor, inflatio, coloris foeditas; iste in aqua ha- E  
 bitus colliquescent hydrops & est, & appellatur. Nam tametsi nonnun-  
 quam foras sponte aqua prorumpit, aut aliquis præcordia rescindens ef-  
 fundit; adhuc in sede sua permanent hydropici. Princeps itaque causa  
 malus habitus est, species autem plures. verum & eius nomen aliud, atque  
 aliud. nam si sit humida suffusio, quæ in ilibus fluitet, & præ inflatio-  
 ne, cum verberantur, tympanum quodammodo referant; Tympanias  
 nominatur: at si aqua copiosa in peritoneo continetur, natantque in hu-  
 more intestina; Ascitem eam cognominarunt. Sin autem ilia nihil isto-  
 rum habeant, sed omne corpus intumescat, si ex alba pituita crassa, &  
 frigida; Phlegmatias ei nomen est: si in humorem sanguineum, aquo- F  
 sum, tenuem, carnes liquatae fuerint, Hydrops anasarca generatur. pra-  
 ua quidem est harum singularum constitutio, peior autem multo ip-  
 sarum permixtio. Nam earum, quæ in ilibus fiunt, una vni earum, quæ  
 totum corpus inflant, sociari nonnunquam consuevit. Difficillimus est  
 autem tympanias cum anasarca vocato copulatus. Ex occupantibus  
 enim ilia tympanias ascite improbius est: ex infestantibus vero totum  
 corpus leuco phlegmatias, quam anasarca benignior. Mitis quidem ut  
 in desperatis morbus est, si minor species cum minori pariter coniun-  
 gatur: peior vero, si aliqua ex minoribus cum altera ex maioribus admi-  
 sceatur. Quod si duarum maiorum mixtio exacte facta fuerit, grauius G  
 inde malum exoritur. Notæ autem maxime sunt, & visu, & tactu, &  
 auditu facillime. In ascite nanque in ilibus tumorem, in pedibus infla-  
 tionem videre licet: facies, brachia, & reliqua gracilia cernuntur, intu-  
 mescent testes, præputium, & totus colis ob inequalitatem tumoris tor-  
 tuosus est. tangito vero, & aliquam in partem manum imprimens in-  
 tro moderate pellito. ad alias enim partes humiditas transluet. Verum  
 etiam in corporis ad alterutrum latus conversionibus humor in locum A  
 decliuem & tumorem & fluctuationem facit, fluctuantisque liquoris  
 sonitus exauditur. quinetiam sicubi digitum impeggeris, locus cauus ef-  
 ficitur, & multum temporis cauus perseverat. Hæc utique ascitem si H  
 gna declarant. Tympanias autem ultra tumoris spectaculum, etiam au-  
 ditu sonorus est. nam ad palmæ percussum abdomen sonum edit: neque  
 ad corporis conuersionem spiritus locum mutat. & si enim locus am-  
 biens aliquorsum inclinat, spiritus tamen equalis supra & infra ubique  
 permanet. Ceterum si in nebulam & aquam spiritus vertatur, (nam  
 ascites ex tympania gignitur) si non perfecte mutatus aliquando fue-  
 rit, ex dimidio factus in ventre fluitat. Ceterum anasarca & leuco  
 phlegmatias ilia inania occupant: tumidam faciem & brachia reddunt:  
 & quæcunque in alijs vacua sunt, in huiusmodi ægrotis opplentur.  
 Quandoquidem



- A** Quandoquidem in leucophlegmatia alba pituita, frigida, & crassa redundat: hac omne corpus impletur: facies, collum, brachiaque tumescunt: abdomenq; ex inflatione crassescit. mammae quoque in tumorem excitantur illis scilicet, qui iuuenes robusti in etatis prospera fortuna consistunt. At in hydrope anasarca vocato carnis liquamentum fit in succum speciem carnis referentem: saniesque cruenta, qualis ab intestinorum vlcibus emanat. talis verò & à membris aliquo graui, quod superinciderit, contusis, si paulum superficiem secueris, humor effunditur. Ex duabus quidem speciebus permixtio ambarum indicia obtinebit. Omnibus verò simul inest pallor, spirationis difficultas,
- B** tussis. diuersis temporibus segnes sunt: pigritia multa, à cibo alienatio. quòd si aliquid assument quauis modicum, & flatu carens: nihilominus valde inflantur: distentiones patiuntur, quales ex saturitate fiunt. citra madorem eorum corpus est: iccirco neque in balneis sudore madescunt. præterea albidii sunt, & effoeminati. Anasarca laborantes colore ex atro, viridique permixto infecti sunt: obscurasque & nigras venas habent. In ascite atque tympania conspicua, atque admodum euidenter sunt in brachialibus atque in abdomine. In anasarca verò atque phlegmatia tumore omnia delitescunt: somni sunt graues, torpentes, breues: animæ deliquium, circa minima quæq; sollicitudo, viuendi cupiditas. tolerantia non ex animi alacritate, ac bona spe, vt in ijs est, qui prospera fortuna vtuntur: sed ex ipsa morbi natura. neq; causa dici potest, sed mirari tantum id licet, quod me hercule magnum est. nanque in alijs haud omnino perniciosis affectibus ægrotantes abiecto sunt animo, tristes, mortis amatores; in his verò & bene sperant, & vitæ cupidi sunt. Ambo hæc contraria morbi efficiunt. Aqua inter cutem nonnunquam à copioso frigide potu continuo prouenit, cum præ nimia siti ad saturitatem quispiam multam aquam gelidam ingurgitauerit; postea humidum in peritonæum delatum sit, atque inde in ventribus insitus calor refrigeratus fuerit. deinde in ilia gutta effluat, quæ prius in aerem versa per transpirationem digerebantur. Id igitur si incidit, facilius est huius morbi curatio, ante quam viscus aliquod, aut totus homo affectus sit. Cæterum & ventosus cibus, & cruditas, & buprestes aquam inter cutem pepererunt. Est hæc omnibus communis calamitas viris, mulieribus, cuicumque ætati; præterquam quòd alij in aliâ speciem sunt propensiores. In vocatam anasarcam, & leucophlegmatiam pueri: Iuuenes autem ad consistentem vsq; ætatem inundationi ilium obnoxij sunt. At senes omnibus quidem generibus sunt expositi, cum inopes sint caloris: frigida enim senectus est. verum ad humoris multitudinem contrahendam apti non sunt, ipsis igitur tympanias accide-

H



re confuevit. Omnes quidem species prauę: hydrops enim morborum **E** omnium vitium est: Sed inter ipsas leucophlegmatias mitior habetur: nam multę, & varię sunt eius tollendę prosperę occasiones, sudoris, aut lotij excretionē, aut alui nōnunquam in huiusmodi ægrotantibus copioso effluuiō, iam abeunte aquę inter cutem habitu. Difficilis autē tympanias est; adhuc tympania difficilior anasarca. Oportet enim medicum hoc in morbo totū hominem permutare. Quod per Iouem neque Dijs ipsis facile fuerit. Nonnunquam & exigua in parte homo aquam inter cutem patitur: vt secūdum caput in eo morbo, qui Hydrocephalus nuncupatur, aut in pulmone solo, aut iecinore, aut liene, aut in mulierum vtero. & cęteris hęc species sanabilior. Nam si eius ostio- **F** lum à priori conclusione hiare cœperit; humorem quidem si habeat, effundit; si spiritum, efflat. quod si vterus anasarca laboret, plurimum tota mulier aquam inter cutem patitur. Alia quędam hydropici morbi species talis agnoscitur: in ea vesiculę quędam pusillę, crebrę, humoris plenę in loco, vbi Ascites fieri solet, excitantur. Cęterum, quod humore multo refertę sint; illud indicio est, si abdomen perforaueris, parum admodum humoris effundes. Ab interiori nanque parte vesica occluit: at si in vesicam instrumentum impuleris, iterum succus emanabit. Hęc vtique aquę inter cutem species haud leuis est: vnde enim id genus vesiculę eruperint, via haud facilē reperitur. Alij nanque affir- **G** mant huiusmodi ampullas per intestina transisse. Ego verò id nunquā vidi: iccirco, neque non scribendo affirmo. nam siue ex intestino colo, siue ex ventre ferantur; qualis sit ipsarum generationis modus, quid dicam nihil certū habeo. iter enim ad omnium excretionē per sedem lubricum, ac patens est. at ipsius humoris in ilibus collecti per intestinorum rupturam egressio credi non potest: neque enim innoxium, neq; citra perniciem intestini vulnus est.

De Diabete, siue vrinę profluuiō. Cap. II.

**D**iabetes qui vocatur affectus, miraculum quoddam est, haud ita **H** sæpe hominibus vsitatus, carniū, ac membrorum in vrinam colliquatio. Frigida atq; humida, vt in aqua inter cutem, causa est. Transitus autem consuetus renes & vesica. Neque enim cum intermissione lotium reddunt: sed perinde atq; canales laxati sint, indefinens est profusio. Diuturna est huius morbi creatio, & longo tempore parturit. Breuis erit autem hominis vita, in quo affectus iste perfectus fuerit: velox enim est colliquatio, & festina interdum mors aduenit, & vita foeda est, ac vexata doloribus. Sitis intoleranda est, potus copiosus, multitudini tamen lotij non respondens. copiosius enim lotium redditur:



- A** neque eos quisquam neque à potu, neq; à mictu inhibere potest. Quòd si vel punctum temporis inhibeatur; si quidem à potu, os siccatur, corpus arescit, viscera ipsi sua conflagrare opinantur, omnia fastidiunt, de omnibus dubitant, haud multo post mortem obeunt, ardentissima sitis adest. Mictum verò quæ ratio suppresserit: aut quæ verecundia dolore potètiór? Sin autem vel parum temporis à meiando abstinuerint, intumescunt lumbi, testes & ilia: cumque remiserint, lotium quidem calefactione profundunt, tumidæ verò partes detumescunt: in vesicam enim confluit exundatio. Cùm morbus iste iam perfectus est, facile omnes eum depræhendunt. Sed cùm futurus est, os humore priuatur: sãliua est albida, spumans, perinde atque in siti: nondum tamen sitiunt. præcordia graua sunt: calorem, aut frigus à ventre in vesicam tendere sentiunt, prout aduentantis morbi processus est. quinetiam paulò plus lotij, quàm moris erat, effunditur. sitis adest, sed nondum vehemens. Cumque amplius clementi accipit, calefactio parua quidem, sed mordax visceribus inhaerens exoritur. abdomen habent rugosum, venas extantes, totum corporis habitum gracilem, quando & vrinæ profluvium, & sitis iam auctè insigniter sunt. cumque ad extremum colem vitij consensus peruenerit, protinus vrinam reddunt: atque inde mihi huic morbo Diabetes appellatio indita fuisse videtur, perinde ac si pertranseuntem dixeris, quòd in corpore humor non remanet: Sed ubique in homine collectus stagnauerit, ad exitum labitur. Durant fanè aliquod tempus, licet non admodum diu: nam cum dolore meiunt, atque atrox fit liquefactio. neque enim ex potu aliqua insignis portio in corpus absumitur, & carniù magna copia in vrinam eliquatur. Huic lingue languoris causa aliquis acutus morbus esse potest, qui hanc in partem impetum fecerit, & in crisi aliquod malignū virus latenter morbi reliquerit. Haud incredibile est etiam aliquod perniciosum venenū ex his, quæ vesicam & renes infestant, huic affectui causam præbuisse. Quinetiã si quis à Dipsade morsus sit, talis morsum affectus sequitur.
- D** Dipsas autem reptilis fera si quem percusserit, sitim non ferendam accendit, isque copiose bibit; neque siti medetur, sed ventrem obruit humore: adeo inexplibilis est bibendi cupiditas. At si quis ob ventris distentionem doleat, graueturque humoris copia, & ideo paulum temporis à potu abstineat, iterum sitiens largissime bibit. Atq; hæc est malorum vicissitudo: se nanque mutuò sitis & potus adiuuant. Alij præterea sunt, qui lotium non reddunt: neque vlla est alia eius, quod bibunt, transpiratio. itaq; potius insatiabili auiditate, humoris inundatione, ventris distentione, repente ac penitus disrupti sunt.

H ij



## De Renum affectibus. Cap. III. E

**R**enes substantia glandulas, quas græci Adenas vocant, referunt: colore autem rubidiores sunt, quale est iecur potius, quam mæmæ, aut testes. nam & hi adenes sunt, verum albiores. Figura testibus similes, lati magis sunt, iuxta & retorti. Sinus habent exiguos ad lotium excolandum cribrorum instar foraminibus peruios. Ex utroque nervosi canaliculi tanquam fistulæ expullulant, qui in vesicæ terga utrinque sese inferunt. æqualis est autem lotij à renibus in vesicam via. Huiusce via multi atque varij affectus renes, prædictosque meatus male habet: aliqui acuti sanguinis profluvio, & febribus, & inflammationibus iugulantes; hi vero sunt, quotquot ego enumeravi: aliqui diuturni hominem colliquatione dissoluentes, haud lætales quidem, sed insanabiles, & vna cum ægroto commorientes. Diuturni itaque sunt abscessus, ulcera, calculorum exortus, hæmorrhoides vocatæ. Ulcera quidem hominis ex abscessu facta omnia planè diuturnissima sunt, atque ægre sanationem recipientia. Calculorum verò diuturnissima sunt, atque ægre sanationes: haud enim facillimus est exitus. ad hæc difficilis est & lotij suppressio. At si multi sunt, & exigui calculi, sese mutuo impediētes, remorantur: aut si vnus sit magnus, locorum angustiis intrusus inhærescit. Atque si utroque in rene hæc fieri vsu veniat, interclusa vrina, distentisque locis, paucis diebus superstites ægri moriuntur. Rectè sanè natura renum ventrem oblongum, & vrinæ canalibus magnitudine equalem fabricavit, exiguis quidem calculis ampliorem, quò superius concretus calculus expeditissimum in vesicam iter inueniat. atque ideo lapilli oblongi generantur. Plerumque enim propè vrinæ fistulas id genus lapilli concrescunt: & quotquot eo loco fiunt, inæqualis crassitudinis sunt. priori in parte ob canalium angustiam gracilescent, posteriori autem crassiores fiunt: quoniam renes deorsum vergunt. in solis autem renibus oriuntur, hisque igneo calore feruentibus. neque enim sedem in fistulis vrinæ calculi obtinent, sed arenulæ cum lotio per eas fistulas inferius delabuntur, quæ & indicia & materia huiusce affectus sunt. Quòd si aliquando grandior effectus lapis concauo renis inhæserit, tunc dolores lumborum circa musculos, quos Psoas Græci appellant, excitantur, & ad medias vsque costas perueniunt. Multis sanè dolor iste, perinde ac si morbi lateralis esset, imposuit. præterea grauitas adest coxendicis: dorsum ægre incuruatur: difficulter annuunt: tormina dolores inferunt grauiā, perseverantia: intestinum enim sinuosum est. cumque exundat vrina, & distentiones increscunt, ad meiendum, ut in parturiginibus, proritantur: flatuosi sunt, sed flatus excerni ne-



- A** queunt. febres adfunt mordaces, præaride. squallida quidem lingua, sicca verò est aluus. macrescunt. à cibo abhorrent: quòd si quid assumant, neque concoquere, neque distribuere facile possunt. Sin autem in lotij canaliculum lapis inciderit, concussio corporis fit, vt in rigore. calculi progressus sentitur † còmuni simul violento. } Quòd si in vesicam delapsus fuerit, lotium aquosum vberius effunditur: aluus deijcit: flatus inde exhalant: extensus stomachus est: ructus eduntur: à prioribus malis quies datur. interdum quoque vlcerato canali præter lotium cruor emanat. Secunda porrò calamitas est, cum per colem calculus transmittitur. Nam si amplior sit, quàm vrinæ iter, (Græci Vrethram vocant,) capere possit, in eo multum temporis hesitat, atque vesica multitudine vrinæ completur: tumque eius maiore cum dolore suppressio fit. nã cum vesica & canales vteret vocati veluti incenduntur. Aegerrime autem tortuosi calculi exeunt: quosdam enim & hamatos vidi, in meatibusque adnatas quasdam callosas duritias. Plerunque autem oblongi propter canalium rectitudinem figurantur. At colore nonnulli albicat argillam referentes, talesque sæpius in pueris generantur: alij flauī sunt instar croci, hi verò in senibus reperiuntur, quibus & in renibus creari solent: crebrius enim pueris in vesica lapilli oboriuntur. Concretionis autem causæ geminæ sunt: In senibus frigidum corpus, & crassus sanguis. frigidum verò crassas materias celerius cogit. indicio sunt aquarum natura calidarum fontes: hæ nanque refrigeratæ in tophaceum lapidē condensantur. At in pueris multum sanguinis limum elixatum generandi calculi veluti sedem ignis habet. Igitur in calculi creatione talis est affectio. Cæterum nonnulli sunt, qui per quosdam circuitus sanguinem meunt, huiusmodi affectus hæmorrhoidum profluuiū similis est, similis est quoque corporis constitutio. nam valde palleſcunt, torpent, ignaui sunt, cibum fastidiunt, cruditate laborant: & cum excretus est sanguis, languidi fiunt, membra resoluuntur, caput verò leuius & agilius redditur. At si per circuitum nihil sanguinis effluerit, capitis dolore vexantur, oculorum acies hebet, tenebræ eis obuersantur, vertiginem patiuntur. Inde alij infiniti in comitalem morbum incidunt, tumidi, veluti caligine perfusi, aquam inter cutem patientibus similes: alij morbo atræ bilis, aut neruorum resolutione tentantur. Nam ex còsueti profluuij sanguinis retentione huiusmodi mala proueniunt. Si quidem à renibus defluat sanguis mundus, lotio non permixtus, plerunque tamen cum vesicæ vrina confusus emanat. Nonnunquam & ex renum disruptione sanguis fertur multus collectim. verum cogitur, & in grummos densatur: vtque in sanguine extra corpus effuso fieri aſolet, interdum vtique & in vesica congelatur: quando atrociter

† Hęc verba abunde dare videntur.



vrina supprimitur. Ruptionem verò vlcera diuturna, atque vix sanabilia sequuntur. indicia sunt ramentum, aut membranula araneæ instar rubida egrediens; aut pus album meiando profusum, modo purum & sincerum, modo cum vrina permixtum. Ab iisdem & abscessus dignoscendi sunt, si vesperi febres accesserint & rigores: dolores circa lumbos, & pruritus. At si ruptus fuerit, grummi purulenti carnisque formam representantes eijciuntur: quin etiam & albida sanies excernitur. Vlcera verò mordacia sunt, modo repurgata, modo sordentia: id pus manifestat: vrina quoque aut olida, aut nihil olens. Ver sanguinis profluvia & abscessus parit: hyems autem, autumnusque calculos. Quod si à calculis vlcera facta sint, insanabiles inde morbi nascuntur, cito colliquatio, morsque adueniunt.

De Vesicæ affectibus. Cap. III.

**V**esicæ morborum nullus placidus est. quippe acuti inflammatione, vulneribus, conuulsione, febribusque acutis interficiunt. Vlcus verò & abscessus, aut resolutio, aut lapis magnus tolli nequit: neque enim potione, aut medicamento frangitur, aut circumteritur; neque præter noxam exciditur. opus est enim & tenues vesicæ partes simul cedere. id verò aut eodem die hominem perdit, aut paucis diebus conuulsionibus, febribusque consumit. Nisi excidatur autem præter vrinæ conclusionem doloribus, febribusque, aut liquationibus homo contabescit. sin haud ita magnus sit calculus, frequentius lotium cohibetur: nam facile in ceruicem delapsus lotij transitum obstruit. securius autem quàm grandiores exciditur, sed vesica quoque necessario fauciatur. cumq; mortis periculum euaserint, in fistulam Græci Rhœada vocant, prolabuntur. quod licet periculo vacet, ingenuis tamen hominibus non est tolerandum, perpetuum scilicet vrinæ profluium, siue quis ambulet, siue dormiat, ambulanti verò maximè iniucundum. Valde parui autem plerunque citra noxam exciduntur. Quod si vesicæ inhaerent calculus, ex colliuationibus patefiet: sed neque dolorum, neque grauitatis expertes sunt, licet vrinam expedite reddant; sin minus, & vrinæ difficultas accedet. Omnes verò calculos ex fabulosis vrinæ subfidentijs depræhendes: & quod istis virilia sæpius arriguntur. quando enim meiunt, subestque calculus, dolent, tractant, attrahuntque pudenda, tanquam calculum cum vesica exempturi. Anus quoque vitij particeps redditur pruritu laborans. Prominet verò et rectum intestinum vi, contentione, imaginatione perinde, ac si iam lapis excernatur. Ambo enim inter se copulantur anus & vesica: quorum vno affecto, & alterum afficiatur necesse est. propterea inflammato podice vrinæ



**A** exitus clauditur: & vesica exacerbata sedes non deijcit, licet alius admodum sicca non sit. Tales utique sunt ex calculis labores. At sanguinis effluuium tamen non admodum cito enecet, tempore tamē procedente infinitos iugulauit. Ab eo verò grummi creantur, lotij suppresio, & matura mors non secus, atq; à calculis fieri compertum est. quanuis enim sanguis tenuis flauusque est, neque valde crassus, neque concretus; vesica tamen longo tempore congregat, ac eadem calefaciens & elixans cogit conspissatq; atque ita grummi efficitur, & vrinae interclusio, quam græci Ischuriam vocant, inferendæ morti potentissima. His accedit dolor acutus, ignis acer, lingua arida & ab his delirantes moriuntur. Sin autem à vulnere dolor excitetur; vulnus utique mortiferum est: vlcus verò & si nō protinus interficit, febribus tamen, aut inflammatione insanabile redditur. Tenuis quidem est crassitudine vesica, neruus autem substantia. quocirca neque carnem contrahit, neque facilē ad cicatricem ducitur. Accedit & vrina biliosa, acris, mordax vlceris, communis victus. Vesica enim cūm repletur, distenditur: cūm inanis est, subsidit. in extensione igitur & contractione eundem, quem & articulus, affectum patitur. In articulo verò nullum vlcus benè sanescit: suppurationem autem ex abscessu contrahit. Vesicæ signa eadem sunt, quæ & in alijs membris inflammatis: Nam etsi febribus rigoribusque succedat abscessus, eadem pericula impendent. Verū si pus crassum, album, non tetri odoris eijciat; ab his orta vlcera benigna sunt. At si depascantur; seculentam, mucidam, graecolentem vrinam reddunt. Huiusmodi ægrotantibus non tarda mors aduenit. Mordax quidem vrina est, & cum dolore est eius emissio: Ad summum vsque colem dolor peruenit. Ipsos utique omnia etiam contraria lædunt, & saturitas, & inanitio, & otium, & exercitatio, & lauatio, & illuies, & saturitas, & ieiunitas, & dulcia, & acida: cūm alia alios lædant, alios iuuent, in vnum autem conuenire non possint.

**D** De Seminis profluuiō. Cap. V.

**M**ortis quidem periculo vacat Genituræ profluuium, iniucundum tamen est, & vel auditu insuaue. Nam si intemperies & resolutio humida occupat, genitaliaque membra, (vt à frigidis contingere solet,) profluit semen: neque ipsum vel insomnis cohibere possumus. verū seu quis dormiat, seu vigilet, continens profusio est. neque id, quod fit, sensu percipitur. Aegrotant quoque & tali morbo mulieres, sed partibus illis prurientibus, & cum voluptate nonnullis genitura profunditur: quinetiam virilem coitum impudenter appetunt. Viri autem nequaquam pruriunt: nam quod effluit, humidum, tenue, frigi-



dumque est, sine colore, infœcundum. Quî enim genitale semên refrigerata natura emisit? Quòd si iuuenes hoc vitio laborent, omnes senilem corporis habitum induant necesse est: quippe qui segnes fiant, resoluti, exanimés, torpentes, hebetes, imbecilli, recurui, ignaui, pallentes, albidî, effœminati, à cibis abhorrentes, frigidi, membris graues & stupidi, cruribus impotentes, & ad omnia remissi & languidi. Multis sanè id genus agrotatio ad neruorum resolutionem (Paralyfim græci vocant) viam strauit. Quomodo enim neruorum facultas non afficiatur, cum natura ad vitæ generationem faciens refrigerata sit? Atqui & genitura vitalitatem impartiens nos viros efficit, calidos, articulatos, hirsutos, vocales, animosos, ad intelligendum operandumque valentes: id viri testantur. Contrà verò quibus non inest vitalis genitura, rugosi sunt, debiles, acutæ vocis, glabri, imberbes, effœminati: eunuchi id manifestant. Siquis autem vir & feminis profundendi abstinentis fuerit, robustus est, audax, neque vel feras expauescens: testimonio sunt ex athletis temperantes. Nam & illi, qui natura quibusdam præstant, ob intemperantiam deterioribus multo peiores fiunt: contrà natura deteriores ex temperantia præstantioribus longè meliores euadunt. Neque sanè ab alio quopiam, quàm à genitura robustum animal generatur. Vitalis itaque genitura ad sanitatem, ad robur, ad animi fortitudinem, & ad generandum mirifice confert. A Satyriasi in feminis profluuium corporis status deuoluitur.

### De Stomachi affectibus. Cap. VI.

**S**tomachus delectationis, tristitiæque princeps est, cordi periculo-  
sa vicinia, ad tenorem, animiq; alacritatem, siue abiectionem ob  
animæ consensum præcipue stomachi facultas confert. Hæc mihi alio  
loco dicta sunt. Delectationis quidem hi fructus sunt, bona concoctio,  
carnis conueniens incrementum, floridus corporis color. Tristitiæ ve-  
rò istorum cōtraria. nonnunquam & animi abiectionem cum alimen-  
to caret inducit, atra bile vexatur, cibum refugit. Cum itaque stoma-  
chus agrotat, escas odit, & abominatur, non modo cum offeruntur,  
verum etiam si non in conspectum dentur, sed eas memoria repetant,  
aut anxietate, aut madore stomachi, aut eius ostioli dolore perciti. &  
saluam effundunt quidam, & vomitibus lancinantur, corpusq; simul  
ab his vexatur. Quòd si ventriculus istorum vacuus est, dolorē, quàm  
cibi sumptionem, facilius tolerat. Sin autem interdum ad alimentum  
capiendum accedere cogitur, id multo peius est. Labor quidem famis  
est, ore cōterere, in deuorando dolor, & maior conflictatio. Ceterum  
non erga vñtata quidem ita se habet, erga aliena verò optimè; sed que  
naturaliter



- A** naturaliter habent, in contrarium mutata sunt: & omnia grauatim ferre: fugaque adest, & odium alimentorum. In interscapulis præterea dolor inheret: sed longè maior si edant, deuorentque. fastidiunt: animi pendunt: visus hebetatur: aures sonant: caput grauatur: membra torpent: crura, brachiaque resoluuntur: palpitant præcordia: dorsum imaginantur versus crura moueri: aliàs alio, huc atque illuc sese ferri existimant, seu stent, seu iaceant: quæadmodum à ventorū flatu harūdines, aut arbores agitantur: pittuitam frigidam, aqueam rejciunt. Quando verò & in biliosis redundat bilis, istorum oculi tenebris caligant: siticulosi non sunt, etsi à cibis sitire videntur: vigilant, tardi sunt: dormitant non
- B** vero tamen somno: ijs, qui sopore graui (Coma græci appellant) occupantur, similia patiuntur, macie confecti, valde pallentes, debiles, resoluti, animæ deliquium patientes, animo consternati, meticulosi, quieti, repente tamen irascentes, valde melancholici: nonnunquam enim in atram bilem, quam Melancholiam græci nuncupant, id genus agrotantes inciderunt. Talem utique stomacho impartiente animæ affectū esse oportet. Verum homines compatibilium membrorum ignari, in quibus hæc grauissima vitia fiunt, stomachum esse causam opinantur: magnum autem ad ea, quæ dico, probanda testimonium cordis contiguitas est, ubi omnium principatus collocatur: in medio enim pulmone cor sedet: horum autem medium stomachum coniungit: ambo verò dorso inserta sunt, propter hanc itaque cordis viciniam & dolor ille excitatur, quem Cardialgiā græci nominant, & resolutio, & morbi melancholici. Nempè morbi causæ & aliæ sunt plurimæ: præcipua verò pus multum à ventre per stomachum effusum. Familiare est etiam id vitium illis, qui tenui victu, & duriore coacti sunt uti: quinetia illis, qui, ut erudiantur, laborant, & eius causa multa perferunt. quibus inest diuinæ scientiæ cupiditas: qui cibi parsimonia, & vigilijs macerantur: qui doctos sermones, & res graues meditantur: qui victum pleniorē & varium contemnunt: sed famem pro alimentis habent, pro potu a-
- D** quam, & in somnis vigilant: quibus molle cubile est nuda humus, stragula vestis ignobilis, tunica lacera: ipsorum verò testum est communis aer: diuitiæ autem adeptio, atque vsus diuinæ sapientiæ. Hæc utiq; ipsis eruditionis amore bona comparantur. Cumque cibum, & illum quidem ignobilem accipiunt; id vitæ tantum, non saturandæ famis, neque potum vini causa assumunt. non eos abstrahit voluptas, non vagatio & peregrinatio, nō corporum exercitatio, nec carnum circumpositio. à quo enim disciplinæ amor non auocet? à patria, à parentibus, à fratribus, à se ipsis usque ad mortem. His igitur corporis macies adest, decolor facies, & in iuuenta senescunt: & ob cōtemplationem stu-

*his laboribz vita agra*



pidi habentur: animo autem feueri, non ridētes, immites sunt. Atqui **E**  
 ob stomachum erga cibos male affectum citò satiantur cibo vſitato, vi-  
 li & ad manum. varijs autem dapibus non sunt assueti, & erga omnes  
 cibos pigri sunt. quòd si aliquem inusitatum cibum acceperint, laedun-  
 tur, omnes alios protinus auersantes. Iste est stomachi longus morbus.  
 Inflammationes verò, destillationes, oris ventriculi morbus, (Cardiog-  
 mon græci vocant) aut dolor, stomachalis affectus non dicitur. Hunc  
 morbum æstas affert: quando & concoctionis, & appetitus, & omniū  
 est impotentia. Inter ætates verò senectæ, quibus & absq; morbo ob v-  
 tæ finem & appetentia ad extremum peruenit.

De Affectu ventriculi. Cap. VII. **F**

**V**entriculus concoctioni destinatum viscus in concoquendo la-  
 borat, cum alui profluuium, quem græci Diarrhæa vocant, ho-  
 minem premit, & est liquidi alimenti inconcocti profluuium: nisi à re-  
 centi & proxima causa vnum aut alterum tantum diem permanente  
 oriatur. præterea & totus homo debilis redditur, quia corpus non ali-  
 tur, unde lōgus morbus, Coeliacum quem vocant, efficitur, latine ven-  
 tricularis dici potest, ob concoquentis caloris imbecillitatem, frigusq;  
 ventriculi: cum liqueſcit quidem à calore alimentum, sed non conco-  
 quit calor, neque in succum proprium vertit, semicoctum imperfectū **G**  
 quē relinquens, cum perfectionem assequi non possit. id verò conco-  
 ctione destitutum ad prauum commutatur & colore & odore & cōſi-  
 ſtentia. albus est enim bile priuatus color: olida excernuntur, & lutu-  
 lenta; liquida & incoſiſtens ob proſtigatam actionem substantia est;  
 virtutem modo atque principium cōctionis præſeferens. Hac de cau-  
 ſa venter flatuosus est, ructus aſidui, tetrī odoris. Quòd si deorſum pe-  
 netrent, ſtrident intestina; flatus erūpunt aſperi, humidi, argilloſi. vide-  
 tur autem ipsis tanquam humidum quoddam effluere. Dolor ventri-  
 culi gravis est, aut subinde punſiones referens. gracilis verò, & ema-  
 ciatus homo redditur, pallidus, iners, nihil ex negocijs vſitatis valenter **H**  
 efficiens: sed cum ambulat, membra labascunt, temporū venæ exertæ  
 ſunt. ſiquidem ob alimenti penuriam tempora habent concaua: atque  
 in omni corpore venę inſignes apparent. non modo enim morbus iſte  
 non concoquit, verum ſtatim neque in molem corporis diſtribuit. Nā  
 haud ſolum concoctionis, ſed etiam digeſtionis vitium mihi eſſe vide-  
 tur. Porro ſi in incremento morbus ſit, materias ab omni corpore in  
 ventriculum rurfus adducit: tunc ea iam eſt corporis eliquatio, os eſt  
 aridum, ſuperficies ſquallida, nihil fudant: ventriculus nonnunquam  
 vt ab ardenti carbone peruritur, aliàs tanquam à cryſtallo congelacia-



**A** tunc interdum verò sanguis in extremo vitæ discrimine constitutis in  
 deiectionibus flauus defluxit, purus, non permixtus: vt venæ ostiolum  
 patefactum esse videatur. ac credo nanque venas exedit. Longissimum  
 & difficulter curabile vitium est. Etenim si absque manifesta causa de-  
 sisse videtur; iterum inuadit, vbi & ex leui errore iam denuo subori-  
 tur. Per circuitum igitur morbus iste reuertitur. Senibus hoc malum  
 familiare est, & mulieribus magis quàm viris. Pueris autem ventris ef-  
 fluium assiduum est ob quotidianam cibi intemperantiam, sed non  
 ventriculi debilitate morbus aduenit. Ex anni temporibus æstas hoc  
 malum sæpius affert, secundo autumnus: deinde hyems frigidissima,  
 si proximè ad extinctionem calor deueniat. Diuturnum quoque mor-  
 bum & affectus iste, & difficultas, & leuitas intestinorum consequun-  
 tur. Verum & largissimus frigida potus interdum hanc labem progeniuit.

**De Colicis idest intestini plenioris morbo labo-  
 rantibus. Cap. VIII.**

**C** Olici sanè voluulo & stropho, idest, torminibus celeriter necan-  
 tur. longè plurimæ sunt huiusce morbi causæ. Signa verò hæc  
 sunt, grauitas in ieiuno, vbi affectus maximè vtget: pigritia multa ad-  
 est, tardi sunt, cibos refugiunt, graciles, vigiles, facie tumidi. Quod si  
 propè splenem ægrotet colon, idest, laxius intestinum, colorem habet  
 nigrum cum viridi mixtum: album verò cum viridi, si propè iecur. ab  
 his enim proximis visceribus malum communicatur. Sin autem cibum  
 acceperint quātumuis paucum, & flatu vacantem; mirum in modum  
 tumulantur, & distendi quidem cupiditas eos incessit, sed inferius  
 exitus intercluditur: superius verò ructus violenter tentati neque ipsi  
 finem assequuntur. Siqua verò parte flatus vi erumpunt, virosi planè  
 odoris sunt sursum petentes, & acidos ructus excitantes. Renes & ve-  
 fica in partem huius doloris adducuntur: & vrina cohibetur. istis alia  
 pro alijs accedunt. Miraculum autem his maius est, quod in testes &  
 cremasteras, idest, suspēsores inopinatus dolor inuadit. Nō paucis me-  
 dicorum hæc morbi communicatio in occulto est: siquidem nonnun-  
 quam & suspēsores execuerunt, propriam morbi causam eos conti-  
 nere opinati. quocirca & his pro alijs alia fiunt. Ab hoc quoque vitio  
 alia prodeunt, abscessus, & vlcera non mitia, aqua intercus, & phthisis  
 morbi insanabiles. nam à frigore & crassis humoribus, & longè  
 glutinosa pituita propositi intestini dolor exoritur. Quinetiam & ætate, & tempore, &  
 regione frigida, & aspera hyeme prouenit.



## De Dysenteria, id est, difficultate intestinorū. Cap. IX.

**S**uperiora intestina ad cœcum vsq; tenuia & biliosa sunt, atq; inde **E**  
 Sgracè Cholades nominatur. post hæc inferiora vsq; ad intestini re-  
 cti initium crassa & carnosæ sunt. In oibus vlceræ fiunt. dysenteria verò est  
 horum vlcerum species: iccirco & varij existunt morbi. Aliqua etenim  
 superficietenus intestina radunt, excoarationem tantum facientia, &  
 innoxia sunt: sed longè innocentiora, si in inferioribus intestinis cõsi-  
 stant: alia paulò etiam profundiora vlceræ. verum neque hæc immitia  
 sunt. Alia profunda non vno loco manentia, sed exedentia, glandulo-  
 sa, serpentina, & sphacelum inferentia, mortifera sunt. Venule quoq; in  
 hisce vlcerum passionibus circumrosæ apparent: & in his vlceribus stil-  
 lationes sanguinis largiores cernuntur. Alia est species vlcerum, quæ  
 oris tumentibus aspera sunt, inæqualia, callosa, vt in ligno Gemmâ di-  
 cimus. id genus vlceræ vix medicabilia sunt: neque enim cicatricem fa-  
 cile contrahunt, & facilius aperiuntur. Dysenteria cause plurimæ  
 sunt: principes autem cruditates, refrigerationes assidua, acrium cibo-  
 rum assumptio, obsonij, quod græci Myttoton vocant, latini Moretū  
 dicerent: cœpæ ipsius, alij, carniū vetustarum, acrium esus: à quibus  
 postea cruditas superuenit. Super hæc humidum aliquod inusitatum,  
 vt mixtura illa, quæ Cyceon græcè dicitur: aut potio Ryteon appellata: **G**  
 aut qualia in singulis regionibus loco vini fiunt contrà sitim remedia.  
 plaga præterea, & refrigeratio, & frigida potus intestina exulcerant.  
 Excrementa verò, & quæ cum vlceribus sunt, alia atque alia in alijs at-  
 que alijs reperiuntur. Nam si in superficie sint; ex superioribus quidem  
 tenuia, biliosa, inodora, præter eum, qui ab intestinis fit, odorem: ieiun-  
 ni autem intestini excrementa puriora, crocea, mali odoris: Aliqua ve-  
 rò & cum alimento liquato quidem, sed aspero exeunt. at modo gra-  
 uis odor ab vlcerum putredine fit, modo vt à solo stercore provenit.  
 Ab inferiorum autem intestinorum vlceribus aquosa, tenuia, sine odo-  
 re feruntur. Sin profundiora vlceræ sint, saniosa effluunt, subrubida, vi-  
 nosa, aut instar aquæ, in qua caro lota sit: & hæc modo sola, modo cum **H**  
 stercore. hocque liquidum est circumfuso humore dissolutum, non in-  
 fectum bile, inodorum: aut compactum, siccumque, sed ob humorem  
 circumfluentem lubricum deijcitur. Caterum si maiora, leuioraque vl-  
 ceræ sint, & in superioribus intestinis; eorum ratione, à quibus, & per  
 quæ transeunt, biliosa effunduntur. sedem enim vellicant: nam bilis a-  
 cris est, eoque magis si ab vlceribus effluat. bilis verò & instar vnguinis  
 pinguis est. Ex profundioribus autem vlceribus, sed inferioribus cruen-  
 ta manant, crassa, pituitosa, carnosæ, non valde pinguis, ramentosa: vt



- A** potè quæ ab intestinis abstrahantur. quinetiam & integræ intestinorū partes commixtę sunt. Excernuntur quoque & albida, crassā, mucosā, adipis concisæ similia, humore circumfusa. Hæc utique à recto oblongo intestino feruntur. Nonnunquam sanè mucosā tantum, vellicantia, parua, teretia, mordaciaque egeruntur; crebro surgere cogentia, & deijciendi cupiditatem cum voluptate afferentia; sed quæ deijciuntur valde pauca sunt. Tenesmus huic vitio nomen est. A' cæco autem carnes longè rubicundæ, & grandes excernuntur, circumscriptionē multò maiorem habentes: in ipso enim maiora fiunt vlcerā, cruor etiā crassus, fæculentusque emanat: & hæc omnia multò quàm antedicta fœdius olent. Cæterum postquam serpunt, & exedunt vlcerā, & nullo remedio vllō in loco coerceri possunt; à superioribus quidem non solum exquisite biliosa, sed & crocina, spumea fæcem vini referētia, & nigra, isatidis, & porri succum representantia, antedictis crassiora, atque instar putredinis graueolentia deijciuntur. Alimentum nunc minus coctum est, solum ut à dentibus voracius contritum. At si inferiora intestina vlceribus erodentur; guttæ cruoris atræ, crassā, carnosā, rubidā, grummosā, nonnunquam nigra, multis modis variantia, olida, non ferenda per sedem expelluntur: humiditatumque exitus inuoluntarij fiunt. Nonnunquam oblongum quiddam in pluribus non discretum, instar sani intestini deijcitur: & ignaris rei suspicionem præbuit intestini. A' negotium ita se habet, intestinorum tunica perinde ac ventriculi geminę sunt, & altera alteri obliquè superiniecta est. Igitur cum earum connexio dissoluitur, interior tunica secundum longitudinem abfistens foras egreditur: exterior sola intus remanet, & carnosā efficitur, & cicatrice solidatur: sanescuntque homines, & viuunt. id verò inferius intestinum solum patitur. in causa est tunicarum carnosā substantia. Quod si ex quopiam vasculo cruor emanet flauus, aut niger; purus, non cum cibo aut stercore mixtus effunditur: verum concretum quiddam latis araneolis simile extenditur. in grumum enim, cum refrixit, obduratur: neque sanguinem excretum esse credideris. ob sonū autem multum cum spiritu maior quàm pro effectu, excretionis est apparentia. Interdum & in pleniore intestino purulentus abscessus efficitur, nulla nouitate ab alijs internis vlceribus differēs: etenim signa, & pus, & vlcerum medicatio penitus eadem sunt. Si res duræ, carnosæ contritis asperisque corporibus similes excernantur; abscessus non benigni moris significatur. Nonnunquam ex laxo intestino aqua multa dysentericæ modo profluit, idque plurimos ab hydropico morbo liberauit. Vlcerā quidem intestinorū (ut paucis dixerim) huiusmodi sunt. Cæterum & ipsorum formæ, & ab ipsis purgamenta tot sunt, quot su-



pra comprehendimus. Quae singulis quoque agrotantibus accidunt, explicabimus; seu placida, seu noxia vlcera sint. Itaque collectim dictū esto. si exulceratio superficietenus fuerit siue supra, siue infra; febrem non habent, nec dolorem: ac sine decubitu tenui victus ratione diuersis modis sanescunt. Sin vlcus altius descenderit, in superioribus quidem mordacia tormina & acria sunt tanquam à pauca calida bile. alijs, atque alijs temporibus suppurant intestina: plerunque verò suppurat, aut coctiones dimidiatae sunt, cibos tamen non horrent. Si inferiora vlcerata sint, longe superioribus sunt salubriora. haec enim humiliora in testina multò carnosiora sunt alijs. Sin caua & depascentia vlcera in superioribus grassentur, febres acutae concitantur, non emicantes, in vlceribus demersae: extrema refrigerantur: cibus fastiditur: vigilia adest: ructus male olent: nauseabundi sunt: bilis vomitus, vertigo. cumq; multa expellantur, (ea verò biliosiora sunt,) tormina, atque alij dolores magis perseverant. His accedit virium consumptio, genuumq; resolutio: ardore estuant: sitibundi sunt & anxij: atra per nauseam rejiciunt: lingua est arida: pulsus pusilli, debiles. atque his germana sunt, quotquot, de pernicioso vlceribus mortifera exposui. oris etiam ventriculi dolore vsque ad animae deliquium torquentur. Quidam verò neque ex eo deliquio in pristinum restituti sunt, sed in tali affectu vitam finierunt. Huiusmodi calamitates & inferiorum intestinorum corrosionibus communes sunt, si depascentur vlcera, neque eorum depasctionem compescere valeamus præterquam quòd tormina doloresque sub vmbilico inferius, vbi vlcera sunt, percipiuntur. Formae autem excrementorum tales sunt, quales supra posuimus. Verum si inter initia parua vlcera sint, in longumque tempus depasctio producat; alia alijs vlcera superueniunt, aliquibus mitescantibus, aliquibus in summum excrescentibus, quales enim sunt in mari fluctus, talis est in vlceribus tempestas. Ceterum si quando natura resistere potens fuerit, simulque & medicus subuenerit; depascentia compescitur, mortisque timor remouetur: intestina tamen dura, tumida, cicatricosaque remanent, & nō nisi longo post tempore sanescunt. Verum enimuerò cum ab intestinis cruor erupit, si ex magna vena, aut arteria exeat, matura mors aduenit: neque enim aut manum intromittere, doloremque attingere, aut medicamentum ipsi vlceri adhibere possumus. Quinetiam si medicamento sanguinis profluuium coerceatur, non propterea tuta est, ac vera mortis euasio: quādoquidem nonnullis magna crusta, (Escharam graeci vocant,) decidens, venae ostiolum patentius efficit. Vbi verò & grummi intus concrescunt, intusque remanent, ineuitabilis morbus est. Incipientibus igitur sanguinis eruptionibus succurrere oportet, plerunque autem cum



**A** futurae sunt, licet non admodum claris signis, tamen sese indicant. anxietas enim adest, & animi ambiguitas: grauitas ea in parte est, quae rupitur: & facies rubet, si nondum ruptura facta est. Sin autem vena proximè resecissa est, plurimum venter mollior omnino: si satis temporis præterijt, difficilius, atque tardius soluitur. Huiusce qualitatis sunt intestinorum vlcera. Præcipue nascuntur aestatis tempore, secundo autumni, minus vere, minimè hyeme Pueris quidem, & adulescentibus ventris profluvia contingunt: difficultas autem intestinorum viris & iuuenibus. Senectæ verò agrè medicabilis est, & ad ducendam cicatricem longum tempus requirit. At vlcera exedentia senibus inusitata, sanguinis verò profusio senectæ est conueniens.

## De Lauitate intestinorum.

## Cap. X.

**S**ia torminibus, & ab latis, valdeque profundis superiorum intestinorum vlceribus cicatrices crebrae, crassae, solidaeque contrahantur, stercora ex his deorsum liquida, ab alibili indiscreta prolabuntur. Intestinorum enim raritas, per quam sursum versus alimonia discurrit, à cicatrice interclusa est. Homo igitur nutritionis inopia laborat: & pallor adest, & infirmitas. Affectus iste qui ab cicatrice fit, Lienterie cognomè accepit, ab intestinis scilicet, quae Graeci Entera vocant: & nunc quidem à cicatricibus morbus exoritur. Alias verò intestina cicatricis experta sunt, sed consuetudo & exercitatio intestina profluum pati edocent. In istis enim calidum quandoque refrigeratum est: vt neque concoctionem, neque digestionem molliatur: sed præ imbecillitate retinere non potest, omnemque elaborationem alimentum subterfugit. Quod si ex tempore, & non stabilis, sed leuis mouenti purgatio fiat, simplex à cibis vomitus morbum soluit. Sin autem aliquo tempore prorogetur, et in sede firma istorum causa permaneat, nihil opis vomitus affert. Morbus quoque longus, & malus habitus, qui decumbere non cogit, lienteriam peperit. Aqua intercus nonnunquam in hanc agritudinem feliciter commutata est, in malum scilicet ex malo. sed melior est successio.

## De Vteri morbis.

## Cap. XI.

**M**ulieribus vterus ad purgationem & partum bonus est, sed morborum infinitorum, malorumque aceruum congerit. neque enim vlceribus tantum, & inflammationi, & fluori obnoxius est; verum etiam si totus repete sursum versus moueatur, celerem interitum affert. Alibi quidem scriptum est, qui nam ipsius morbi perniciosi acuti sint. Diuturni verò hi: fluor duplex, duritia, vlcera aliqua innoxia, ali



qua maligna, exitus totius aut partis. Fluor sanè ruber, aut albus est, for  
 ma declarat. Ruber quidem, si sanguis flauus emanet, & huius species:  
 vel liuidus, vel niger & tenuis, vel crassus et concretus, vt grummi. Al-  
 bus, vt aqua, aut flauus cum pallido mixtus vt bilis; crassus, verò aut sub  
 tenuis, aut tenuis liquor, quem græci Ichora vocant, & male, olens. al-  
 bus item, vt pus. sed exquisitè albus, vt album serum. quin etiam gutta  
 cruenta nonnunquam cum pure simul effluit: mille aliæ sunt secun-  
 dùm rationem maioris & minoris istorum species. Circuitus verò mo-  
 do est menstrua purgatio, sed non ad pristinum præscriptum diem re-  
 uertitur. non multus quidem sanguis, sed per multos dies effluit. pau-  
 corum autem dierum fit interpositio, sed omnino pura. Alter est cir-  
 cuitus modus, sed ad certum diem: neq; plurimi sanguinis est plerunq;  
 prima purgatio, bis autem ac ter purgantur per totum mensem. Tertia  
 est quoque fluoris species, indefinens quidem effluuium est, & singulis  
 diebus modicum: sed in totum mensem summa fit non admodum mo-  
 dica; neque enim vterus ostium claudit, sed hiat, ad effluxum humidi-  
 tatis relaxationem patiens. Verum si neque intermittatur, neque pa-  
 rum effluat, ob sanguinis effusionem moriuntur. Signa utiq; hæc sunt,  
 præter humiditatis effluētis colores, ipsius hominis color, peruigilant,  
 cibos oderunt, anxietate vexantur, dissoluuntur in rubro profluui-  
 o magis, & dolore torquentur, & in ambobus quod effluit, mali odoris  
 est, sed modo magis modo minus. Albū enim profluuium peius olet,  
 si quando maior adest putredo. Alias autem rubrum, cum sæuius de-  
 bacchatur erosio. Breuibus sanè dictum esto, ater fluor omnium pessi-  
 mus est, deinde liuidus. Pallidus, albus et purulentus, diuturniores qui-  
 dem sunt, sed minus periculosi. Ex his ipsis pallidus deterior quidem  
 est, sed longe melior est ille, qui cum vtitato colore mixtus est: vtitatus  
 autem est ruber, eiusque species. Quin etiam & ipsis minus noxi sunt  
 vtitati: sed re vera senioribus infestiores sunt rubri fluxus, minimè au-  
 tem puellis, quibus magis albi nocent. Item altera est albi fluoris spe-  
 cies, menstrua purgatio, exalbida, acris, & pruriginem cum voluptate  
 afferens. In istis verò humor albus, crassus, genituræ similis prouoca-  
 tur; hæc speciem Gonorrhœam, idest, fluxum seminarium muliebrem  
 appellauimus. Est autē vuluæ refrigeratio: quam ob rem humorum te-  
 nax esse non potest: quin etiam sanguinem in albidum colorem trans-  
 mutat: vim enim ignis rubrificam non habet. Id genus vitij & stoma-  
 chus patitur, ideo & pituitam euomit. Simili affectu & intestina labo-  
 rant, cum profluuiio græce Diarrhœa vocato, ægrotant. In vtero præte-  
 rea vlcera suboriuntur, aliqua lata, pruriginosa, tanquam sale inspersa:  
 hæc sunt quædam superficiiei excoariatio. pus habet crassum, inodorum,  
 paucum.



**A** paucum. Vlcera huiusmodi mitia sunt. His cauiora sunt vlcera & deteriora, quibus dolores parui accidunt, pus paulo plus, grauius olent: nihilominus tamen hæc quoque placida sunt. Quod si altius penetrent, & labia dura aspera que fuerint, & sanies quædam olida exeat, & quàm in superioribus, dolor sit maior, exedit vuluam vlcus, & nonnunquam caruncula quædam separata egreditur. neque ad cicatricem vlcus id ducitur, sed longissimo tempore hominem tollit: nam maxime diuturnum est. huiusmodi græco vocabulo Phagedæna nuncupatur. Nempe mortifera vlcera sunt, si præter ipsa dolor exacerbat, & mulier valde contristatur: & res putrida ab vlcere neque ipsis agrotis tolerabilis emanat, efferaturque manuum attrectatione et medicamentis, & quolibet genere medelæ exasperatur. venæ autem in vtero turgent, & proxime simul partes distenduntur. id verò perspicacibus medicis tactu deprehenditur: neque enim aliter liquet. cæterum ignis & anxietas totius, & duritia simul, vt in feris vlcerebus insunt, quæ & ipsa mortifera sunt, necnon & Cancræ appellationem obtinent. At cæcer neutiquam vlcus est, sed tumor durus & indomitus, qui vnà totum vterum distendit: dolores quoque, & reliqua omnia, quæ in vlcere insunt, cancrum comitantur. Hæc eadem vero cancerosa vtraque sunt, et diuturna, & perniciosa. Vlceratus autem cancer non vlcerato longè improbius est, & odore, & doloribus, & vita, & morte. Nonnunquam integra vulua de sede sua egreditur, & mulieris feminibus infidet. incredibilis calamitas: Sed neque inaspectabilis est vterus, neque ingenerabilis causa. relaxantur enim membranæ ilibus appensæ: quæ vteri sunt ligamenta nervosa: quæ in fundo sunt iuxta lumbos gracilia, quæ in ceruice hinc atque inde iuxta ilia, maxime nervosa, lataque sunt: qualia nauigiorum vela cernuntur. Omnes igitur hæ membranæ remittuntur, cum vulua foras procidit. plerumque sanè huius exitus mortem affert. Accidit enim ex abortu, & magnis concussionibus, & violento partu. At si non interficit, diu hæ vitam producant, non visibilia videntes, extra alentes vterum, atque fouentes. Videtur autem nonnunquam duplicitatis vteri interius succingens tunica, quando à contiguo diuellitur. Geminae nanque membranæ tantum sunt differentes à tunica. hæc verò abscedit & fluctione, & abortu, & violento partu quando ipsa secundis inherescit. Nam cum ipsæ vi extrahuntur, simul & vteri tunica extrahitur. verum nisi pereat mulier, reuertens eadem tunica vtero adamusum connectitur, aut paulum extra prominet: contigit autem feminibus mulier. Nonnunquam vteri osculum solum ad ceruicem vsque procidit, sed rursus intro se recipit, si vterus suffimenta mali odoris olfaciat. ipsum quoque mulier attrahit, si grata odoramenta naribus

K



subijciat. Quinetiam obstetricis manibus paulatim intro recurrit, si E  
placide & sensim prematur: & prius remedia mitigatoria, quæ græci  
Hysterica vocant, id est Vterina ei adhibita fuerint.

De Arthritide & Ischiade, id est, Articulorum &  
Coxendicis dolore. Cap. XII.

**C**ommunis omnium articulorū dolor est Arthritis: sed pedum  
dolorem Podagram vocamus, coxendicum Ischiada, manuum  
verò Chiragram. Nèpè aut ex tempore dolor est, si ex aliqua parum  
durantē causā confurgat: aut latenter meditationibus longo tempore  
contractus est morbus, cum ab exigua occasione dolor & morbus ac- F  
cenduntur. Est autem omnium simul neruorum affectus, si auctū ma-  
lum omnibus ingruat. Initio verò nerui articulorum vincula, & quæ-  
cunque ex ossibus exorta sunt, & in ossa inferuntur; dolere incipiunt.  
At istorum magnum est miraculum: non dolent quidem vel minimū,  
etiam si quis fecet, aut collidat: at si quis ab ipsis doleat, nihil aliud est  
eis ad dolorem citandum potentius, non ferramenta adstringentia, nō  
vincula, non vulnerans gladius, non exurens ignis. nam & hæc assu-  
muntur tanquam maiorum dolorum remedia. Quod si quis ipsa dolē  
tia ossa præciderit, sectionis dolor, vt exiguus à maiore obscuratur. Sin  
autem iste præualeat, eos voluptas capit priorum malorum obliuionē G  
afferens. id sanè patiuntur dētes et ossa. Causam quidem veram soli Dij  
nouerunt, probabilem verò & apparentem etiam homines. Est autem  
(vt simpliciter dicam) huiusmodi. Quod prædensum est, contactū, vul-  
nerationemque non sentit: iccirco & ex tactu vulnerationeque nō do-  
let. Dolor enim est res aspera sensui: densum autem non exasperabile,  
ideo quoque est indolens. At rarum bono sensu præditum est, & vul-  
nere exasperatur. Cæterum quoniam & densa ingenito calore viuunt,  
per hunc eundem calorem etiam sentire possunt. Siquidē efficiens cau-  
sa substantialis sit, vt gladius, aut lapis, substantialis patientis corporis  
pars non dolet: natura enim densa est. Sed si caliditatis insitæ intempe- H  
ratura corripiatur, sensus fit permutatio. cumque ipsorum ex se ipsa do-  
let caliditas, ab interna sensus pulsione excitatur. natura autem in ma-  
ius excedente, vel ex abundantia dolores proueniunt. At aliàs in alios  
articulos morbus articularis inuadit, quibusdam in coxendices, (eaque  
parte plerunque claudus remanet): & in alia quædam membra nonnū  
quàm exiguus. quandoque nec in paruas particulas transit pedes et ma-  
nus. nam si maiora membra occupauerit morbum ipsum capere valen-  
tia, instrumenta illa non supergreditur. Sed si ab exiguo membro ini-  
tiū cœperit, mitis est, & inopinata inuasio. Ischiadis quidem à femore



- A** posterius, aut poplite, aut tibia initium est. Aliàs verò in coxæ cauo (Corylam græci vocant latini Acetabulum) dolor apparet, rursus in clunē, aut lumbos impetum facit; & omnia potius esse videtur, quàm coxendicis morbus. Verum etiā articuli ita ferè dolere incipiunt, magnum pedis digitum dolor occupat: rursus calcem in priori parte, qua nitimur; deinde in concavam subit: Malleolus autem postremus intumescit. Doloris causam non legitimam afferunt, aliqui nouæ cræpidæ attritum, aliqui longam obambulationem, alius plagam, aut calcationē, nullus intestinā domesticamque causam explicabit. Quin etiam egrotis verum audientibus incredibile esse videtur. quam ob rem in insana
- B** bilem affectum inciderunt. quoniā principijs, cum debilissimus morbus est, medicus non resistit. qui vt temporis spatio vires acquisiuit, nihil medici diligentia proficitur. Quibusdam in pedum articulis vsque ad mortem residet morbus, quibusdam in omnis corporis ambitu vagatur, plerunque à pedibus in manus prosilit. neq; enim multum interest in pedibus ne, an fiat in manibus: cum vtriq; eiusdem nature sint, graciles, excarnes, externo frigori proximi, à calore interno remotissimi. Item cubiti flexura, & genu conueniunt. post hæc coxarum cauitates, quas Corylas græci vocat, et vocatus Peristrophus. Transitus quoq; in dorsū, thoracisque musculos fit: incredibileque est, quàm late malū serpat. Vertebrae dorsū, ceruicisque dolent, & in summo sacri ossis dolor inherescit. simulque omnium bos, asinus. & proprius cuiusque dolor. Verum etiam tendones & muscoli cum distentione dolorem patiuntur, necnon maxillarum, & temporum muscoli. Item communicatur renibus & vesicæ. O re admirabilem. Post omnia nares, et aures, et labia afficiuntur. Nam quoquo versus nervi & muscoli in capite feruntur. dolent capitis futura, & quid doleat agrotus ignorans indicat futurarum species obliquam, rectam, transuersam, posterius, ac prius. Tenuem autem dolorem & in ossibus defixum conqueritur: Vniuersam enim ossium compagem morbus populatus haud secus, atque pedis, aut manus articulum. In articulis quoque tofacea quædam coalescunt. ab initio quidem veluti abscessus occupant: postquam verò magis spissantur, etiā concreto humore difficiles sunt inflexiones: demum tofi solidi albi consistunt. in toto autem membro tubercula exigua, quales sunt Ionthi à græcis appellati, Vari à latinis, & maiora exurgunt. humiditas verò crassa, albicans, grandinosa est: nam & totius morbus frigidus instar grandinis est. Videtur autem caloris, aut frigoris differentia præ se ferre. siquidem modo ex calore, modo ex frigore voluptas percipitur. At mihi placet vnicam esse morbi causam insitam frigiditatem, vnicumque esse affectum, verum si protinus increseat, & caliditas ap-



paruerit, refrigeratione opus est: ac talibus delectatur: & huiusmodi affectum calidum vocant. Quod si dolor in intimis nervis demoretur, & articulus non calens collapsus sit, neque extumeat; frigidum hunc esse dixerim: in quo ad caloris reuocationem medicamenta calida requiruntur. multis autem in valde acerbis opus est. Caliditas enim collapsas partes in tumorem excitat, & internum calorem ad superficiem euocat. quo tempore frigida medicamina proficient. Huic rei fidem id facit, quod iisdem eadem non conducunt. nam quod modo profuit, id alias noxium fuit. atque (vt compendio dicam,) calore in principio, frigiditate in fine opus est. Haud facile quidem continua podagra gignitur: sed nonnunquam longo interuallo temporis intermittitur. tenuis enim est. Et in ludis olympicis podagricus morbo sedato cursu victoriam adeptus est. Viri facilius in hunc morbum incidunt, & ex mulieribus agiliores. Mulieres autem, licet rarius, quam viri, difficilius tamen hoc vitio laborant. Quod enim neque vsitatum, neque familiare est, id si aliqua urgente causa potentius euaserit; violentum cum sit, maiorem calamitatem infert. Aetas autem huic morbo subiecta est à quinque annis, supra triginta. celerius quoque, aut tardius, pro vt cuiusque natura, aut victus ratio postulat. Atroces sanè dolores sunt, sed dolores comitantia atrociora: defectus animæ, ad manuum contactum immobilitas, ciborum auersatio, sitis, vigilia. Si discrimen euaserint; tanquam ab inferis elapsi laxiorem vitam degunt, incontinentes, simplices, hilares, auari, & in victu molles, ac delicati. Idcirco verò tanquam mortem rursus subituri licentiosè præsentī vita fruuntur. Multis in hydropicum morbum podagra concessit, quibusdam in deprauatam spirationem, Asthma greci vocant, latini Anhelitum. Hæc verò successio medicabilis, atque inuitabilis est.

## De Elephantiasi.

## Cap. XIII.

Elephanti morbo & feræ elephanti communia multa sunt & specie, & colore, & magnitudine, & victu. Verum neque vlli alij similia sunt, neque affectus affectui, neque animal animali. Nā Elephas fera longè ab alijs differt. primum quidem ingentissima crassissimaque est. Magnitudo enim tanta est, vt magnum animal super aliud animal turris instar imponere queas. Crassitudo quoque tanta quātam plura crassissima animalia inter se coniuncta vix æquare valeant. Ceterum neque specie cuiquam admodum similem inuenias: siquidem omnes exquisite nigro colore toto corpore obscurantur. Nam equorum alius candidissimus est, quales Rhesi equi thracij: alij albis pedibus, qualis Menelai Podargus: alij flauis, quales cætum & quinquaginta: alij cœ-



- A** rulei, vt illud Homeri, factus equo similis concubuit Cœruleos habens crines. ita boues se habent, ita & canes, ita quælibet reptilia, & animalia, quæ super terram depascuntur. Elephantes autem soli nigri, tenebricoso colore, nocti & morti similes. Specie verò tali sunt. capita quidem & facies fœdas habent, figura non euidenti, super breui ceruice, vt caput in humeris confidere videatur: atque ideo non euident est. aures enim grandes sunt, latæ, alarum similes, ad iugula vsque & pectoris ossa. Hæ ceruicem armosque tegunt, sicut nauigia velis conteguntur. Cornua verò mirandum in modum candida nigriori colori internitètia possidet Elephas. alij hæc dentes appellant. Hæc sola autem candidissima sunt, quale nihil in vlllo alio quauis candido animali reperitur. & hæc ipsa non super frontem & tempora, qualis cornigeris natura est, sed in ore superiori quæ maxilla sita sunt, prorsum versus spectantia, recta non admodum, sed paulum in superiora retorta, quo à recto detorqueri liceret, & in finis dentibus pondus extollere. Grandia utique cornua sunt, longitudinem extenti brachij, Orgyiam græci vocant, æquat mediocria. alia his multo longiora duplo longiora sunt. prominentiam habet superior maxilla à labro enascentem, lōgam, exossem, tortuosam, serpentis similem. Duo verò in summa prominentia foramina sunt: & hæc in pulmones vsque pertinentia natura terebrauit duplicis tibiæ imaginem referentia. Hac sanè fistula tanquam nare ad respirationem, necnon & vice manuum id animal utitur. poculum etenim, cum velit, hoc processu corripit, compelectiturque, & valide retinet: neque ab eo quispiam vi eripere posset, nisi alius sit potentior Elephas. herbam etiam ad pabulum hoc quærit: neque ore minoribusque dentibus carnes edendo vitam ducit. prælongi enim pedes longe à terra distans animal sustinent. quinetiam breue (vt diximus) collum est, ore igitur humi pabulari non potest. Nōnunquam & cornuum ab ore processus herbam os tangere prohibet. Itaque hac prominentia magnum pondus haurit: deinde quotcumque venatur, hac complexus ventri futura alimentū in os detrudit. Ritè igitur primi illi Proboscida hanc vocauerūt, nam, pro, id est, ante se animal, hac boscetę, id est, pabulatur. Verū enim uerò neque ex palude aut flumine ore bibere ei licet. Eadem. n. causa est, quæ si sitiat, proboscidis extremā narē in aquā demergit: deinde tāquā respirās, vice aeris, multū aquę attrahit: ubi verò impleuit, narē ceu poculū in os fluminis instar effundit: deinde iterū attrahit, iterumque effundit, quoad ventrē tanquam onerariam nauem compleuerit. Corium habet asperum, crassissimumque, tumoribus inæquale, fissuras habens, ceu semitas prælongas, aliās diuisuras concauas transuersas, aliās verò obliquas valde profundas. Totū Tripodonio persimi-



le est. Pili autē alijs quidem animalibus natura, aut setæ sunt, Elephan- **E**  
 ti verò sordida lanugo est. Infinitæ sunt & aliæ differentia inter ele-  
 phantem & cetera animalia. Etenim retro versus quandoq; secundum  
 genu flectitur, quemadmodum & homo, & mammas propè axillas ha-  
 bet, ut mulieres. Cæterum non in præsentia mihi opus est de animalis  
 huius natura tractare, nisi quatenus ex eo & morbus Elephas vocatus  
 patefiat; quotq; ægrotantis forma huius animalis naturæ similia obti-  
 neat, agnoscatur. Morbum quoque hunc Leonem vocauerunt, ob ex-  
 tremarum frontis rugarum similitudinem: quam partem græci Episce-  
 nium nominant. De ea posterius suo loco dicitur. Satyriasis etiam **F**  
 appellatur ob malarum ruborem, atque inexplabilem impudentemq;  
 coeundi libidinem. Necnon & Hercules dicitur, quoniam eo nullus  
 maior est, neque valentior. Magnus est quidem potentia morbus. ad  
 mortem enim inferendam est omnium longè efficacissimus. est etiam  
 visu foedus, & in omnibus terribilis, quemadmodum & elephas belua.  
 Inevitabilem quoque affert interitum: quandoquidem à mortis causâ  
 ducit originem. Ea ingeni caloris frigiditas est non exigua, vel potius  
 congelatio, ceu quædam sæva hyems: cum aquam in niuem, aut etiam  
 grandinem, aut crystallum, aut glaciem conuertit. Hæc est communis  
 mortis ac morbi causa. Verumtamen neque vllam insignem coniectu-  
 ram morbi principium obtinet: neque vlla noua, atque inusitata labes **G**  
 hominem incesit: neque in corporis summis partibus repræsentatur,  
 ut protinus videre quis possit, & incipienti malo resistere. sed in visce-  
 ribus tanquam domo Plutonis delitescens ignis iam succeditur, inter-  
 norumq; victor rursus in superficie aliquando exardescit. Plerumq;  
 sanè à facie hæc pestis incipiens tanquam ignis de specula procul con-  
 spicius effulget: Nonnullis verò ab extrema cubiti curuatura, à genu,  
 à manuum, pedumq; articulis. Idcirco autem huiusmodi hominum  
 salus desperata est: quoniam medicus ad morbi debilissima initia artē  
 non adhibet negligens, & ægrotantiū calamitatis ignarus. Tardi enim  
 sunt, ut ab aliquo leui & vulgari causâ, somniculosi, quieti, sicca aluo. **H**  
 Hæc etiam sanis haud valde inusitata sunt. In morbi autem crementis  
 respiratio graue olet ob interni spiritus exhalationem. Huiusce rei aer,  
 aut quippiam aliud extrinsecum causam præbere videtur. Lotium cras-  
 sum est, album, turbidum, quale iumentum reddit. Venerem appetunt,  
 & crudorum & inconcoctorum distributio fit: neque istorum est sen-  
 sus & meditatio. neque enim concoxerint necne, percipiunt: & crudi-  
 tas hæc concoctioni similis est. nam ipsis haud frequens est in optimum  
 aut familiare concoctio. Digestio verò facilè fit, tanquam in suum ip-  
 sius alimentum raptim morbo attrahente: propterea valde siccitate in-

\* Aliter  
 intrinsecū.

\* Aliter  
 feminis  
 crudi &  
 incocti  
 emissio  
 fit.



- A** ferioris ventris laborant. Tumores alij iuxta alios exurgunt, nondum quidem continui, sed crassi & asperi: & interstitium tumorum discissum est, vt elephantis corium. Venæ late sunt, non sanguinis redundantiæ, sed cutis crassitudine. Non multo post autem & sedes declarat vniuerso corpore in æqualem tumore distento. Pili in omni corpore præmoriuntur in manibus, femoribus, tibijs: Item in pube, in mento rari sunt: rara quoque in capite casaries. quod verò maius est, intempestiui cani, & caluitium affatim subitoque ingruunt. non multo post autem pubes & mentum glabrescunt. Quod si qui pauci pili remaneant; hi magis dedecent, quam qui defluerunt. Capitis cutis altius rescissa est: rimæ
- B** autem frequentes, profundæ, asperæ sunt. Tumores in facie duri, acuti: nonnunquam fastidio albido, basi viridiore. Pulsus pusilli, graues, tardi, tanquam per cœnum vix se mouentes. Venæ temporum distentæ sunt, & sub lingua ventres biliosi. Lingua grandinosis varis exasperatur. Neque inopinabile est & omne corpus talibus scatere tuberculis: quandoquidē & in victimis prauos humores habentibus carnes grandinis plenæ sunt. Sin autem valde ab ïtimis partibus erumpet morbus, & in extremitatibus apparebit, impetigines summos digitos infestabunt, genua prurient, pruritusque cum voluptate scalpetur. Ambit verò impetigo & mentum nonnunquam in orbem: rubent male cum tumore
- C** haud ita magno: oculi caliginosi, ænei coloris sunt: supercilia prominentia, crassa, glabra, deorsum versus pondere vergentia: contractis glabellis eminēs tumor insurgit: color liuidus, aut ater est. Episcenium vehementer contrahitur, vt oculos contegat, quemadmodum irascen-  
tibus, aut leonibus accidit: vnde & Leonina hæc egritudo vocatur. Igitur neque leoni, neque elephanto solum, verum etiam nocti tenebrose æquales sunt. Hypopia, id est, sub oculis insurgentia ossa, & nares cum atris tumoribus salebrosæ, extantesque sunt. labiorū prominentia crassa est, pars autem inferior liuescit, nāsus tumet: dentes nō albi sunt, sed nigricare videntur. Aures rubent admixta nigrizia, obstructæ, elephantice, vt grandiores consueto esse videantur. Vlcera in basi aurium sunt: sanies defluit: pruriunt. Totum corpus rugis asperis exaratur: necnon & altè descendunt scissuræ veluti nigri in corio sulci. propterea & Elephantas huic morbo nomen est. Plantarum et calcaneorum vsque ad medios digitos fissuræ sunt. Quod si plus augeat malum; tumores malorum, menti, digitorum, genuumque vlcerosi fiunt. vlcera fœtida sunt, & insanabilia: alia enim super alia exurgunt, super alia alia nitescunt. siquidem membra hominem diu morte præueniunt, quoad de corpore excidant nāsus, digiti, pedes, genitalia, atque totæ manus. Neque enim hæc labes prius perimit, a turpi vita, seuisque cruciatibus liberās, quam

\* Aliter  
atq; extat



membratim dilaceratus homo sit. At longæua est, quemadmodum & **E**  
 Elephas animal. Sin autem membrorum recens dolor sit, longè acer-  
 bius affligit. Aliter atque aliter paratorum ciborum appetentia est non  
 obtusa, sed gustatus qualitatis expers est: nullaque edendi ac potandi  
 delectatio. omnia verò ob doloris cruciatum oderunt: alimento priua-  
 tur corpus: rabiosa inest cupiditas: spontinæ sunt lassitudines; singulo-  
 rum membrorum species hominem grauitate inusitata premit, quan-  
 tumlibet exigua membra sint. quinetiam corpus omnia grauatim fert:  
 non balneis delectatur, non illuue, non cibo, non ieiunio, non motu,  
 non quiete: ab omnibus enim morbus alienus est. somnus tenuis, vigi-  
 lia peior mala sua cogitans. spirandi vehemens difficultas: suffocatio- **F**  
 nes fiunt, ac si laqueo strangulentur. Hoc igitur pacto nonnulli vitam  
 perdiderunt, inexcitabilem somnum in mortem dormientes. Itaq; ta-  
 les, cum sint, quis non aufugiat? aut quis non auerfetur, licet filius, aut  
 pater, aut etiam germanus frater sit? cum metus est, ne morbus comu-  
 nicetur. Propterea multi in solitudines & montes sibi charissimos ab-  
 duxerunt; aliqui eorum egestati, quoad viuerent, subuenientes, ali-  
 qui verò minime: cum eos vita defungi mallent. Fama est eorum  
 quendam, qui in solitudinem expositi erant, ex terræ latebris rep-  
 tantem viperam intuitum, aut fame coactum, aut morbi tædio in-  
 ductum, vt malo malum commutaret, viuentem viperam edisse, neq; **G**  
 prius è vita migrasse, quàm omnia ipsius membra computruerint, atq;  
 exciderint. Alterum præterea ferunt, viperam in musti dolium irre-  
 pisse cōspicatum, cum mustum ad satietatem ingurgitasset vomuisse,  
 multumque veneni simul cum musto reieciisse, quoniam in musto fe-  
 ra extincta fuerat: iterumque hominem mustum largissimè epotum,  
 vitæ pariter ac morbi finem quærentem. vt verò satiatum, iuxta inebria-  
 tusque fuit, primum quidem humi prostratus instar morietis iacebat:  
 posteaquàm deinde graui sopore experrectus est, ebrietatemque dis-  
 cussit, in primis comæ defluerunt, præterea digiti & ungues; dein- **H**  
 cept omnia in ambitu corporis membra contabuerunt. quoniam ve-  
 ro adhuc in semine facultas erat, iterum tanquam ab ortu hominem  
 natura veluti ex cera creauit. alios enim crines enutriuit, ungues no-  
 uos, & nitidam carnem instaurauit, ac vetus corium ceu serpentis se-  
 nectam exuit: & tanquam alter homo ad vitæ munia reuocatus est. Ita  
 habet fabula non admodum quidem vera, neque valde fidem exce-  
 dens. Malum enim malo pulsum esse probabile est: naturam verò ex  
 residua vitæ scintilla hominem redintegrasse, haud ita à ratione ab-  
 horret, vt monstro simile esse uideatur.

Aretæi



## ARETAEI CAPPADOCIS

DE MORBORVM AC V

TORVM CVRATIONE.

Liber Primus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Prooemium.

Curatio phreniticorum.	Cap. I.
Curatio Lethargicorū, seu Vernoſorum.	Cap. II.
Curatio Tabis.	Cap. III.
Curatio Apoplexiæ.	Cap. IIII.
Curatio acceſſionis morbi Comitialis.	Cap. V.
Curatio Tetani, seu Rigoris.	Cap. VI.
Curatio Anginæ.	Cap. VII.
Curatio vitiorum columellæ.	Cap. VIII.
Curatio Peſtilentium in faucibus vitiorum.	Cap. IX.
Curatio Pleuritidis, id eſt, morbi coſtalis, ſeu lateralis.	Cap. X.

Prooemium.

Cap. I.

A



Cutarum ægritudinum medicamina ſpeciebus ſignorum contigua ſunt, quæ ſuperioribus libris à me cõprehenſa fuere. Quæcunque ſanè in febrium curatione ſiunt ſecundum ipſorum differentiam, & ſecundum morborum ſpèciem, & in ipſis diuerſitatem; eorum plura in Tractatione de Febribus explicabuntur. Quotquot autem cum febribus acuti morbi ſiunt, qualis Phrenitis eſt, aut ſine febribus, qualis Apoplexia; eorum duntaxat medicamina commemorabo: vt ne aberrem, neque verboſior ſim, alia in alijs deſcribens locis. Idem vero principium, quod & de morbis feci, eundem etiam finem faciam.

B

Curatio Phreniticorum. Cap. II.

**A** Egrotum cubare conuenit in conclau mediocris amplitudinis, aeris temperati, hyeme tepidi, æſtate frigidioris. vere autem & autumnò ſecundum temporum naturas coniectura vti decet. Deinde quieſcere iubendum eſt & ægrotos ipſos & omnes domeſticos. Acutè nanque audiunt phrenitici, & ſtrepitibus irritantur, nec non & ab his

I.



in furorem aguntur. Parietes laues sint, æquales, neque supereminentes, neque festucas, aut aliquid exertum habentes, neque picturis exornentur: pictura enim parietum mentem turbat: nam præ oculis falsa quædam simulacra obuersantur, & quædam non eminentia tanquam eminentia manibus contractant, omnisque occasio citra causam manuum agitationem prouocet. Cubilis longitudo & latitudo moderata sit; quò neque in ampliori volutari, iactarique possit, neque à nimis angusto delabi. Stragule vestes glabræ sint, vt ne floccos colligendi in mentem veniat. In molli lecto decumbant; nam durum stratum neruis ingratum est. Nò minime autem inter ceteros egrotantes phrenitici neruis laborant: facile enim cohuelluntur. Amicissimi eos inuisant: fabulæ & sermones animum ne vellicent: cum delectabilia omnia esse oporteat, illis præcipue, quorum iracunda infansia est. Vtrum in tenebris an in luce habendi sint, ex morbi natura conijcere debemus: nam si ad lumen efferantur, & quæ non sunt, cernunt, & quæ nò adsunt, cogitant, aut pro alijs alia cognoscunt, aut quasdam nouas & vanas imagines accipiunt, atque in summa lucem, aut quæ in luce sunt, extimescunt; obscuro loco eos continere præstat: Sin secus se habeant, lucido bonum est autem ad lucem resipiscere, placarique infaniam. Ne diu a cibis abstineant: cibi verò humidiores sunt, paucioresque, & continui: nam cibi animum demulcent. Occasio autem exhibendi cibi esto in vtriusque remissionibus, febris videlicet, atque delirij. Quòd si ab inedia furant, & non desinat febris; cibos dare non valde febrim lædentes vtile est. Nempe bonum est febrim deliriumque in accessionibus remissionibusque concordare, quò exhibendi cibi oportunum tempus inueniatur. In primis itaque considerandum est, sanguis nec ne mittendus sit. Si mentis quidem alienatio vnà cum febre à principio inuaserit; vena in cubiti curuatura primo aut secundo die, media potissimum secanda est. Quòd si non nisi tertio, aut quarto die delirium accedat; vsque ad primum decretoriorum dierum circuitum venæ sectio differenda est. At si vltra conueniens tempus, vt puta sexto aut septimo die superueniat, venæ sectio dimittenda est: multo enim ante iudicationes in acutis morbis euacuandum est, aut purgandum, aut alijs irritationibus vtendum. Venæ quoque incisor ne multum sanguinis detrahat, licet à principio fecet: phrenitis nanque malum est in syncopam facile mutabile. Sin autem agrotus valde repletus sit, & iuuenis, plurimo cibo, & largissimo vini potu saginatus; hæc ad phrenitidem rationes non pertinent: verum istis & citra delirium multum sanguinis hauriendum est: longè autem minus auferendum, si ijdem phrenitici sint. Verum tamen audacius vena soluenda est, si a præcordijs non à capite morbus oriatur: ibi enim vi



**A**ta principium est: caput verò sensus, neruorumque originis locus est, sanguinemque potius à corde trahit, quàm alijs distribuat. Igitur si membrum hoc affectum sit, venam cubiti scindere non conuenit: quippe in illis vitijs inanire vasa oportet, à quibus non modica noxa prouenit. Quòd si vires patiantur vt quantum sanguinis satis est, euacuetur; semel auferendum est: ne, dum repetendo tempus conteritur, exhibendi cibi occasio elabatur: quandoquidem phreniticis continuè febres sunt, neque remissiones longas habent, sed breues & latentes subleuationes. Ceterum si ante mediocritatem defecerit aeger; ad secundam remissionem differendum est, nisi longo tempore post ventura sit. Quòd

**B** si non sit, vires instaurando odoramentis, faciei tractatione, & pedum compressione protinus sanguis detrahendus est: quantum verò mittendum sit, facultas ostendet. Esca humida omnibus quidem febricitantibus idonea est, sed phreniticis maxime: aridiores enim sunt, quàm si sola adesset febris. neque mulsa danda, nisi biliosi sint: nam facile à biliosis naturis concoquitur. Far lotum cum aqua, aut mulsa conuenit. Bonum quoque est ex his sorbitiones simplices præbere, quales satureia, aut apio, aut anetho incoctis fieri solent. hæc nanque bonam spirationem conciliant, & vrinam cient: conducit autem phreniticis lotij excretio. Omnia olera profunt: sed malux potissimū lentor bonus est & ad lingue arteriæque læuorem, & ad stercorum descensum. optima est beta, blitum, coronopus, cucurbita, & quicquid suis temporibus optimum fuerit. Ordei verò mundati cremor liquidissimus quidem in primis nutritibilior est: sed tanto etiam spissior crassiorque sit, quanto plus temporis morbus progressus fuerit. Verum in iudicationibus & paulo ante iudicationes cibus subtrahendus est. Si morbus longiori tempore producat, cibos ne subtrahito, sed triticea exhibeto, quò sufficiat agrotus: quādo extremorum & volatiliū carnibus in cremore liquefactis plerunque opus est. oportet enim hæc in elixando valde dissolui. Ex piscibus saxatiles alijs præstantiores sunt: atque omnino regionis illius optimos deligito. quippe aliam regionē alias piscium species procreare creditum est. Vinosæ naturæ fructus subtrahito: quoniam caput & mentem percutiunt. Verum si necessitas urgeat, viribus aut ore ventriculi labantibus; mala in mulsa elixa, aut in adipe tosta exhibeto. aliorum singula calida aqua dissoluit, si roborandi duntaxat oris ventriculi causa exhibeas: sin autem vires quoque instaurare opus sit, non vsque adeo vinosa facultas dissoluenda est. Cibi quidem (vt semel dicam) huiusmodi sunt. Irrigandum verò caput est refrigerandi causa olivæ acerbæ contritæ vnguine: nam caput in phreniticis calefieri nō amat. Quòd si vigilæ & cogitationes agrotum agitent; rosacei parem modum in

L ij



principio misceto: adhuc verò plus rosacei addendum, quò magis ex-  
 tra intraque caput roboretur ac refrigeretur. At si mens labefactetur,  
 et locutio euariet; serpylli comam oleis incoquito: aut hederæ succum,  
 aut sanguinalis affundito. Si mentis verò alienatio vehementius homi-  
 nem turbet; peucedanum, & spondylium oleis inferuefacito, & aceti  
 parum instillato: hæc enim halitus & caliditatem diffiant, crassasq; hu-  
 miditates, quæ & ipsæ deliramenti causæ sunt, discutiunt. Cauere au-  
 tem conuenit, ne in ceruicem ac tendones madefactio descendat, Ten-  
 donibus enim atque neruis inimica est. Nempe irrigandi semper occa-  
 sio est, præterquam exacerbationis initio: rarius quidem in incremen-  
 to, omnium verò frequentissime vigente morbo, cum maxime insa-  
 niunt, tum maxime irrigandum est humore frigido: atque æstiuo tem-  
 pore multo magis refrigerato, hyeme verò tepido. Vt mitescat autem  
 delirium; posca, aut conyzæ decocto cum spongia facies fouenda est.  
 Deinde cœnanthino, aut crocino vngvine linenda: quin etiam nares, &  
 aures ipsæ imbuendæ: Hæc enim somnum alliciunt. Si quando isti  
 pernoctant, neque interdiu sopiuntur, sed penitus intenti sunt oculi  
 atque instar cornu rigentes, iactantur autem, & è lecto proflunt; his  
 somnus & quies conciliandi sunt: primum quidem caput rosaceo me-  
 ro irrigando, aut amaracino cum succo hederæ, aut serpylli, aut etiam  
 fertulæ decocto. Magis autem soporiferum est papauer in oleo elixum  
 capitis sincipiti super datum, aut in aqua faciei per spongiam imposi-  
 tum. ipsæ quoque integræ herbæ (si proximè lectæ fuerint,) virides cer-  
 uicalibus subiiciendæ sunt. crassant enim, madefaciuntq; spiritum ari-  
 dum tenuemque: & caliginem quandam sensibus obducunt; graue au-  
 tem & torpens est caligo: id verò est somni principium. At si valentiori-  
 bus auxilijs egebunt; & ipsa papaueris lachryma ex aqua frons inun-  
 genda. quin etiâ nares ea linendæ, et in aures infundenda est. Contrecta-  
 tio pedum suavis ex oleo: capitisq; attactus efficax est, sed potissimum  
 si tempora, auresque scalpantur. nam & ferarum iram furoremq; au-  
 rium & temporum mollis attrectatio coercet. Cuique verò vñtata  
 somnum accersunt: Nautis in cymba decubitus, & maritima nauiga-  
 tio, & littorum sonus, & vñdarum murmur, ventorumque bombus,  
 & maris navisque redolentia: Musico tiliarum exercitatio quietem  
 affert, aut lyra cantus, aut citharæ, aut meditatio puerorum canen-  
 tium: Ludi autem magistro puerilium fabellarum enarratio. Atque ita  
 alijs alia animum demulcentia somnum insinuant. Cæterum præcor-  
 dijs ac ventri madefactiones & cataplasmata adhibeto, si phlegmone  
 subfit, atque durties, flatusq;, distendat: oleū quoq; ex oliua bene ma-  
 tura nequaquam acerba inijcito: id enim crassum est, & viscidum, &



- A** calefaciens. Hæc utiq; in inflammatione facienda sunt. Inijciatur verò in ipsa anethum, aut conyza: bonum quoque est si simul omnia. Quòd si adsit etiam inflatio, cumini & apij semina adjicito, & quæcunq; lotium flatusque prolestant: nec non & nitrum cribratum inspergito. Verum si in iecore vitium dolorque fuerit; lanas ab oue sordidas accipito, oleum verò acerbum, aut rosaceum, & sapam græcam, aut creticam admisceto: sertulamque incoquito, atque omnibus in vnum succum permixtis iecur irrigato. Ad lienem verò oleum cum aceto bene facit: aut si magis, quàm prius turbet, posca, & pro lanis sponsia mollis adhibeatur. nam mirum in modum his gaudet mitescitque lienis. Por
- B** rò si præcordia interius sint, sursumque trahantur, & circumtenta cutis fit; optimum hoc remedium erit loco vnguinis, aut vnà cum ipso crasso tantundem. opportunum est. cunila verò & ros marinus incoquantur: anethum quoque non iniucundum erit. Quòd si cataplasmatibus tempus erit idoneum, oleis quidem iisdem in iisdem affectibus vtendum est. Materia sit autem lini semen, fœnum græcum, ordeï tenuis farina. Bonum est autem & faba, & eruum, si venter intumescat: pariter & millium torrefactum in sacculo positum leue molleque fomentum est: pinsitum verò & aqua intercutem laborantibus cum melle & oleo & lini semine cataplasma bonum est. Flores autem & herbe & semina
- C** quæcunq; à me in irrigationibus posita sunt, & in cataplasmatibus eadem sunt. Mel verò & cum ipsis bonum est, vt arida cogantur, miscanturq; squallentia, atque vt calor diutius permaneat: ipsum quoq; solum bonum est pro cataplasmate semicoctum, & ad irrigandum, si cum aliquo humore liquetur: mollit enim, calefacit, flatus lotiumque euocat, & ardores obtundit. Nam hæc quoque mulsa epota præstat: hisque plura & meliora, si interius arteriam, pulmones, pectus, & ventrem subeat. Astidue verò aluus irritanda est glandulis, aut illitionibus (sæpius enim siccescit,) vt à capite materiæ detrahantur, & à pectore halitus dissentur, & alui purgamenta excernantur. Quòd si multis die
- D** bus venter suppressus fuit, ipsum mulsa, oleo, et nitro subluere opus est. Verum si non satis phlegmones exhalationes desierunt, cucurbitulam affigens incidito, qua parte phlegmone extumuit, & maior apparet: vnâ autem, aut duas affigito, prout phlegmonem significauerit, & vires præceperint: & sanguinis detrahendi copiam ab his cōiectare oportet. Excessus enim syncopæ autor est. Primo quidem, aut altero die madafactio eadem esto, Tercio verò ceratum cum aliquo ex oleis ad irrigandum aptis imposito. Deinde epithemata in inflammatione si facultas sit, ex hyssopo, fœnogræco ex mulsa decocto, terebinthi arboris refina, & cera: olea verò in iisdem eadē. Quòd si nihil istis delirium



remittat; tondere caput necesse est: si longissimi crines sint, primum di  
 midij: si breuiore, ad cutim. Postea prius resectis viribus cucurbitula  
 vertici capitis affigenda est, sanguisque hauriendus: verum prius inanis  
 cucurbitula inter scapulo adhibeatur. Caterum quoniam thoracem in  
 omnibus acutis morbis medicari oportet: nam prorsus ipse cum corde  
 & pulmone laborat primum quidem ob spiritus modo calidi, modo  
 frigidi necessitatem, præterea ab ardenti febre, & tussi, & humorum  
 prauitate, & neruorum cõmunionem, & oris ventriculi noxa, necnon  
 succingentis membranæ, & septi transuersi vitio: (cor enim si maiori  
 aliquo malo oppressum sit, nunquam sanescit:) in Phreniticis utique  
 & hæc in primis mitiganda sunt. siquidem nonnullis mentis alienatio **F**  
 ab aliquo eorum, quæ in pectore sunt, vitio exoritur. ea verò sunt, spiri  
 tus calidus & ficcus, sitis acris, ignis intolerabilis qui vndique in thora  
 cem confluit, & prauitas quidem à domestico calore cõmutato & ma  
 ior & molestior prouenit. Ab alijs etiam membris in thoracem con  
 tributio fit: Extrema nanque frigida sunt, caput, pedes, ac manus: super  
 hæc autem thorax est. igitur humectandi refrigerandique auxilio eget.  
 Humectatio quidem fit ex oleo, in quo chamæmalum, aut nardus in  
 cocta sit. Aestate verò & sapa græca benè faciet. At si epithematibus uti  
 deceat, palmulæ vino austero maceratæ, deinde contusæ in placentam  
 cum nardo, polenta, atque cenanthe suaue pectori cataplasma fuerint. **G**  
 Refrigerant quoque mala pinsita cum mastiche & fertula: quæ omnia  
 cera & nardo excipiantur. Sin autem & os ventriculi torpeat, & à cibis  
 abhorreat, succum absinthij, aut comam vnà cum his terito, ipso etiam  
 in oleo incocto præcordia irrigato: & aquam, in qua maduit, aut ipsius  
 succum ante cibum propinato duos scilicet aquæ illius cyathos, aut suc  
 ci ad amaræ fabæ magnitudinem ex aquæ cyathis duobus. At si os ven  
 triculi ardor malè habet, non ratione morbi, sed ipsum duntaxat ab  
 acris & salis humilitatibus, siue à bile mordetur, atque siti perire  
 scit; lac aquæ admixtum in cibis exhibendum hemina videlicet dimi  
 dium vno aquæ cyatho temperatum: atque ita huiusce lactis plurimum **H**  
 sorbeat: non nihil etiam cum pane assumat. Verum tamen si ardor ho  
 minem torqueat, & sitis, & anxietas, & furens insania, & frigida cupi  
 ditas; propinanda quidem frigida est, sed non tanta, quanta in ardore  
 morbo absque phrenitide propinatur. In istis enim timendum neruis  
 est itaque danda est, ut ori ventriculi subueniatur. pauca verò satis est,  
 parum enim potant phrenitici. Ceterum si in Syncopam prolabantur,  
 nam & hoc incidere solet, viribus euanescentibus, in sudorem lique  
 scente homine, omnibus humoribus extrorsum impetum facietibus,  
 tenore ac spiritu fatiscientibus; tunc cura delirij post habetur. sed cum



- A** metus sit, ne in vaporem, humiditatemque homo dissoluatur; vnicum subsidium vinum est. celeriter enim substantiam alendo instaurat: & quoquo versus ad extremitates vsque permeat: tenori tenorem apponit: & spiritum torpentem expergeficit: frigiditatem calore temperat: laxantem madorem astringit: extrorsum erumpentia atque diffluentia coercet: olfactu suaue delectat: vires demum fulcire ad vitam prorogandam potest: atque in insania ad animum demulcendum optimum est. Hæc omnia epotum vinum simul præstat. iracundia nanque mollescente animo conquiescit: atque ipsimet ad recreandas vires cibos accipiunt quin etiam se ipsos ad voluptatem replent. Nempe si iam plus
- B** temporis morbus extrahitur, & febris ignaua est, & delirium in fatuitatem vertitur, & præcordia non vsque adeo læsa sunt, aut tumore, aut inflatione, aut duritia, sed in capite potissima morbi causa est; audacter lauare oportet, atque sæpius caput perfundere, habitus nanque sanabitur: & caput dissolabitur: & omne corpus exhalabit. Atque ita siccitas obtunditur: & sensus caligo discutitur: & mens stabilis, atque inconcussa firmatur. Hæc vtique sunt tollendi morbi præcepta.

## Curatio Veterinosorum. Cap. II.

- V**eterinosi in luce & ad solis radios collocentur: morbus enim nihil aliud est, quàm tenebræ. & magis in loco calido habeantur: ipsius enim causa est insita frigiditas. cubile agitabile sit. stragulae vestes, parietum picturae, omnia sint varia, quæcūq; visum prorritare queunt. multus habeatur sermo: pedes premendo tractentur: vellantur pili: mentis scalpantur. Si altus sopor obtineat, vociferandum est. iracundè increpandus est æger: his, quæ timere consuevit, deterrendus: quæcūq; prius optabat expectabatque, annuncianda sunt: omnia ad soporem discutendum contrà, atque in phreniticis, molienda. Quod ad Veterinosorum euacuationem attinet; hæc nouisse oportet, si alteri morbo, vt pote phrenitidi succedat veterinus, venam ne soluito: neque alicunde multum sanguinem educito: sed ventrem subluito non solum stercoreis educendi causa, sed etiam vt aliquid à superioribus partibus reuellatur, & à capite deriuetur. igitur multum insit salis, & nitri. Optimum verò sit, si sublutioni castorium inspergas. imum enim intestinū veterinosis frigidum est, & ad excretionem emortuum. Si non per succersionem, sed suoapte ingenio veterinus incipiat, & æger plenus esse videatur; si sanguinis, vena in cubiti curuatura secunda est: si pituitæ aquosæ, aut aliorum succorum, purgare opus est, nico ex ordeï cremore, aut nigro veratro ex mulla inter initia, si mediocriter purgare velis. Sin autem copiosius, medicamenti, quod Hieram id est Sacram vocans: pon-



do drachmas duas ieiuno dato cum mulsæ cyathis tribus: atque tantis- **E**  
 per expectans, quoad purgatio confecta sit; tunc cibos, si opportunum  
 sit, exhibeto: sin minus, in posterum diem alimentum differto. Non-  
 nunquam sanè & vesperi hieræ drachma cum aquæ, aut mulsæ cyathis  
 duobus dissoluta in tempore datur. Nempe inedia malum est, malum  
 est & cibi multitudo. Igitur exiguo cibo vti singulis diebus oportet:  
 neque subito ac penitus ieiunandum est, os enim ventriculi per totum  
 diem refectione caloreque indiget. Quin etiam cibus esto attenuans,  
 & aluum leniens in iusculis magis quam leguminibus, gallina, cōchri-  
 de, herba verò mercuriali assidue vtitor; acetumque affundito, & suc-  
 cis injcito, si forte succo ptisanæ vtendum sit. Bonum autem spiritum **F**  
 reddit, vrinamque citat fœniculum, apium olera, aut horum semina.  
 Item porrum acrimonia sua proficit, & brassica cum oleo & garo. opti-  
 mē facit & cuminum dulce cum brassica ad flatūs digerendos & lo-  
 tium euocandum. Vesica enim atque venter in quolibet morbo irri-  
 tant atque infestant. Irrigationes capitis tales fiant, quales & in phreni-  
 tics. Vtrisque enim sensus pleni halituum sunt: quos refrigerando, ad-  
 stringendoque rosæ atque hederæ succo propulsare necesse est; aut di-  
 gerere per transpirationem extenuantibus, exempli causa sei pyllō, aut  
 aceto cum rosaceo. Si nerui doleant, & totum corpus, sed multo ma-  
 gis extrema frigescant; caput ceruicemque castorio cum anethino oleo **G**  
 inungito, atque irrigato. quin etiam spinam eodem, sicyonio, aut gleu-  
 cino, aut veteri oleo admixto perfundito: necnon & manus ad hume-  
 ros vsq; & pedes vsque ad inguina perungendi sunt. Nonnullis quoque  
 vesica est humectanda: quæ tanquam neruus patitur, & tanquam vri-  
 næ iter laborat: insuper humorum acredine vexatur: biliosum enim lo-  
 tium est. Sin autem maior tremor adsit, & conuulsionem minetur; ne-  
 cessario & sicyonium oleum capiti superfundendum: sed brevis eius  
 vsus esto. Quod si præcordia inflammata sint, cutis verò tumida, infla-  
 ta, distentaque, aut introrsum vergentibus præcordijs concava efficiat-  
 ur; madefactiones & cataplasmata eiusmodi sint, cuiusmodi in capite **H**  
 de phreniticks comprehendimus. Cucurbitula minimè vtitor, si à phre-  
 nitide in hanc labem incidit: audacius verò cucurbitula vti poteris, si  
 ab initio morbus iste inuaserit. Sin autem atra lingua sit, & tumor in  
 præcordijs appareat; cucurbitulam affigere necesse est. postquam verò  
 interuallo temporis sensus purgati fuerint, & alia facilius feret; capitis  
 vertici applicare. quādoquidem ea parte euacuare sine vlla virium mo-  
 lestia possumus. Et flatūs supra infraque eliciendi sunt. Veterinus enim  
 flatūs colligit & in ventriculis, & in toto corpore ignauia, marcor, ani-  
 mæque defectus conspicitur. Motus autem ac vigilia discutiendi facul-  
 tatem



**A**ratem habent. Rutam igitur viridem cum melle & nitro contritam illinito: sic enim magis flatus digerit: cum his verò & terebinthinæ resinæ pars vna misceatur. Fetus quoque flatus prouocat aut cum sordidis valentibusque lanis, aut cum asperis panniculis veteribus atque attritis: aut cum spongia ex aqua, vbi hyslopum, aut origanum, aut pulegium aut rype incocta sit. Euocant autem flatus & quæcunque ante cibos propinantur: quæ utique pituitam bilemque ab intestinis & stomacho educunt. Hyslopum in mulsa elixum, dictamnium creticum, origanum acria quidem sunt, sed educatoria. Adiantum, gramenque flatus & lotia erumpere faciunt. Si manus & caput cōtremiscant, castoreum **B** dimidiæ drachmæ pondere ex mulsæ cyathis tribus ad plures dies bibendum est: si bibi verò nō possit, ad demoliendam calamitatem cum olei cyathis tribus, in quo ruta incocta sit, duplum in unum intestinum infundatur: idque per plures dies faciendum. Ultra verò vtilitatem, quæ ex hoc prouenit (nam supra infraque flatus expellit, & nonnullis vrinam, stercusque detrudit): si forte in omne corpus dilabens penetrat, firmi atque robusti nerui efficiuntur, & habitus ad calidum siccumque permutat: morborumque constitutiones conuertit. Optime etiam proficit si in nares inspiretur; nam & ea ex parte spiritus sternutamentis educit. Et quemadmodum per vesicam vrinam expellit, ita **C** & per nares mucum. Hos autem effectus hoc loco suavi caliditate præstat, & melius quàm alia sternutatoria, scilicet quàm piper, veratrum, radícula, euphorbium. Nam hæc ad primum atque vltimum attactum immitia sunt, & caput sensumque perturbant. Castoreum verò paulatim adhibitum calefacit, cum & alioqui capiti conducit: quandoquidem nerui vndique ex capite oriantur: morbis autem nerviorum castoreum medetur. Cæterum ipsum cum aliquo aut aliquibus ex supra cōprehensis admiscere non ingratum fuerit: nam si admixtum sit, non protinus quidem caput mediocriter conturbauerit, diutius verò caliditatem accenderit. Nares prorritatione humidæ reddantur. odoramenta applicentur acria quidem ad sensum, sed facultate calida: quale ipsum castoreum est, aut thymbræ, aut pulegium, aut thymum, viridia aut arida aceto perfusa. Acribus pharmacis pedes genūaque illinantur. Materia esto calefaciens, et ex adiectione mordens: nam vtroque veteris opus est ad calorem excitandum atque vigiliam. Primum igitur vrtica crura verberato. tenuissimæ namque vrticę partes adherentes non diu perseuerant: sed pruritus & dolorem non grauem inferunt; mediocriter verò stimulant, & tumefaciunt, & calorem excitant. Quod si hæc vehementiora fieri volueris, lemnestidis, atque euphorbij pares portiones cum vnguine gleucino illinito. Optimum quoque est scillæ

M



crudæ laminis perfricari sed à mēbris omne oleosum detergere oportet: quodlibet enim acre minimè mordax est admixtū cum vnguinē, nisi id medicamentosum sit, quale est cyprinum, aut gleucinum, aut sicyonium. Si præter hæc altus adhuc sopor occupet; proderit syluaticum cucumerem ex aceto tritum, & equæ sinapis portioni admixtum imponere. acre verò est id cataplasma, celeriterque ruborem concitat: celeriter quoque calefacere potest. verum ne pustulas vulneraque efficiendo periculum inferat, frequēter detrahendum est cataplasma, atque nunquid horum acciderit, inspiciendum. Hæc utique ad ipsius torporem, ac veluti demortui languorē discutiendum quolibet morbi tempore præter exacerbationum inuasiones molienda sunt. Quod si iam sensum recuperet, pondus tamen aliquod in capite insit, & sonus aut bombus obstrepat; etiam per os pituita elicienda est. Mastichen in primis mandendam exhibe, ut continenter expuat: postea rursum vuam taminiam, granum gnidium: sed omnium maxime sinapi, et quoniam vsitatum est, & quoniā inter alia magis pituitam educit: ac si quis sponte ipsum deuorauerit, quæ in ventriculo sunt, disijcere potest: potest etiam aluum madefacere, & flatus excernere. Etenim aliquando casu hæc mihi euenerunt: cum homo quidam me consentiente ipsum deuorasset. Bonus autem magister est experientia, opus est verò & ipsum periculum facere: imperitia nanque timoris & cautionis causa est. Caput quoque postquam ad cutim detonsum fuit, nisi magnopere proficiat, ut transpiret, radendum est: quin etiam ad vsum acrium medicaminum, ut eius, qui ex limnestide constat, aut hydār, aut thapsia, aut sinapi, humidum ex aqua cum dupla panis portione in linteolo veteri illitum capiti superdandum est: cumque horæ spatium ibi permissum fuerit, spongijs calidis fouere opportunum fuerit. Item ex vsu erit & lautio omnibus iam, aut saltem plurimis, & præcipuis ad morbi depulsionem adhibitis, adhuc tamen corpore torpente, ubi & gestatio proderit, & frictio, & quælibet lenis corporis agitatio.

## De curatione Tabis. Cap. III.

Stos sanè si & tabes male habet, ocyus succurrendum est, ad balneum deducendo, & corpus dimouendo. Tabis quoque lac medela est, & nutritio, & ventris calefactio, & vesicæ lenitio. Quin etiam eadem huic vitio, quæ & catochos, expediunt: similis enim atque eadem est horum morborum species. Castoreum utique istis opportunius est atque lenius & potui datum, & illitum, & in intestinum infusum. Mulieribus autē qualia his similia ab vtero vitia oriantur, in libro De muliebribus morbis à nobis disputabitur.



## A De curatione Apoplexię. Cap. III.

**A** Poplexia validus planè morbus est. nam in omnibus exanimis sunt, quorum & corpus & mens stupet. Si agrotus senex sit (quibus familiare id vitium est) nò liberatur, & morbi magnitudine & ætatis miseria oppressus. Quibus autem notis morbi magnitudo cõiectanda sit, antea à nobis positum est. Si iuuenis æger sit, debilis est apoplexia, non tamen facile remouetur. Tentanda igitur curatio est. Aequale sanè adiutorium vt pote magno affectui magnum remedium missio sanguinis est: nisi quis plusquàm conueniat, mittendo delinquat.

**B** modum autem coniectare difficile est: nam si paulò plus detraxeris, hominem planè strangulaſti. ad vitam enim tuendam his vel paucus sanguis efficacissimus est: cum sit vitæ corporisque alimenti fomes. si minus detraxeris, quàm causa postulat; nihil magni per magnum auxilium contuleris: adhuc enim causa permanet. Sed præstat minus detrahendo delinquere: nam si minus detractum esse visum sit, aliqui verò optimi successus apparuerint; iterum venam rescindere cõgruens fuerit: scindenda est autem vena in concauo cubiti. hæc enim in sinistro fluida est. Simul quoque in pusilla apoplexia & resolutæ partes considerandæ sunt, in sinistro ne, an in dextro latere resolutio sit: à salubribus enim partibus (vt dicere mos est) sanguinem haurire oportet. hac enim sanguis facilè delabitur: hac etiam à læsis partibus materia deriuatur. Igitur si absq; euidenti causa attoniti reddantur; sic de secunda vena ratiocinandum est. At si ab ictu, aut delapsu, aut compressione in hanc labem inciderint, in aliud tempus res differenda est: nonnullis verò ad medelam atque vitam id solum satis fuit. Caterùm si frigiditate multa, & torpore, & sensuum abolitione hominem occupante vena minime scindenda videatur; subluenda alius est: quò multitudo ab intestinis extrahatur (plerunque enim ex voracitate & crapula in morbum talem prolabuntur.) vtque humores caput occupantes reuellantur. Sublutio planè acris esto, pituitam, bilemque subducens. Igitur nitrum solum ne habeto, sed etiam euphorbium trium obolorum pondere, (qui eluēdæ alio modus vsitatus est) & cucurbitæ agrestis interanea, aut centaurij comæ decoctum ex oleo, aut aqua. Optima quoque sublutio fuerit, mellis consuetæ portioni ruta adiuncta, & cum vnguine elixa, & terebinthi arboris resina. & sal pro nitro, & hyssopi decoctum. Quòd si per hæc subsidia paulum excitatus homo fuerit, aut febre correptus, aut sensum ab illo marcere suscipiens, aut arteriæ bono pulsu restituto, aut facie vtunque meliora significante; spes salutis concipiēda est, audaciusque subueniendum. Interim igitur roboratis

M ij



viribus, purgatorij medicaminis, quod Sacrum vocāt, ieiunio maxime **E**  
 quidem integra potio danda est: si vires prohibeant, dimidium cum  
 mulsa. & æger in lectica supinus collocatus agitandus est, sensim eum,  
 qui ferunt, gestantibus; frequenter verò, quò lassitudo arceatur, inter-  
 quiescat: ac si alius liquida sit, libens admittito: sin secus, aque, aut mul-  
 sæ cyathos duos potui dato. Sin autem & dum purgatur, nauseabun-  
 dus sit; id ne prohibeto. nam & illa distentio ad expergefaciendum vi-  
 gorem quendam præstat, & pituitæ vomitus morbi causam euellit:  
 sensum verò, & caput, & nervos repurgat sacrum quod vocatur medi-  
 camen. De qualibet itaque ab initio administranda purgatione satis  
 differuimus. Totum verò hominem lanis inuolutum oleo sicyonio per-  
 fundere oportet, aut gleucino veteri, aut singulis seorsum, aut simul **F**  
 mixtis. Sed optimum fuerit ad conspissanda olea ceræ parum colliqua-  
 re: atque ista nitri ac piperis mixtione valentior reddenda est: sint verò  
 tenuiter contrita & cribrata. At miram habet vim ad resolutos casto-  
 reum, & illitum cum aliquo ex antedictis oleis: sed longe potētius est,  
 si cum mulsa potui detur, portio verò tanta sit, quantam in veteriosis  
 nouimus. Cōiectare autem oportet & etatem ægrotantis, & mentem,  
 an pluribus diebus bibere sit paratus. Nempe inunctiones irrigationi-  
 bus præstant, facilius feruntur, & magis proficiunt: neque enim dila-  
 bentes lectum & stragula inquinant, ægrotis verò id inutile est: illæ au- **G**  
 tem inhærentes corpori in colliquatas partes a calore sorbentur. quin  
 etiam & ipsarum perpetuitas conducibilis est; nam irrigatio diffluit.  
 Inunctionum autem materia est, quæcunq; à me supra dicta sunt: cum  
 ipsis verò castoreum. Accipitur itaq; resina terebinthi arboris, euphor-  
 bium, limnestis (hoc est adarce) pyrethrum æquis portionibus: piperis,  
 galbani dimidium, nitri ægyptij triplum, ceræ quantum ad liquida cō-  
 spissanda satis sit. Ceterum medicamina multo magis, quàm hæc, varia,  
 & multo plura seorsum loco suo tradita sunt. Epiplasmata quoque du-  
 ris distentisque partibus superdanda. Horum sylua est lini semen, fœ-  
 num græcum, farina ordeï, mel: oleum, vbi ruta, aut anethum incocta **H**  
 sint: althææ radix pinsita, & in mulsa vsque ad ceræ mollitudinem de-  
 cocta. Sunt verò & tractabilia, & temperatura suauius. Siquidē adhuc  
 febre vacant, aut leuiter febricitant, posthabita caloris cura hæc facien-  
 da sunt: At si febres acutæ sunt, & reliquus morbus his leuior esse vide-  
 tur, febres verò in discrimen adducunt, ad has & victus rationem, & re-  
 liquam curationem conuertere oportet. Alimentis itaque summe te-  
 nuibus, & facilis coctionis vescendum est, atq; opportunitas nunc ma-  
 gis obseruanda. Et per totam curationem in exacerbationibus subtra-  
 here, atq; penitus in febres animum intendere oportet. Cū morbus



- A** autem diu trahitur, & caput in causa est; cucurbitula occipitio affigenda, & sanguis largiter hauriendus: plus enim, quàm venæ sectio, proficit, & vires nequaquam labefactat. Sed prius inter scapulas inanem cucurbitulam admoueat: vt in contrarium eius, quæ in occipitio est, succos reuellat. Nempe interdum & gula resoluta est; in qua sola attonitis salutis præsidium collocatur, deuorandis scilicet alimentis, & medicaminibus transmittendis. neque enim inedia famisque tantummodo periculum instat, verum etiam tussis, difficilis spirationis, atque strangulatus. Nam si quis intra os liquidum cibum infundat; in arteriâ subterlabitur, cum neque tonsillæ ad impulsu ciborum concidant, neque epiglottis in proprium locum subsidat, quæ arteriæ operculum à natura facta est. Quapropter opus est mulsam, aut succum longa mystillâ infundentem, supraque arteriam attollentem in gulam demittere: id quoque enim ad deglutiendum inseruit. Verum enimuero si ægrotus iam morti proximus sit, ipsius adeo ceruix spiritusque congelascunt. ideo ceruicem & mentum calefactorijs illinito & foueto. Frustra verò laborant, atque imperiti illi sunt, quicumque sub mento cucurbitulam, vt gula dilatetur, affigunt: quandoquidem non dilatatione ad impositionem ciborum, sed ad deglutiendum compressione opus est, dilatat autem cucurbitula: & cum deuorare velis, prohibet reuellēs ac retrahens;
- C** cum remittendum potius sit, quò in deuorando cōstrictio fieri possit. Insuper arteriam repleri, vt strangulatio fiat periculum est, neque etiam si hac, & illa in parte gutturis affixeris; quicquā prodest. musculi namque & nerui & tendones & venæ ante ipsum positi sunt. Vesica vtique, & laxum intestinum inter se proxima interdum ad excernendum debilitantur, resoluuntur, recrementorumque semper plena reperiuntur: vesica verò & in maximam molem extumescit. Interdum autem ita resoluuntur, vt purgamenta cōtinere nequeant: per ipsa enim tanquam inanima superuacua delabuntur. Tunc igitur instrumentum, quod Cathetera vocant, in vesicam demittere haud sanè tutum est. ne corrumpatur enim vesica, atque homo conuellatur, discrimen impendet: sed præstiterit cremore haud multo aluum subluere: cumque stercus ab intestino eiectum fuerit, iterum iniiciendum est cum oleo castorei. Spes autem vnica omnium pariter resolutorum, separatimque singularum partium eo vitio laborantium in oleum infusio fuerit. quomodo verò ipsa administretur, in sermone De diuturnis morbis exponetur.

De Comitialis accessiōis curatione. Cap. V.

**C**omitalis morbi primus casus perniciosus est, si acutè morbus inuadit; nonnunquam enim & vno die hominem perdit. Peri-



culosa etiam sunt per circuitus exacerbationes. vnde factum est, vt in **E** acutorum numerum comitialis morbus poneretur. Quod si malo as-  
fuescat homo, & morbus tenaciter adhærens occupet, non solum diu-  
turnus, verum etiam nonnullis perpetuus efficitur. nam si ætatis florem  
vigoremque excedit, consenescit cum ægro, commoriturque. Quot-  
quot igitur medicamina vt diuturno morbo conueniunt, in sermone  
De diuturnis compræhenduntur: quotquot autem ad mortis celerita-  
tem euitandam faciēda sunt, horum plura in sermone De attonitis tra-  
didimus, venæ sectiones, alui sublutiones, inunctiones, cucurbitulas.  
hec enim vt homo expurgescatur, valentissimè efficiunt. Quotquot au-  
tem prolapsui peculiariora adiutoria inueniuntur, ea in præsentia doce- **F**  
bimus: Pueris itaque, quibus ex corruptione, aut ex vehementi refrige-  
ratione inusitata hæc labes incescit; vomitus aut cibi, aut pituitæ, aut  
aliorum quorundam succorum prodesse consuevit. pennæ autem iri-  
no vnguento delibutæ nauseam excitant. veruntamen & irino non  
vsque ad conuulsiones tonsillæ sunt illinendæ. Comprimere quoque  
leniter ilia opus est, puerum in ventrem suspensum conuertendo: hæc  
enim figura ad vomitum habilissima est. At si vellatur, aut distorquea-  
tur inferior maxilla, aut manus & crura iactentur, aut vnà cum toto  
corpore oculi distendantur; manibus perunctis tractando demulcere  
conuenit: obtorti oculi dirigendi sunt: rectæ partes ne torqueantur, sua- **G**  
uiter continendæ: frigida membra lanis antiquis sordidis, attritisque  
panniculis fouenda; sedem præterea melle cum rutaceo oleo inungi-  
to, aut cum nitro, aut resina liquida cum his mixta: hæc quoque leniter  
intra anum intrudito flatu enim proliciunt. flatuum autem excretio  
huiusce morbi in pueris medela est. Porro si deglutire valeant, pharma-  
cum istud exhibendum est, cardamomi pars, æris combusti. & hæc ex  
mulla propinato, aut enim euomunt vnà cum humoribus ventri-  
culum infestantibus, aut alui subducitur. Optimum quoque est hu-  
iusmodi linctuarium, cardamomi, sinapis, hyssopi comæ par mo-  
dus, iridis radices pars cum nitri duplo, piperis tertia pars: omnia cum **H**  
melle permisceto, & maxillam diducens in os infundito: interius  
etiam, quàm vbi sunt tonsillæ, quò deglutire valeant, inijcito. Hæc  
adeo pueris expediunt. Iuuenibus autem & hæc quidem profunt,  
verum etiam potentiora his medicamina ad vomitum deligenda  
sunt, vt narcissi bulbi, sinapis, & hyssopi pares partes, æris & piperis  
dimidio minus, quàm priora, cum melle miscens exhibe.  
Hæc profectò ad leuandam exacerbationem abundè fuerint: quæ ve-  
rò ad propulsandum morbum facient, in sermone De diuturnis mor-  
bis persequemur.



## A De curatione Rigoris, quem Tetanū vocant, Cap. VI.

**I**N praesentia lectum mollem, tractabile, leuem, suauem, calidumq; esse necesse est: nervos enim inflexiles, duros, rigentesque morbus efficit: quin etiam cutis tota squallens asperaque corpori obtenta est: palpebrae natura versatiles vix oculos conuiuendo protegunt: oculi intenti sunt, in profundo conuoluti: necnon & artus sunt deligati, ob distentionem immobiles. Aegroti domicilium calidum esto, si aestas sit, citra sudorem, aut resolutionem: ad syncopam enim morbus inclinat. Neq; verò ad alia magna remedia cunctatè accedendum: haud enim

- B** differendi datur occasio. Quapropter siue ob refrigerationem absque manifesta causa rigor inuaserit, siue ex vulnere, siue ex abortu mulieris inceserit, venam in cubito rescindito: curans in deligando brachio laxiorem compressionem fieri, sectionemque leniter & facile expediri: siquidem ista neruorum cōuulsiones cient. Semel etiam cruor citra defectum animae frigusq; extremorum mediocriter effundatur. Neq; inedia aeger maceretur: res enim frigida siccaque fames est. Propinetur itaque mulsa spissa meracior, & ptisanæ cremor cum melle. Ista nanq; & tonsillis comprimendo minimum dolorem inferunt, & gulæ deglutiendo lenia sunt & facilia, & ad molliendam aluum mollissima, & ad vires instaurandas valentissima. Omne corpus lanis inuoluito oleo gleucino, aut crocino madentibus, in quibus aut rosmarinus, aut cōnyza, aut artemisia incocta sit: atq; omnia & facultate & ad tactum calida sunt. Oblinere autem corpus vnguine conuenit, quod ex limnestide, (quam adarcem esse putamus,) quod in stagnis nascitur, & euphorbio, & nitro, & pyrethro conflatum est: his verò & multum castorei adijciatur. Bene quoque fuerit tendones lanis contegere, & secundum aurem & mentum loca perungere. nam partes hæ maxime patiuntur ac distenduntur. Præterea leuibus calefactorijs fouendi sunt tendones & vesica per sacculos millium torrefactum includentes, aut
- D** bubulas vesicas olei calidi semiplenas: quò locis, quæ fouentur, secundum latitudinem applicari valeant. Interdum coegit necessitas, vt capiti fomenta adhiberentur: quod neque sensibus vsq; adeo tutum est, neq; nervis salutare. sensibus enim quandam caliginem effundit multis halitibus ipsos petentibus: nervos autem replet. Quo circa modo fouendi quamtutissimo vtendus est, atque materia haud ita multum fœdè olens deligenda. vtique materia esto oleum in vesicis in duplici vase citra nidorem seruesactum: aut sales tenues in sacculo. millium enim ac lini semen tactu quidē lenia sunt, sed halitiosa & graueolentia. Ratio verò fouendi huiusmodi esto. tendonibus resupinato ægro



fomenta vsque ad verticem subijcienda sunt: vterius verò ad synciput **E**  
 ne procedito. Iste nanque locus omnibus sensibus communis est: ab ip  
 soque, tanquam ex fonte omnia adiuumenta, omnes noxæ scaturiunt.  
 Quòd si epiplasmata tendonibus superdanda sunt; erectum occipi  
 cium esto: nam si magis sursum versus imposueris, caput exhalationi  
 bus complebis. Materia sit autem epiplasmatum lini & scenigræci se  
 mina. Post epiplasmata verò utilis fuerit cucurbitula occipitio ab vtro  
 que spinæ latere adhibita. Sed parce admodum flamma accendatur:  
 nam quæ ab labris cucurbitulæ fit circumpressio, doloris conuulsio  
 nisque autor esse solet. Igitur diutius trahere præstat, ac molliter ma  
 gis, quàm plurimum breui tempore. sic enim tibi in conuexum locus **F**  
 sine dolore attolletur, qui cõcidendus est. Scopus autem modi sangui  
 nis extrahendi tibi vires ægrotantis proponantur. Hæc vtique rigori  
 bus, qui sine vlceribus fiunt, remedia conueniunt. At si ex vulnere cõ  
 uulsio facta sit; perniciosum profectò id est, ægreque de salute sperari  
 potest: nihilominus tamen opem ferre decet: quandoquidem nonnul  
 li et adhibitis remedijs mortem euitarunt. Oportet sanè vltra ceteram  
 medelam & vlceribus consulere cum calefacientibus, quæcunq; a me  
 iam dicta sunt, irrigando, & totibus & cataplasmatibus & medicamen  
 tis, quæcunque & facillè calorem excitent, & humectando pus abun  
 dè moueant. Vlcerum enim in rigore sicca & squallida sunt. Accipito er  
 go thuris mannam, polij comam, terebinthi piniq; arborum resinam, **G**  
 althææ radicem, & rutam conyzamque herbam: hæc in cataplasmatibus  
 commiscere opus est, alia liquando, alia, quæ puluerea sunt, inspergen  
 do, alia in oleo prius macerando. althæam verò in mulsâ ante contu  
 sam decoquito. Inspergendum est etiam vlceri castoreum: neque exi  
 guus inde in totum corpus calor emanabit. Horrores enim ab vlceri  
 bus prodeuntes malefici sunt. Perungendæ quoque sunt nares casto  
 reo cum crocino vnguento permixto: quin etiam castoreū trium obo  
 lorum pondere assidue bibere expediet. verum si ab hac potione gula  
 laboret; interijcienda est laserpitij radicis exhibitio ponderis tanti, **H**  
 quanti & castoreum dandum esse diximus: aut myrrhæ dimidio mi  
 nus, quàm laserpitium. sed omnia cum mulsâ potanda præbeantur.  
 Quòd si cyrenaici laserpitij lachrymæ copia tibi fiat; hæc opus est mel  
 le cõcto inuolutam ad erui magnitudinem deuoradam dare. ita enim  
 optimum factu est, quò palatum præteriens ægrotum lateat; acris est  
 enim, ructumque insuauis ac foedè olens excitat. si neque hac ratione  
 deuorari possit, in mulsâ eliquata propinetur. Omnibus enim potioni  
 bus, quæcunque calefacere, humectare, distentionem laxare, & nervos  
 remollire aptæ sunt; hæc haud dubiè valétior est. Cæterum si nihil egroti  
 deglutiant,



**A** deglutiant, in anum castoreum cum oleo dandum est: hoc etiam anus cum vngvine aut melle illinendus: hoc item vesica irriganda, & cum cera, vt crassius reddatur, perungenda. Sin autem flatum stercusq; educendi tempus adfit; purgatorij, quod Hieram, id est, Sacram vocant, drachmas duas cum mulsa, & oleo in sedem inijcito. Nam præterquã quod illa euocat; intestinum etiam & inferiorem ventrem calefacit ac solet, varium nanque & calidum medicamentum hiera est.

## De curatione Anginæ. Cap. VII.

**B** Væ anginæ species reperiuntur, Altera cum caliditate, & magna tonsillarum inflatione, & extrorsum versus tumefactione: quin etiam lingua, gurgulio, & omnes adiacentes particule in tumorem efferuntur: Altera istis locis collapsis, & submissis efficitur: sed interius compressio maiore strangulatu discruciat: vt interna inflammatio ad cor vsque pertinere videatur. Huic, quàm celerrime occurrendum est, nam & hæc celerrime ægroti rapiuntur. Igitur si crapula, & ebrietas in causa sunt, eodem die inferius humorem inijcito, isque duorum generum fit, alter vsitatus, quò stercora educantur: alter eiusmodi, vt aliquas à tonsillis pectoreque humiditates euellere possit. neque tamen in cæteris efficacior meraciorque esto: sed centaurij & hyssopi decocta infundenda sunt. hæc enim & pituitam educere solent. Si tenuis autem victus præcesserit, scindere cubiti venam expediet: & latior sectio, quò maiore cum impetu, copiosiorque sanguis emanet, facienda est. Huiusmodi nanq; profusio minime quidem ad caliditatem mitigandam satis est: sed strangulatum soluere, & reliqua omnia diminueri valet. Haud ignobile quoque adiuumentum præstat, si ad animæ vsque defectum ægrum perduxeris vsq; eò tamen, dum ne anima deficiat, quandoquidem nonnulli secta vena ab animi deliquio vita excelsere. Item vinculis supra talos & genua constringentes opitulabimur. Optima quoque sunt vincula supra brachialia versus cubitos, & supra cubitos versus humeros. At si deglutiendi via expeditissima fit; elaterium & cum mulsa, & cum sero lactis, quantum ad purgandum hominem satis sit, præbeatur. alijs enim purgatorijs elaterium in his ægrotis præstantius est. Cõferunt etiam cneorum seu thymelæa, & sinapi: siquidem hæc ambo ventrem repurgant. In quibus verò inflationes deuorationem impediunt; linguam ad palatum reflectens, ipsius venas rescindito. quòd si promptè multusq; sanguis defluat; inter alia remedia hoc magis proderit. Irrigationes utiq; locis inflammatis primum quidem adstringentes, quò retrorsum materiæ labantur, conueniunt. quam ob rem lanæ sordidæ cum œsypo vino madentes, aut oleo ex immaturis

N



olius expresso accipiantur. Quin etiam cataplasmata irrigationibus si  
 milia sunt, exempli causa palmulae vino madefactae tunicaeque cum ro  
 sarum folijs. quod sit autem viscidum & molle cataplasma; etiam orde  
 farina admisceatur: aut lini semen, & mel, & oleum: ut omnium mix  
 tura fiat. Quod si ad suppurationem veniat; calida admoventur sunt:  
 quibus & in altera anginae specie utendum est. adesto igitur foenigraci  
 farina, & manna, & resina, quae liquari possunt: & polij coma insperga  
 tur. necnon & fomentum calidum adhibeatur spongijs in decocto lau  
 ri baccarum hyssopique madentibus. Ad movendum pus autem effi  
 cacissimum est columbinus finus tenuiter per criseram, id est, lineum  
 sacculum instar pulveris transmissus, ac super inspersus. idem & can  
 nus eodem modo praestat. Ex mulsa vero cum lentis, aut hyssopi, aut ro  
 sarum, aut palmularum, aut simul omnium decocto collutiones fiant.  
 Illinendum praeterea totum os est usque ad intimas fauces simplicibus  
 quidem, ut mororum, aut malorum puniceorum aqua maceratorum  
 succo, aut palmularum decocto: compositis vero medicamentis, ut Dia  
 moro, quod vocant, aut eo, quod ex Besasa, id est, ruta sylvestri, & suc  
 co rhoi componitur: aut Diachelidonio, id est, ex hirundinibus confe  
 cto medicamento. Sin ulcera crustosa sint; collutiones & gargarismi  
 fiant ex hyssopi in mulsa, aut pinguium ficorum in aqua decocto: prae  
 ter haec amyllum percolatum in mulsa, aut in ptisanâ tragiuae cremore.  
 Si Angina cum coincidentia, quae erat altera species, occupet; ab inte  
 rioribus extrorsum omnia euocanda sunt, & humores, & caliditas, &  
 omnis caro, ut totum foras extumeat. Proinde calidae irrigationes fun  
 to cum ruta, & anetho, nitro insperfo: Et cum his superius memorata  
 cataplasmata. Proficit etiam ceratum ex nitro & sinapi ad calorem ex  
 citandum super dare: calor autem exterior huiusmodi vitium tollit, sed  
 in collo tumor extuberat. Tumor autem foras in sublimem elatus à pul  
 monis inflammatione liberat, intus vero abditus anginam patientibus  
 perniciosum malum est. At quicumque strangulationem ab angina ve  
 rentes, quod laxius spiritus duceretur, arteriam secuerunt; non sanè ex  
 perimento rem comprobasse videntur. Quippe caliditas inflammatio  
 nis maior ex vulnere efficitur, strangulatum adauget, tussimque com  
 mouet. Quin etiam, si alioqui periculum id euaserint; vulneris ora in  
 vnum coalescere nequeunt: ambae enim cartilagineae, atque inter se in  
 glutinabiles sunt.

## De Curatione columellae. Cap. VIII.

Vitiorum, quotquot columellam infestant, Aliqua per succisionem  
 curare necesse est: sed de eorum chirurgia disputare ad praesen



- A**tem locum non attinet: Aliqua, vtpote acuta, medicamentis sananda sunt. nam facile strangulant, & difficultate spiritus aliqua istorum hominem perimunt. Talis est vtique, quā Vuam, & quam Columnam dicimus: vtraque enim cum inflammatione, crassitie, longitudineque suboritur. ita, vt in arteriam pendulæ fiat. Aequabili sanè crassitudine à basi ad summum vsque palatum columna, inæquali verò vua constat. huius enim ad palatum basis gracilis est, in extremo teres et crassa, rubēs aut liuida. iccirco & Vuæ appellationem id vitium sortitum est. Quapropter his maturè opem ferre decet: celerrima nanque à strangulatu perniciēs impendet. Proinde si agroti iuuenes sunt, à vena cubiti
- B** sanguis detrahendus est: vtque largius euacuetur, maiore plaga vena aperiat. siquidem huiusmodi sanguinis detractio à strangulatu, tanquam à laqueo, agrotantem liberat. Subluenda quoque aliud est mitiori lotionē primum: deinde aliās, atque aliās acriore, vsq; eò, dum aliquid à superioribus partibus deriuetur. Circumdentur & vincula adstringentia extremis cruribus supra malleolos & genua: necnon & humeris supra brachialia atq; cubitos. Quòd si strangulatio inualescat, cucurbitula occipitio atque pectori adglutinetur. & istarum aliqua incidatur: omniaque administrentur, quæcunq; à me in capite De angina præcepta sunt: cum eadem in vtroque vitio sit mortis ratio. Iisdem præ
- C** terea intra os medicamentis & adstringentibus & mollientibus, & exteriori fotu, & cataplasmatibus, & oris inunctionibus vtendum est. Circum columnam verò, aut circum vuam adstrictorium rhoi succum, acaciam melle aut aqua dissolutam, hypocysthida, terram samiam, lemniamue, aut sinopicam rubricam, atque omphacium ponito. Si vlcerosa sit vua; gummi & amyllum rosarum aut palmularum decocto liquefacta: item ptisanæ aut tragi cremor adhibeantur. At in columnæ curatione aliquanto plus valentiorum medicaminum adijcito; quæ ex myrrha, costo, atq; cypero componantur. Nam id genus acria columna tolerat. Verum si nonnullis locus iste purulētus effectus est, atq; palati ossa computruerunt; hi longo temporis intervallo vitam finiunt. Sed horum auxilia nobis alio loco præcipientur.

### De Curatiōe pestilētiū in faucibus morborū. Cap. IX.

**H**Orum vitiorum curatio cum alijs tonsillarū affectibus qua communis est, qua propria. In inflammatione & strangulatu purgatio per clysteres, venæ sectio, irrigationes, cataplasmata, fotus, deligationes, cucurbitulæ, omnia demum eadem, atq; in his, conueniunt. Illi tiones autem acriorum medicamentorum faciendæ sunt: neque enim vlcera quiescunt, neq; crustæ in superficie fiunt. Verum si ab his sanies

N ij



ad interiora destillet: celeriter partes, etiam si integræ erant, vlcera-  
tur: celerrimeque vlcera interioris depascendo serpunt, atque hominem  
perimunt. Porro igne vitium adurere, cum in superiori parte sit; im-  
prudens esse propter Isthmum iudico. Sed medicamentis igni simili-  
bus, quò & depastio coerceatur, et cruste decidant; vtendum præcipio.  
Ea verò sunt alumen cum melle, galla, balauftium arida cum mulla.  
Hæc eadem calamo, aut penna, aut crasso & oblongo caule, quò medi-  
camina ad vlcera perueniant; inspiranda sunt. Optima sanè est & chal-  
citis vsta cum trita cadmia ex aceto. esto autem cadmia portione di-  
pla: & rhei radix cum aliquo humore. Præterea ne vlcusum compres-  
sio fiat, cauendum est: ab ea nanque & humescunt, & magis exedunt.  
Hac de causa opus est pinna medicamenta arida inspergere: liquida ve-  
rò liquentissima reddentem in gurgulionem infundere. At si cruste  
iam resolvuntur, & vlcera rubida fiunt; tunc conuulsionis maximè pe-  
riculum subest. reficantur enim plerunque vlcera, & cum his nervi di-  
stenduntur. Itaque lacte cum amylo, & succo ptisanæ, aut tragi, aut li-  
ni seminis, aut scenigræci remollire madefacereque conuenit. Quibus-  
dam & columella vsque ad palati os exesa est: quin etiam tonsillæ ad ba-  
sim vsque & epiglottida. ac propter cicatricem deuorare neque soli-  
dum quicquam, neque liquidum poterant. Sed & ipsum, quod bibe-  
bat, interdum percussus hominem fame necauit.

De curatione Pleuritidis, seu morbi lateralis. Cap. X. G.

**N** Vlla moræ atque dilationis in pleuriticis, quin protinus valen-  
ti remedio succurramus, datur occasio. Febris enim peracuta  
ad perniciem properat: dolor quoque succingentis membrana in peius  
vrget: necnon & tussis pectus caputque concutiens vires proterit. Quo-  
circa eodem potissimum die vena cadenda est. Sin autem ex ingurgi-  
tatione ciborum potusque ægritudo prouenerit; inedia diem vnum  
ægroto imperanda. post, sanguinem à vena mittito, quæ in cauo cubiti  
est, non eius, qui secundum rectum in cessum inflammatis costis oppo-  
nitur: præstat enim maximè procul abducere. Sanguinem verò ne vsque  
ad animæ deliquium fundito: nam si refrigeratum corpus animo desti-  
tuitur; pulmoniam inuadere periculum est. Humores enim exteriori  
caliditate attractioneque priuati, in penitiores partes relabuntur. Item  
pulmo rarus, calidus, ad trahendumque valentissimus est: costis etiam  
proximus, earumque doloris est particeps. Verum morbi pulmonis pleu-  
ritidi succedentes non vsque quaque salubres sunt: Pleuritis verò à pul-  
monis vomica exoriens benignior est. Quapropter cum mediocriter  
sanguis effluxerit; interiecto ad recreandum hominem temporis spa-



- A** tio, iterum detrudere opus est: si bene quidem habeat, eodem die, cum longa remissio sit: sin minus, postridie. Quod si neque febris remittat, (sæpe enim diem vnum febris occupat, & augetur,) tertio die in secunda remissione, in qua & cibi dandi sunt; sangninem mitte: totum hominem vberius perungens, costisque oleum molle infundens cum calido vngue ex rutæ anethiue decocto. Ipsum verò latus admodum leniter irrigandum est. sed nonnullis & dolor & inflammatio erupit, vt eorum locorum affectus esse videretur: cum tamen id interiorum vitiorum incrementum sit. At in præsentia de alimonia, quemadmodum & de vniuersa curatione, quò nihil in ea delinquatur; sermonem habeamus. in alimentis enim medicamenta ponentur: quin immo in alimentis medicamenta sunt. Itaque genere calidus humidusque cibus esto, lenis, æquabilis, migmatodes, id est, bene permixtus, dissolutorius: pituitam soluendi, extenuandique potestatem habens. Proinde cibarijs omnibus ptisana anteponatur; initio quidem, quò ipsius crassamentum solidumque reijciatur, in cremorem percoletur, soloq; cum melle condiaur. ab ipsa verò vsitata ad voluptatem varietatemque parandam medicamina remoueantur: in hac enim ægritudine solus cremor satis est. Quippe humectare, calefacere, pituitam soluere & de tergere, per superiora sine molestia, quæcunque euocanda sunt, euocare, facile quoque ventrem ducere sola ptisana potest. Ipsius verò lenitas blanda est & ad deuorandum habilis. ipsius etiam lentor caliditates mitigat, membranas mundat, tussis concoquit, omnia emollit: tales ordei virtutes sunt. Halica verò secundum gradum occupat: quæ cum pauca quædam cum ptisana communia possideat: ob ea probatur, optimaque censetur. Lentor enim, lenitas, suauitasq; in deuorando vtrique communia sunt: in cæteris omnibus halicam ptisana antecellit: sed ea quoque simplex cum melle solo conficiatur. Tragi præterea boni sunt. Deterior ipsis oryza est: quoniam ficit & exasperat: potiusque costarum purgationem supprimit, quàm facilem reddit. Optimus quoque
- D** est panis aridus, contusus, per subcerniculum transmissus, bene temperatus, concoctu facilis: cum mulla, quantum satis est, alimenti præbet. Nempe si iam diu morbus produci tur, cum dictisque cibarijs homo labare coepit: ptisana ex ordeo præbeatur bene trita, bene cocta: condiaur verò anetho, sale, & oleo tenui, puro, non viscido, non exasperante. At non multum olei cum ptisana coquere præstat. nam & sorbitionem pinguem reddit, & prauitatem oleum deponit: longa enim decoctione in cremorem ordeis absorptum amplius non apparet. Item porrum cum sua coma, & amygdala amara cum cremore incoquantur. Ita nanque ferculum ad spirationem expediendam commodum me-



dicamentofumque ab his efficitur. Porri autem cum cremore comesti **E**  
 vtilitatem iuxta delectationemque summam afferunt. Iam verò et ouo  
 rum bonum succum creantium opportunitas adest. ac si humida co-  
 piofaque per os materia feratur; sulfur ignem non expertum nitrumque  
 in oua inspergito. Sed mirifice profunt oua nup à gallina edita ex igne  
 igne carentia: quippe à matre caliditas inest igne quidè humidior, sed  
 ægrotanti familiarior, vtpote animali ab animali. Sin autem pituita  
 glutinosa ac tenax sit; in oua oleum infundito, ac resinam siccam pi-  
 neam, quò sulfur melius reddatur, inspergito: necnon & terebinthi re-  
 sinam eliquato. Piper præterea in ouis, in ptisana, in omnibus epulis, &  
 quæcunque piperi similia sunt, benè proficiunt. Inter carnes extremi **F**  
 pedes in cremoribus eliquati, columbæ, gallinæ elixæ, porcorum cere-  
 bra cum omento quidem tosta, sine illo verò nidore vacantia. Si inter  
 spirandum æger strepitum non reddit; dandi sunt etiam marini pisces  
 aut saxatiles, quicquid optimum regio ferat. Verum vt nequæ cupidita-  
 te delinquat, neque victus tenuitate contabescat; ex fructibus malum  
 concedito in aqua, aut mullæ elixum, aut cum adipe assatum: sed co-  
 rium & interiora aspera cum semivibus abijciantur. Tempore quoque  
 illo, quod Horam græci nominant, fici, & alij id genus fructus conce-  
 dantur: quatenus, scilicet, innoxij sunt, quin potius adiumentum præ-  
 stant. Hæc sanè de alimentis abundè sint. Lateri autem lanæ superden- **G**  
 tur sulfure fumigatæ, vngvine imbutæ, in quo anethum rutæ inco-  
 cta sit. Iugiter his latus madefaciendum, cataplasmatisque ante cibi as-  
 sumptionem tegendum est. præter vñtata cataplasmata fertulam in  
 mullæ elixam accipito, cui papaueris carnem incoctam commisceto,  
 manne quoque puluisculum inspergito. At si humidius sputum copio-  
 sumque reijcitur; lolij farina, aut irionis commiscenda est, & nitrum  
 inspergendum. Cæterum si morbus productior sit, dolor est pertinax,  
 & humida sit expurgatio; tunc purulentum hominem fore speratur.  
 itaque sinapi & cachrys cataplasmatismatis admiscenda sunt. Sed si penitio- **H**  
 res locos ægroti frigidus esse perferunt; acetum affundito. illud au-  
 tem efficere operæ precium est, vt cataplasmatum calor diu efficax per-  
 maneat. melior est enim id genus caliditas, quàm cataplasmatum inno-  
 uatio. Proinde calefactiones in sacculis ex huiusmodi, vtpote ex millio  
 fiant, aut ex calenti oleo in vesica incluso. Omnis verò fatus machina-  
 tio, ne pondera dolori dolorem adijciant, levis esto. his enim leuibus  
 & assumpto cibo, cum dolor infestat, vt nihil prohibet. Iam verò post  
 hæc etiam ad mouendæ cucurbitulæ occasio adest: Sed hoc post septi-  
 mum diem facere optimum fuerit: ante ne festines. haud enim placidi  
 morbi sunt, quicunque ante septimum cucurbitam requirunt. esto au-



- A**tem magna, omni ex parte lata, dolentem locum ambire valens. quippe cum haud interius descendat dolor, sed in latitudinem diffusus sit. At flamma sub cucurbita multa esto: quò non solum attrahat, verum etiam ante ignis extinctionem calefaciat. Extinctio igne scarificandum est, tantumque sanguinis, quantum vires permittunt, detrahendum. multo verò plus esto, quam si alia de causa de præcordijs sanguinem haurires. nam maximè perspicuum est, quod in lateris morbo vexatis à cucurbita percipitur adiumentum. Sal quidem, aut nitrum in scarificationibus mordacia sunt ac dolorifica, sed salutaria. Quapropter considerandæ sunt hominis vires & ingenium: nam si forti animo ac tolerans sit, sal inspergendus est, non ipsis vulneribus ita, ut ipsa contingat: sed super linteolum oleo madidum inspergatur. id verò super locum scarificatum extendito: humiditates enim ex salis colliquatione manantes minus, quam sal, mordaces sunt. Sed multo oleo perfundendum linteolum est, quò huius lenitate morsionis dolor retundatur. Secundo die autem cucurbitam affigere mirificè iuuat: ut ex vulneribus tenuis quædam sanies extrahatur. id verò priore cucurbita multo est efficacius, multoque magis vires conseruat: neque enim sanguis, aut alimentum, sed sanies emanat. Atque id quidem facito, cum prius vires exquisitè perpenderit. Die tertio ceratum cum cyprino oleo & rutaceo imponito. Quòd si ulterius purgatione sputa indigeant; in ceratis refinam eliquato, aut sulfur ignem non expertum admisceto; atque iterum fortum loco adhibeto. Porro modus cucurbitæ talis esto. fictile vas habendum est, leue, lateri congruens, latum: aut æneum. Id pronum in labra dolentibus locis circumponito: flammam verò multam cum oleo subiicito, quò viuens flamma in longum tempus sufficiat. Vasculi autem oras carni ne imprimito, sed ad difflationem transitus aliquis esto quò minus suffocata flamma extinguatur. diutius verò illam accendere expedit: nam intra vas illud inclusa caliditas optimum fomentum est, & bona sudoris prouocatio. Neque verò medelam inferioribus partibus adhibendam negligere oportet: viris quidem in anum rutaceum oleum, mulieribus autem & in vterum infundendum est. Perpetuò sanè quæ bibuntur, ac deuorantur, sunt multa cum ruta & succo ptisanæ, si continenter tussit: ut in alimento medicamentum sit. Verum si nondum alimenti præbendi tempus adsit, aliquod compositum, quod Picærium græci dicunt, accipiat ex varijs constans, cum melle ad consistentiam decoctum. Globulos autem sabæ magnitudinem equantes, turbinatosque dare oportet sub lingua continendos, huc atque illuc iactandos: ut non deuorabile, sed eliquabile sit. Suaue quoque est id, quod ex papauere cum melle ac sertula campana medicamen cõficitur lene,



atque somniferum. Hæc utique & ante cibi assumptionem, & assum- **E**  
 pto cibo, & post somnum ipsum præbenda sunt; sed ieiuno medicamē-  
 tosa exhibeantur: Quale est, quod hæc accipit, vrticæ, lini seminis, amy-  
 li, nucis pineæ, cuiusq; contriti cyathum, amygdala amara numero vi-  
 gintiquinque, totidem & piperis grana. oportet autem hæc torrere, ac  
 trita cum melle ad eclegmatis temperaturam permiscere. horum de-  
 tur mystillæ una. si liquida crudaq; excreat, myrrhæ pondo drachmas  
 duas, croci pondo drachmam unam, piperis grana quindecim, cum  
 mellis pondo libra subigito. id sanè medicamentum & ante cibi acce-  
 ptionem mystillæ dimidiatę mensura dari debet. bene facit in longo la-  
 teris morbo, quando & oxymel dare convenit, si spirandi vrgeat diffi- **F**  
 cultas. Frigidam verò aquam quicumque medici pleuriticis concesser-  
 unt; neque qua ratione id fecerint, assequi valeo, neque experimento  
 confirmare. quippe si qui à frigida periculum euitarunt; hi profectò mi-  
 hi non laborare pleuritide visi sunt. Verum apud vetustiores etiam me-  
 dicos species quædam concursus pleuritis, seu Lateralis morbus voca-  
 batur: cum bilis esset excretio, cum dolore lateris, & exigua febre, vel  
 etiam sine febre. Huiusmodi sanè affectus nomen quidem pleuritis,  
 rem verò nō obtinet. Quin etiam spiritus nonnunquam in latere con-  
 clusus sitim, dolorem prauum, mollemq; caliditatem excitat: id quoq;  
 vitium ignari homines Pleuritim nuncuparūt. His nempe frigida aqua **G**  
 remedio esse poterit, cum prospera vtentis fortuna extincta sitis erit, bi-  
 lis ac spiritus per inferiora subducetur, & dolor & caliditas exhalabūt.  
 Verum in lateris inflammatione & succingentis membranæ tumore  
 non solum frigida aqua, sed etiam frigida respiratio noxia est. Itaq;  
 si ex prius tradita medendi ratione incolumes redduntur pleu-  
 ritici, paulum tamen adhuc tussiunt, & caliditas subinde  
 repetit, atque infestat; ad hæc penitus discutienda  
 maturandum est. aut enim quæ relinquun-  
 tur, recidivas faciunt, aut ad suppura-  
 tionem conuertuntur. **H**



## ARETAEI CAPPADOCIS

DE ACVTIS MOR.

BIS CVRANDIS,


Liber Secundus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Curatio Pulmonariæ.	Cap. I.
Curatio Reiectionis sanguinis.	Cap. II.
Curatio Cardiaci Affectus.	Cap. III.
Curatio Cholerae.	Cap. IIII.
Curatio Voluuli.	Cap. V.
Curatio Acutorum Iecoris Affectuum.	Cap. VI.
Curatio Acuti morbi Venæ & arteriæ dorsi.	Cap. VII.
Curatio Acuti Renum morbi.	Cap. VIII.
Curatio Acutorum Vesicæ vitiorum.	Cap. IX.
Curatio Vulvæ strangulatus.	Cap. X.
Curatio Satyriasis.	Cap. XI.

## Curatio Pulmonariæ. Cap. I.

**A**  Eracutum letaleque malum est inflammatio repletioq; pulmonis: quas strangulatus brevis consequitur. Igitur æquis resistentia viribus, matureque ferenda subsidia sunt. protinus in cubito venæ aperiantur, siue vtraque, in dextra videlicet, ac lena manu, idque potius: siue vna tantum, & ea maior quò ab vtraque pulmonis regione humiditatum reuulsio, non tamen vsq; ad animi deliquium fiat: strangulatum enim animi deliquium auget. Cæterum si vel paulum respirauerit, tunc supprimendus sanguis est, ac denuò postea mittendus. nam si à sanguine morbi causæ prouenerint, eas venæ sectio tollit. Atqui seu pituita, seu

**B** spuma, seu quæuis alia humiditas tumefaciat, venarum inanitiones ampliorem pulmonis locum ad respirationis transitum efficiunt. opus est autem humores & flatus post venæ sectionem deorsum versus trahere, nitro, melle, ruta, resina terebinthi liquida sedem oblinendo. sed missionis sanguinis loco, si quod maius impedimentum sit, acrem succum per clysterem in sedem immittito: vt puta, salem cum nitro, aut terebinthi resinam cum melle. Ruta quoque in oleo, & hyssopum in

O



## A R E T A E I

aqua decocta. Item cucurbita syluatica carnes interiores in aqua exco  
 cte conueniunt. Præterea inanes cucurbitulae egregiè faciunt, si tergo,  
 dorso præcordiis que vbi que adhibeantur. quod sicubi pectus carnu-  
 lentum sit, quò minus circum ossa cutim cucurbitula incumbens affli-  
 gat; ibi eam affigito. nam si ad quancunque partem corporis humores  
 distrahantur, & spiritus ad extima euocetur, quibus pulmo opprimi-  
 tur; aliquod mali solamen inuenias. omni enim ex parte Pulmonaria  
 obsidenda impugnandaque est. Verùm neq; vllum ex his medicamen-  
 tis, quæ ore sumpta conducunt, despiciendum est. quippe ea est natura  
 pulmonis, vt siue recte valeat, siue egrotet; ad se humores alliciat. Quo  
 circa eiusmodi medicamenta præbeantur, quæ humores ad transpiran-  
 dum attenuent, lubricos fluxilesque ad extrudendum efficiant. Propi-  
 netur quidem celeriter iuuandi causa nitrum cum hyssopi decocto,  
 aut muria cum aceto & melle, aut sinapi humidum cum mulsâ. singu-  
 lis autem iridis radicem & piper inspergere auso benè cedit. item hæc  
 arida cribrato, et cum melle exhibeto. Quòd si interdum infomnes sint,  
 & noctem quoque totam peruigilent, ne hominem furor corripiat,  
 metus est: varijsque somnificis medicamentis, nisi ægritudo remittat,  
 vti decet: quòd medicamenta in tempore data morbi acerbitatē leniant  
 & obtundant. multa verò soporifera sunt. At si in strangulationis im-  
 petu, iamque aduentante interitu medicamen præbeas; apud tuos con-  
 tribules mortis eius autor appellaberis. Alimenta pariter eiusmodi ef-  
 fe debent, acria, videlicet tenuia, crassitudinem dissipantia, extergen-  
 dique facultatem habentia: Inter olera porrum, aut cornicis pes, aut vr-  
 tica, aut brassica in aceto incocta. Inter frumentacea verò ptisanæ cre-  
 mor parum origani, aut hyssopi, necnon piperis, sed plus nitri loco fa-  
 lis accipiens. Alica præterea mulsæ incocta prodest. Omniaque per eli-  
 xationem flatum abijciant: flatus enim vomica pulmonis laborantibus  
 infesti sunt. Vinum, si febre vacant, quod haud ita multum adstringat,  
 potui detur: quippe densat corpora adstrictio: Istis verò membra potius  
 laxanda sunt, sputique educationi studendum. Sed in totum potus mo-  
 dicus esto, cum pulmoni madefactio inimica sit: quoniam à gula atq;  
 ventriculo trahit. Thorax autem lanis oleo imbutis cum nitro, aut sale  
 contegatur. Optima inunctio est ea, quæ ex adarce fit. Sinapi etiam ari-  
 dum, & cum cerato humido prodest. Atque in summa & humores &  
 calor, & spiritus foràs educendi sunt. Huic rei opitulatur acrium olfa-  
 ctus atque illitio, & extremorum deligatio. Hæc facienti  
 nisi morbus cedat, de hominis valetudine  
 actum est.



## A De sanguinis Reiectionis curatione. Cap. II.

**O**Mnes sanguinis effusiones haud mite vitium sunt, non modicum solum ratione, vt si per fracturam, aut erosionem, verum etiam si per rarefactionem effunditur. neque si ex pectore, aut pulmonibus; aut stomacho, aut iecore fertur, periculosum est, è capite verò si defluit, minorem noxam affert: sanguinis enim exitus est: sanguis autem omnium est alimentum, omnium calor, omnium color. terroremque incutit, sanguinem ab ore vtcunque manantem intueri. malumque est, si à primario viscere: peius verò si ob fracturam, aut erosionem profunditur. Huius itaque vitij medicus ad opem ferendam maturet, necesse est. In primis quidem aerem frigidiorum ad respirationem deligito, conclauem non titubans, cubile firmum, quò nullam in partem quatiantur, inhabitet: còcussiones enim malum exasperant, stratum solidum, haud multum cedens, neque profundum, neque calidum esto. positus figurae corporis erecta sit. ne sermocinetur, nèue sermones audiant. animi absit perturbatio, sed contra oblectamenti leniatur: siquidem id genus ægrotos magna animi consternatio corripit. quis enim vomens sanguinem mortem instantem non perhorrescat? Igitur si sanguine referti sunt, & venas prominentes habent, in qualibet sanguinis profusione venam pertundito. nam siue ex fractura, siue ex erosionem profluit, sectio venæ conducit. Sin rarefactio in causa est, ne multitudo venam effringat, metuendum. cædenda est autem caua incubito vena. Etenim ex hac facile sanguis effluit, & ipsa sectioni exposita est: vtque per plures dies sanguis innoxie decurrat, commodè aperta seruetur. in omnibus autem omnium (vt ita dicam,) præcipuorum viscerum hæc est sanguinis via. vena vtique hac superior, necnon & hæc vnius in brachio venæ ambæ propagines sunt. quare nihilo plus superior, quàm media emolumenti affert. nam propaginum ignari sunt, quotquot stomacho & iecori superiorem venam copularunt. Sin à liene sanguis fertur, sinistræ manus venam illam, quæ inter minimum anulareque digitum sita est, rescindito: quandoquidem medicorum nonnulli eam ad lienem vsque pertinere arbitrantur. verum & hæc ipsa inter cubiti venas inferioris propago est. cur itaque potius eam quis propè digitos, quàm in cubiti curuatura proscindat, cum hoc in loco amplior sit, & ad effluxum habilior? Porro quidem ante animæ defectum sanguis cohibendus est, atque haud ita multus auferendus: nam & ipsa cruoris per os effusio satis hominem labefactare potest. assidue verò post paucum detractum sanguinem iterum detrahito & eodem die, & postridie, necnon & perendie. At si egrotus tenuis, & inops sanguinis sit, venam

O ij



ne scindito. hæc de sanguinis missione abundè sint. Succurrendum est **E** etiam extremorum deligaturis, pedum quidem supra malleolos & genua, manuum verò supra brachiale & cubitum. fascia ipsa lata sit, quò sit validior, neq; dolorem moueat constrictio. Nempe locis, vnde sanguis erumpit, lanas ouium succidas imposito, & humore perfundito, utpote austero vino, & roseo aut myrtino oleo. Si cruoris effluuium vrget; lanarum vice spongiæ admouendæ sunt, & pro vino acetum infundito, locumque myrtino subungito. in omnibus autem spongiis acaciæ, aut hypocythidis, aut etiam aloes succi aridi sint. optimè facit & omphacium aceto liquatum. Quòd si irrigatio sordida sit, ægreque feratur; emplastris uti conueniet: cutim enim circumtendunt, ac veluti manu corripiunt, quin etiam ipsorum facultates refrigerare, exicca- **F** reque magnopere valent. Infinitæ verò aliæ aliis experimento cognite vires insunt: sed optima emplastra ac tutiora sunt, quæcunque acetum habent, & salicis foliorum succum, necnon & bitumen, & æruginem, & alumen, & thus, & myrram, & æsustum, & æris squammam: atque in summa quæcunque huiusmodi emplastra sunt; emplastris sordidæ lanæ, aut spongiæ paucò aceto perfusæ superduntur. Sin emplastrorum distentionem ferre nequeunt; id genus epithema facito, Palmulæ pingues nigro vino austero maceratæ ad mazæ, id est, placen- **G** tæ crassitudinem conteruntur: postea acacia trita, & malicoria insperguntur, hæc omnia panniculo trito ac veteri illita pectori inducuntur. Item polentam vino aut aceto perfusam, necnon lentis farinam tenuem per incerniculum transmissam cerato ex vnguento roseo facto excipiens imposito: cum quo & symphyti radicem tusam & cribratam admisceto. Aliud epithema hæc recipit, Prunorum damascenorum, quæ Brabila **H** græci vocant, agrestium radices in aceto incoquito, ad speciem placen- tæ contundito, ac rhoi, commis, myrti paulum misceto. ex his utique alia alijs, prout medicaminum efficacia, lenitate, odore opus est, miscenda sunt: siquidem & ægrotantibus gratificari decet. Hæc nimirum exterius applicanda remedia sunt. At his præsentior medela in potio- nibus deuorandis que consistit, ut proxima vulneratis partibus medica- **H** mina sint. Porro triplex istorum forma est, ut vel fluctionis ductus li- gent, cogendo vascula & comprimendo: vel defluentem humorem cras- sum compactumque efficiant; quò licet transitus pateant, ne destillet: vel exiccent incursum in sede antiqua sanguinem retinentes; ut ne efflu- uio loci exhausti ita permaneant, exundatioque ibi sit, quò facta est ef- fusio. In venarum quidem rarefactione adstrictio satis est: ipsæ nanque ceu fistula noua imbecilla in rarefactionibus perfluunt. Diuisionibus ve- **I** rò, ut labia committantur, adstrictio quoque medetur: sed maioribus.



- A** valentioribusque medicamentis vtendum. Verum enim verò si sit erosionis modus, neque per adstringentia vlceris oræ cogantur, sed vulnus dehiscat, neque ex compressione in vnum redire valeat; sanguinem atque calorem congelare necesse est. nam istorum immobilitate concretionēque profluuium coercetur. Posca igitur rarefactis adstringendum satis est: neque enim sanguis effluens purus est, sed ipsius sanies per ostiola parua dilabitur. atque huiusmodi posca neque adeo multa, neque frequenter egemus. Nonnullis & exterius admota remedia abunde fuerunt. Quin etiam palmularum, aut siliquarum esculentarum decoctum potui datum solum quosdam liberauit. esto autem acetum ex vini adstringentis genere, quod si nō medicatione, tempore saltem acre adstringensque euaserit. Verum in vulnorum dilatationibus præter poscam medicamenta primum simplicia adhibeantur, vt plantaginis, aut sanguinalis herbae, aut seridis succus singulorum portio æqua cum posca: quod si adhuc plus effluat, hypocistidis, aut acaciæ siccorum cuiusque pondo drachmam in tres poscæ cyathos inspergito. optimè verò facit & vix acerbæ succus. At si calamitas hæc semper in peius irritetur, gallam tritam, & rubi radicem arefactam, & lapidem ex mari, Corallium quod vocant, aridum tusumque conspergito. verum rhei radix ad refrigerandum, siccandum, adstringendum, omniaque facienda his efficacior est. sed hæc quoque cum posca sola præbetur. Sin auxilia maiora requiruntur; radice huius pondo tres obolos seridis atque plantaginis succis, qui trium aut quatuor cyathorum mensuram compleant, iniicito. In erosionibus autem profus astringentia adhibere tenta: quò dilabentem sanguinem concretum, compactumque reddas, & suscipientia membra constringas: vt procul à vulnere venæ concidant, & occludantur. quin etiam quæ bibuntur, tenacia sunt, concretionem efficere valentia. Succum igitur coriandri ex aceto propinato: item & leporis, aut inuli, aut hœdi coagulum. Sed multum ne concedi to: nam istorum aliquod nonnunquam plus, quàm conuenit, datum
- D** hominem iugulauit. coriandri quidē succi ne minus semicyatho cum tribus poscæ cyathis præbeatur: coaguli verò tres oboli, summum quatuor. Ad hæc huiusmodi floris sanguinei speciebus & terra samia efficaciter subuenit, & eretrias, & aster quæ vocatur, valde candida, & rubrica sinopica, & sigillum lemnium. Istorum pondus minimum drachma, maximum drachmæ tres cum decocto aliquo præbeatur: vt palmularum, aut siliquarum edulium, aut rubi radicum. Sin arteria exasperatur, proptereaque tussit; in cretica sapa id genus terræ inspergantur. egregiè ad arteriam leniendam & amyllum facit: nam cum leuore & glutinandi potestatem habet. Si profusio sanguinis vrget; se-



mel in die ante cibi assumptionem dandum est: sin minus, & secundo **E**  
 & tertio sub vesperam. Ex medicamentis quoque siccis catapotia fieri  
 possunt ex melle ad consistentiam decocto: qualis est galla trita. opti-  
 mus est etiam rhous, quo in obsonijs utimur, vinacea, acuti rumicis  
 semen, per se singula, & simul omnia. Hæc utique & sub lingua ad per-  
 petuam eliquationem habenda sunt. Gummi etiam cum planta porri  
 & spinæ lachryma profunt. Variorum sanè medicamentorum infinita  
 est experientia, varij etiam vsus: vt pastilli ex egyptia spina, & pastilli ex  
 electro, & eius, qui Croceus appellatur, quorum apparatus proprio lo-  
 co expositus est. Porro cum febris abest, omnia in medicamentis auden-  
 da sunt, & multa & multoties exhibendo. Si febre vexantur, (plerunq; **F**  
 autem corporum inflammationibus febres superueniunt,) neque affa-  
 tim eruptio suppressenda est, neque in accessionibus medicamenta po-  
 tui danda: quoniam multi celerius febre, quam sanguinis effusione cō-  
 sumuntur. Alimenta varia sunt, specieq; medicamentis similia, quini  
 etiam in cibis medicamenta reperiuntur. neque enim in vno duntaxat  
 cibo omnia alimenti bona inuenire facile est. Atqui si non vnus cibus  
 ad medicationem sufficit, non vno propterea uti ob satietatem facile  
 est: sed per varia eundem: iam enim diuturna valetudo facta est. Itaque  
 adstringentia sint alimenta, & facultate refrigerantia, & ad tactum  
 quoque frigida esse debent. calor enim sanguinem prolicit. Alica lota, **G**  
 oryza in posca: sin acetum tussim exasperat, palmularum decoctum: pa-  
 nis assus, præaridus, contusus, atque in farina speciem reductus & cri-  
 bratus: atque ex his omnibus cum oleo sorbitio fiat. item thymbra sale  
 condita, & rhous cibis aspergatur. Quod si aliqua in re ægrotanti mo-  
 rem gerere placeat, coriandrum, si gratum sit, delectationis causa con-  
 cedito: aut aliquod ex seminibus urinam mouentibus, facilemque spi-  
 rationem reddentibus. lens utiq; si profluium sanguinis vrgeat, cum  
 plantaginis succo præbeatur: si non vrgeat, à succo abstineto: quippe  
 qui nec concoctu facilis, neque gustatui iucundus est. istis verò mini-  
 mè omnium ægrè concoctilia danda sunt. At si ob sanguinis effusio- **H**  
 nem mortem instare verearis, tunc iniucunda concoctu difficilia, quin  
 etiam immania sint licet ea, quæ salutem afferunt: propterea galla ari-  
 da trita lenti sicca & frigida adspargatur: oua coquendo crassiora effe-  
 cta cum mali punici corio, aut galla exhibeto. tale utique necessariò in  
 medicamine alimentum est. Potus omnino parcissimus esto: nam sic-  
 co victui humor inutilis est. Hæc nimirum adhibenda sunt, si adstrin-  
 gere ac refrigerare statueris: si verò sanguinem ac spiritum crassiorem  
 efficere; lac, amyllum, & alica profunt: modo cum amylo, modo cum  
 alica lac misceto. horum temperatura, vt ne sit liquida sorbitio, ad con-



**A**cretionem perueniat. Ceterum si adhuc magis crassare adstringereque cupias; alicam cum palmulis decoquito; ad spissandum autem amy-  
lum lacque optima fuerint, et far tyrrhenum cum lacte: crassum cum  
sit, viscidum, & glutinosum. Hædi verò coagulum in decocta liquida  
causa concretionis affundito: sicut in lac quoque, vt ad recentis casei  
temperaturam deueniat: his crassius est millium, vt far, in lacte deco-  
ctum, inspergantur autem galla & malicorium. Verum exiccantium,  
aut crassantium mediocritates coniectura assequi oportet: id genus  
nanque tussim mouent. Siccitatis quoque excellentia nonnullis & ve-  
nas lacerauit. Si bene cedit curatio, sanguisque compescitur, in contra-  
**B**ria paulatim adiiciendo fiat mutatio: atque, (vt dici solet,) nequid ni-  
mis. huiusmodi enim vitia facile reuerti solent, ac maligno ingenio præ-  
dita sunt. Iam verò hominem instaurare, carneque replere, & nouas ci-  
catrices foli dare necesse est gestationibus, mollibus frictionibus, pere-  
grinationibus, animi oblectamentis, cibis varijs atq; vſitatis. Hæc utiq;  
facienda sunt, si à sanguinis exitu vulnus coaluit, & congruenter locus  
sanatus est: sin vlcus relinquitur, purulentumque fit; altera deliberatio  
ne opus est; siquidem & iterum profusio sanguinis redit. verum de hoc  
affectu in sermone De diuturnis morbis disputabimus.

**C** De curatione Cardiacorum, aut Syncopæ. Cap. III.

**I**n syncopa medicum prouidentia sedulò nauare operam necesse  
est: futuram enim si prospexeris, & præsentia tibi festinanter opem  
ferent, & ipsam ante, quàm inuadat, propulsabis. præsentem verò non  
facile euadunt ægrotantes. Solutionem nanque naturæ Syncopam ef-  
fe diximus: Instaurabilis autem non est dissoluta natura. Hanc igitur  
maximè quidem futuram arcere; sin minus, saltèm nuper incipienti re-  
sistere debemus. præscienda verò ea sunt, quæ de acutis morbis differ-  
uimus, quando & causas, & signa explicauimus. Nam febris ardens ini-  
tium est: febrem ardentem signa pessima consequuntur, ariditas, vigi-  
**D**lia, caliditas viscerum, qualis ab igne prouenit. extimæ partes frigent:  
manus pedesq; extremi frigidissimi sunt: respiratio in attrahendo lon-  
ga est. siquidem frigidi aeris, quoniam ignem expirant, auidi sunt. ar-  
teriæ motibus exiguis, creberrimis, tremulisque agitantur. Ab his itaq;  
sumpta coniectura, & ab alijs, quotquot à me inter signa comprehensa  
sunt, ipsi ab initio syncopæ occurrendum est. Quapropter nisi hæc om-  
nia impediunt, habitus, ætas, anni tempus, hominis timiditas, vena cæ-  
denda est. Quod si multa prohibeant, quæ numerum insignem, & ma-  
gni faciendum constituent, vtpote lingua aspera & sicca & nigra, (om-  
nia enim interiora signa noscuntur,) in omnibus facultas perpenden-



da est: nisi prius morbo, doloribus, inedia labefactata sit: siquidem non **E** defectu tantum, verum etiā strangulatu prosterinitur. At ubi præ multitudine syncopa fiat, & inflammatio aliqua insignis in præcordijs, aut iecinore appareat; nequaquam procrastinare expedit. Secunda est igitur vena caua in cubito: per minutas sectiones, idest scarificationem etiam sanguis detrahendus est, quò facultas haud ita insignem iacturam faciat: copiosum enim ac subitum naturam vitiat. quin etiam multo minus sanguinis, quàm in alijs occasionebus, hauriendum est. nam in syncopa si vel minimum erroris committitur, ad interitum ducit. Protinus igitur ad vires instaurandas alimentum dare conuenit. Natura enim priorum repulsa, & nouorum adiectione lætatur. Vtiq; si **F** missionem sanguinis facultas non sustinet, inflammationesque infestant; cucurbitula tunc multo ante morbi iudicationem ei admouenda est. in iudicatorijs enim diebus syncopa incidere solet: in ijsdem verò circuitibus & naturæ iudicant, & morbi interimunt. Si vini potandi necessitas homini incidit, diligenti consideratione opus est: neque enim usque adeò tuta est in inflammationibus vini potio. siquidem vini potio inflammatione laborantibus dolores auget, inflammatione vacantibus naturæ incrementum affert, sed ante, quàm semel, aut iterum cucurbitulam affixisti; & ad membra relaxanda, & ad sanguinis facilem exitum utilis est: nonnullis & post cucurbitulæ secundam affixionem **G** benefecit. Hoc verò in casu & parsimonia vtendum est. nam & in cucurbitulæ vsu nimiae sanguinis effusionis idem periculum adimus: euacuationibus autem per clysterem duntaxat ad inueterata stercora eijcienda opus est: sed facultatis rationem habeto. Capitis irrigationes frigida; quotquot mihi in sermone de phrenitide relatæ sunt, paulum mediocritatem excedentes adhibeantur. Aer mundus, ad inspirandumq; frigidior deligendus: Visus plantarum, picturæ, aquarumque aspectu oblectandus: & hæc omnia iucundè suauiterque intuenda. amicorum præsentium locutiones sint ioculares atq; ridiculæ. Summa sit in ægro tantis corpore quies, in animo hilaritas. odora menta suauiora, quæ capi- **H** tis sensum non grauent, adhibenda. quin etiam grati odoris alimentis offerantur, qualis polenta est aqua aut aceto resperfa, aut panis calidus recentissimè coctus. Nempè vino haud copiosè os colluatur, neque prorsus denegetur. Potum frequentiore, quàm alijs, & magis assiduè his concedito. Esca per totum diem sit leuis, concoctilis, plerumque triticea, nec non ægrotanti iucunda, licet paulo deterior: istis enim magis, quàm alijs gratificandum est: quandoquidem haud minime ad stomachi resolutionem id morbi genus aptum est. Inedia verò aut fames nequaquam prodest: satis enim morbus ipse omnia consumere,



**A** mere, & exhaurire potest. Porro cum iam circuitus ad iudicationem peruenit, humiditas verò iugulum frontemq; irrorat, extrema algent, articularum pulsus minimus est, frequentissimus veluti repens, ac tenore debilis; tum paulum quid alimenti triticei sumendum, vinumq; euidenter degustandum est. Sed caput irrigationibus premunire oportet pariter & vesicam. Hec verò auxilia in tractatu De phrenitide à nobis memorata sunt. Vinum utique non pleno ore, neque ad saturitatem usque ingurgitandum est. Aliqui sanè importunè repleti, postea inappetentia, atque cibi potusque accipiendi impotentia vita excessere: multis autem fatis largè vescientibus, natura iam resoluta ad mortem euitandam alimentorum copia nihil profuit: in ventriculum quidem cibus delabentibus, sed ad recreandas vires à ventre non ascendentibus. Alimenta sanè varia sint oportet, plerunque triticea, quò sorberi potius, quàm mandī apta sint. si solida sunt, lubrica saltem efficiantur. Quā neque valde concreta, neque torrefacta sint, sed omnino soliditatis expertia. Panis buccellæ vino madentes & calefactæ duæ tresue initio præbeantur. Post autem omnia frigida ministrentur, nisi forsan interius phlegmonæ delitescant. Vinum odoratum, haud ita multum adstringens, quàm minime crassum deligatur, ex Græcis Chium, aut Lesbium, & quotquot alia insulana tenuis sunt tēperaturæ: ex Italicis autē Surrentinum, aut Fundanum, aut Falernum, aut Signinum, nisi vehementer adstringat. atq; ex his omnibus illud vitandum est, quod peruetustum, aut valde nouum sit. Nempè detur primo calidum non minus cyathis quatuor ante iudicationem, neque plus cotyla, siue hemina, quamuis bibax homo sit. deinceps cibo exhibito, si inflammatio permiserit, iterum frigidum vinum, quod siti medeatur, propinandū. At si necessitas vrgeat, vino nō solo, sed cū cibo vtēdum est. verum ne mentem vinum lædat, cibus ante sumendus est: & post hæc abstinentidum. Si post aliquod temporis interuallum dormire velit, quies concedenda est. Verum si multus sudor emanet, arteriæ iam micare defināt,

**D** vox acutior reddatur, & pectus calore destituatur; vini quantum potare possit, concedendum. in solo enim vino refrigeratis spes vitæ posita est. Vinum itaque sit vsitatum, & modo id ægrotus tantum bibat, modo cibum cum vino assumat. id autem per interualla fiat ad tollendam lassitudinem, quæ tum ex morbo, tum ex cibo provenit. nam qui exiguas vires habent, & post assumptum cibum valde laborant. Igitur & ipsum decet forti esse bonoq; animo, & medicum suavi oratione cum ad bonam spem cohortari, varioque alimento & vino opitulari: nec non & alia efficaci medela uti opus est & ad sudores coercendos, & ad vires instaurandas, ut penè extinctæ reuiuiscant. Quapropter pecto-



ris sinistrae mammae palmula in vino macerata cum aloe & mastiche  
 superdentur: ceratum verò cum nardo factū ista excipiat. quòd si istud  
 durum siccumq; fiat, aliud epithema imponendum: mala cotonea ex-  
 tracto semine, & quicquid durum est, contusa polentae odoratae admi-  
 sceto: postmodum absinthij & myrti comam, acaciam quoque & man-  
 nam cribratas permisceto: simulque omnia subacta cenanthino cerato  
 excipito. Si per hac sudor non supprimatur, vuc acerbae succus miscel-  
 lae addendus est. succus igitur iste, quē Græci omphacion vocant, cum  
 maximè acerbus est, & acacia, & gummi, & rhous esculentus, & alu-  
 men, & palmula, & rosarum succus benè olens simul omnia cum nar-  
 do & labruscae pinguiori parte pectori superponantur. huiusmodi F  
 nanque epithema iuxta refrigerat & adstringit. Decumbat verò æger  
 in aere frigido, aut & ad vrsam domus vergat. at si & frigida boreæ au-  
 ra afflabit, malè spirantem animum excitabit. Moretur autem & pro-  
 pè virentia prata, fontesque, & obstrepentes riuos: nam & ab his ema-  
 nans bonus halitus, & mentis delectatio, animam fouet, & naturam su-  
 scitat, vitæque restituit: quin etiam cibi potionisque desiderium lacef-  
 fit. Ceterum si quis ob inopiam hæc assequi nequeat, imitari oportet &  
 auram frigidam ramorum benè olentium voluptarijs flabellis, & tem-  
 pus vernum folijs ac floribus præsentibus humum sternentes. Operi-  
 mentum quoque leue sit & obsoletum, vt aerem quidem accipiat, calo-  
 rem autem pectoris exhalare permittat. optimum verò est vetus lin-  
 teum. Cervicem quidem & iugula & pectus polenta cōspergito: vt odo-  
 ris suauitate nutriat, siccitate coerceat. item & polline quidem corpo-  
 ris raras partes contegit: necnon & faciem terra samia lineo sacculo  
 cribrata, & raro linteolo inclusa respergito, vt minutissimus pulvis in  
 frontem & malas excutiat. calx præterea extincta, & gypsum exustū  
 per lineum paruum sacculum, quem Græci Criseram vocant, trans-  
 missa sudore madentibus injiciantur. Compresit sudores nōnunquā  
 & spongia ex frigida faciei admota: dilabentes enim humores cogun-  
 tur, & cutis raritas conspiscitur. Prodest etiam sedem inungere: vt frigi-  
 dus flatus, & ab alimento exortus effundatur. Item reuocandus exci-  
 tandusq; est extremorum calor illitu gleucini olei, aut sicyonij, quod  
 ex agresti cucumere efficitur, cum pipere, castorio, nitro, et cachry: mo-  
 dicum ceræ in eis eliquando, vt inunctio membrīs inhærescat. Illitio  
 quoque ex adarce (limnestida vocant) euphorbio, & lauri bacca calo-  
 rem exuscitat: pariter & bulbi crudi, illi inquam, qui exigui & rubri  
 sunt, cum pipere & aceti fecē leuigata valentissimum pedibus cataplas-  
 ma imponitur: sed intra horæ spatium illud frequentissimè auferendū  
 est. instat enim periculum vlcis & vesicarum. Porro ab his spes afful-



- A** get ita egrotantem perniciem euasurum. Quod si omnia secundum rationem medicus præstet, recteq; omnia cedant; cum syncopa si inflammationes quoque adsint, discutiuntur: sudor nusquam effluit: calor in quamlibet corporis partem ad extremos vsque pedes, & summas nares diffusus reuiuiscit: facies vegeto colore decoratur: pulsatus in magnitudinem efferuntur, nihil tremuli, sed vehementes: vox autem consueta reuertitur, & canora est: ipseque prorsus viuus efficitur. lassitudinem quidem haud exigua percipit, verum dormire etiam conspicitur. atqui si ipsum somnus occupauerit, cibaria planè cōcocta: erunt sensus mali obliterabitur: naturæque vis egerminabit, & reuirescet.
- B** cumque à somno expergiscitur, bene spirat, leuis est, expeditus & robustus: reuocat autem in memoriam morbum ceu quoddam somnium. At nonnulli sunt, quibus febres obscuræ, tanquam morbi reliquæ, remanent: nonnunquam & inflammationes modicæ, & lingua arida, & sudoris priuatio: præterea rigent, torpent, dissoluuntur. hi sanè in tabe prolabantur. Tunc verò tempus terendum non est quiete & victu tenui: sed ad motiones eger traducendus per gestationes, frictiones, & lauacra: quò vitæ residuum à morte vindicetur, augeatur, ac recreetur. Propinandum verò est etiam lac maximè mulieris, quæ proximè peperit, puerumq; nutrit. hi nanque alimento, vt nuper in lucem editi pueri, egent. si lactis humani copia non datur, afinæ, quæ non pridem peperit, lac accipito: tenue est enim ac fluxile huiusmodi lac. Post hæc ad resumptionem & ad consueta æger ducendus est.

## Curatio Cholerae.

## Cap. IIII.

- I** N Cholera eorum, quæ eijciuntur, suppressio mala est: cruda enim sunt. quare nos oportet ea facile sponteq; exeuntia libenter permittere: si non exeant, incitare, aquam tepidam sorbitioni dantes, assidue quidem, sed paucam, ne tentiones inanes in stomacho fiant conuulsioni similes: si torquentur intestina, & pedes frigescent, irriganda est aluus
- D** calido vngue, in quo ruta, cuminumque incocta sint: vt flatu digerantur, dissipenturque. lana quoque imponenda est, & pedes inungendo molliter fricare oportet, contrectando magis, quam premendo. sed genibus tenus hæc fiant: vt caliditas, quæ abierat, reuocetur. Hæc verò tantisper facienda sunt, donec stercora per inferiora deijciantur, & superius biliosa efferantur. Sin autem omnia antiqua stercora deiecta fuerint, & biliosi humores transferint, biliosusq; vomitus & distentio adsit, fastidium, anxietas, virium labefactatio: tunc frigida aqua cyathi duo, aut tres propinandi sunt ad ventris adstrictionem: vt retrogradus humorum cursus cohibeatur: vtq; stomachus ardens refrigeretur.

P ij



assidue verò id, cum potam aquam vomuerit, facito. facile quidem frigidam in ventre incalescit: verum eam stomachus euomit à calida pariter ac frigida dolore affectus, semper autem frigidum potum expetit. Porro si arteriarum motus ad paruitatem lapsi fuerint, necnon assidue & frequenter micent arterie, sudor circa frontem & iugula et qualibet corporis parte stillatim effluat, alui profluvium non sistatur, & ventriculus adhuc euomat cum distensione & animi deliquio; parum vini odorati & adstringentis aquæ frigidae infundendum est: ut præ odore sensus excitetur: ob eiusque potentiam roboretur. & corpus ob nutritionem recreetur. vinum enim celeriter sursum petit, ut retrogradum humorum fluxum coerceat. tenue verò est, ut facile diffusum naturæ ad sanitatem recuperandam opem ferat: validum quoque, ut vires dilabentes fulciat, atque sustineat. Inspergenda est etiam nonnunquam recens & benè olens polenta. Verum enimverò si omnia virgeant, sudor & tentio non stomachi modo, sed etiam nervorum, singultus inanis, & pedes cõtendantur, & alui multa excernat, & homo caliget, et pulsus arteriarum ad immobilitatem vergant; tunc huiusmodi ægroti statum prævertere opus est. Quod si iam adsit; frigida ac vini multum præbendum est, & nequaquam meracius: ne fiat ebrius, ac ne lædantur nervi: sed cum cibo, & panis bucellis madefactis. Præbere quoque aliam escam convenit, qualis à me in capite De syncopa tradita est, item fructus mollioris corticis, Oporam Græci vocat, adstringentes, sorba, mespila, mala cydonia, vuam. Ceterum si omnia euomit, & stomachus nihil retinet; ad calidas potiones & cibaria recurrendum: nonnullis enim hæc mutatio vomitionem compescit. calida verò calidissima sunt. Sin horum auxiliorum nullum proficit; cucurbitula in interscapulo affigenda est, atque infra umbilicum. verum assidue cucurbitulæ mutandæ sunt: nam si diutius permaneant, dolorem ciunt; periculumque est, ne vesiculas excitent. Profuit interdum & auræ motus suavis: ut & spiritus reuiuiscat, & cibus in ventriculo remoretur: utque melius ægrotus spiret, meliusque arteriæ micent. At si hæc in peius labantur; ventri, pectorique talia imponenda sunt, qualia & ad syncopam supra memorauimus: palmulæ vino madefactæ, acacia, hypocisthis, hæc roseo cerato excepta, linteoloque illita ventri imposito: pectori autem mastichen, aloem, absinthij comam tritam cum cerato nardino superdato: aut œnanthem toti pectori inspergito. Pedes verò & musculos, si cõuellantur, sycionio, gleucino, aut veteri oleo cum exigua cera perungito, castoreo quoque respergito. Porro si frigidi etiam pedes sint, vngui ne ex adarce & euphorbio inungito, & lanis obuoluito, & manuum palpatioe foueto. quin etiam dorso spinâ, tendones, & musculos; nec-



**A** non & maxillas ijsdem inungere expedit. Quòd si post hæc sudor & venter suppressi fuerint, & stomachus cibos admittat, neque euomat, pulsus magni & validi sint, & conuulsio desinat, sed calor vbique increseat, & extrema infestet, somnus verò omnia concoquat; secundo die aut tertio soluendus est æger, & ad consueta mittendus. At contrà si omnia vomitu reijciat, sudor perennis effluat, frigeat laborans, & liuidus fiat, pulsus etià propè extincti sint, & vires cadant; cum ita in quâ se habuerint, inde honestam fugam capescere bonum est.

\* Aliter lauandus.

## Curatio Voluuli.

## Cap. V.

**B** **I**N voluulo dolor est perimens ob intestinorum phlegmonem: distentio adest, & inflatio: celerrima ac fidissima perniciēs impendit. nonnulli enim desperata salute ægrotantes mortem euidentem tantummodo formidant: aliqui verò in voluulo ob cruciatus acerbiter mortem expetunt. quocirca neque remedium vllum morbo inferius, neque debilius medico adhiberi opus est. Verum si morbi causam inflammationem esse inuenerit: venam in cubito magna sectione aperiat: quò multus subito sanguis inflammationis alimentum, vel vsque ad animæ deliquium effundatur. Etenim hoc vel sedandi doloris, vel stuporis ac sensus priuationis initium est. In voluulo autem recreatio est ac respiratio, vel ad breue tempus (licet præ ignorantia) tormenti dilatio. quandoquidem hominibus ita viuētibz mori beatum est: Medico autem cuiquam mortem inferre nefas ducitur. Sed fas est interdum, cum præsentia mala euadi non possent manifestè prouideat: gravitate capitis torpida ægrotum sopire. Sin absque inflammatione ob corruptionem, aut ingens frigus voluulus prouenerit; venæ sectio dimittenda est: reliqua autem omnia faciēda. Consulendum est igitur, ut à potu aquæ tepidæ frequēter euomat, oleum bibat, deinde rursum euomat, flatus inferius irritamentis educendi: irritatoria quidem sunt cyclamini succus, & nitrum, aut sal: flatus autem euocant cuminum, & ruta. igitur his omnibus cum resina terebinthi sedem oblinere oportet, & spongijs fouere: aut hæc per clysteres infundere cum oleo, melle, & hyssopo, et cucurbitulæ sylvestris carnis decocto. Quòd si stercus excretum sit; iterum oleum calidum cum ruta iniiciendum: id enim si intus moretur, fomentum intestinis propitium est. præterea dolentes locos oleo, in quo ruta & anethum abundè incocta sint, perfundere cōducit. Adhibeantur & fots ex lentibus figulorum aut fabrorum ferrariorum, aut ex millio & sale vstulatis. Cataplasmata verò præter vulgata sunt lolij farina & cuminum, & hyssopi aut origani coma. Cucurbitulæ quoque leues quidem, sed frequentes, alia iuxta alias abdo-



mini & ilibus ad inguina vsque admoueantur: quin & à tergo coxendicibus ad renes vsque & dorsum: vbique enim quisq; omnia dolorem lenantia faciens iuuat. Præibat autem cumini, aut rutæ decoctum, & sinonis, aut vnà cum his aliquod ex anodynis appellatis medicamentis. infinita autem alia ab alijs probata experimento inuenta sunt. Bonum verò est & ex viperis medicamentum plus consueta portione potui datum. Cæterum si neque dolor remittitur, neque flatus, neq; ster-  
cus deijcitur; purgatorium pharmacum, quod hieram vocant, necessa-  
riò dandum est: aut enim simul cum pituita & bile pharmacum vomitu expellitur: aut descendit, flatum, dura stercora, pituitam, bilem ip-  
sius mali fomenta secum educens. Alimenta exhibeantur aluum du-  
cendi vim habentia, iuscula gallinarum, ostreorum insigni pulchritu-  
dine præditorum, ordeï cremor cum multo oleo decoctus, quod à princi-  
pio ante decoctionem infusum sit: habeat verò cuminum, nitrum, por-  
rum cum coma. Aut medela adhibeatur cum aliquo iure ventrem  
subducente: cochleæ valde elixæ, & ipfarum succus. Itellinæ aqua po-  
tui detur (si febricitet) cum assaro, aut nardo, aut cachry excocta: nam  
hæc flatus eliciunt, vrinam cient, & spirandi potestatem facilem red-  
dunt. At si, dōlor absit; & vinum bene facit, vt intestina calefiant,  
vtque vires labantes confirmentur. prodest etiam fœniculi radicis de-  
coctum, si bibatur, & adiantum, & cinamomum. Sin ad abscessum  
inflammatio conuertatur; huic opem ferre satius fuerit medicamentis  
abscessui conuenientibus vtentem. ea verò in libris De longis morbis  
descripta sunt: vbi colici affectus sanatio traditur.

\* Aliter fe-  
bris.

### Curatio acutorum Iecoris vitiorum. Cap. VI.

**I**N iecore sanguinis creatio est, & in totum sanguinis à iecore ema-  
natio: ac omnino iecur est veluti sanguis gelatus. ideo phlegmonæ  
hoc loco acutissimæ sunt hac enim in parte alimentum residet. Sin vs-  
piam alibi phlegmone constiterit; non vsque adeo acuta est: aduena est  
enim sanguinis accursus. in iecur autem non opus est aliunde effluere.  
nam si obstructio aliqua exitus occludat; iecur effusione priuatum re-  
pletur abundatq; sanguine, alimenti verò ad iecur transitus adhuc pa-  
tet: aliud est enim iter alimenti à ventriculo & intestinis in omne cor-  
pus. Quocircà euacuare facile oportet, venam cubiti secando: multum  
quidem sanguinis, sed non semel totum detrahendo. Inedia primum  
iubenda est, postea cibi paucitas, vt et medicamentis ingredientibus ie-  
cur inane pateat. Insuper medicamentis exterius appositis, quæ in ieco-  
re aceruata sunt, discutere oportet. igitur illinatur aloë, aut nitro, lanæ  
œsypo sordentes admoueantur. Refrigeratione quoque opus est. iecur



- A** enim sanguine accenditur: nam sanguis calidus est. Huiusmodi ergo cataplasmata sunt, accipiat farina loliacea, aut irionis, aut ordei, & feminis lini: ex humoribus autem vinum acidum, cydoniorum succus, capreolorum vitis, labruscæ maturæ, aut oleum cum ea. Item cum spongijs fomentum fiat ex decocto baccarum lauri, lentisci, pulegij, iridis: per ista mitigato morbo cucurbitula maior applicetur, ut ex omni parte hypochondrio circumdetur: atque altius concidenda cutis, ut multum sanguinis effundatur. Nonnullis autem hirudines, quam scarificationes, magis placent. nam eius bestiolæ morsus altius penetrat: verum erosiones quoque maiores facit: unde & sanguinis effluuium ægrè suppressitur. cumque sanguinis potu saturata hirudo ceciderit, cucurbitula est applicanda: ab intimis enim partibus tunc attrahit. Quod si satis euacuatum sit, vulnera medicamentis sanguinè coercentibus morfuque carentibus obtegenda sunt, ut araneorum telis, manna aloëque inspergenda: panis cum ruta aut fertula aut althææ radicibus elixus superdandus. tertio verò die ceratum cum myrobalano, aut absinthij coma & iride conuenit. Quin etiam & malagmata vocata medicamentis talia esse debet, ut extenuare, aut rarefacere, aut urinam ciere valeant. optimum sane est medicamentum ex seminibus constans: quorum omnibus medicis experientia perspecta est. bonum est & illud, in quo aut sampfucus, aut fertula ponitur. Cibi tenues sunt, labiles, lotium mouentes, penetrabiles: alica cum mulsæ, & sorbitio ex ea cum sale & anetho. Ordei verò cremor & detergendi facultatem habet: at si & dauci feminum non nihil addatur, ad urinam lacescendam præstantior est: subducit enim per alueolos, qui à iecore in renes pertinent. opportunus verò est à iecore effluentibus illuc transitus & vasorum laxitate & itineris rectitudine. Idcirco & cucurbitulis ea nos trahere oportet eo loco, ubi renes sunt, secundum os coxendicis applicantes. Cæterum & hi sanguine cum ruta, aut odorato iunco, aut calamo aromatico irrigandi sunt. per hæc utique ægrotum posse mortem effugere sperandum est.
- D** Sin ad suppurationem conuertatur, pus mouentibus medicamentis utitur, quotquot à me in sermone De colicis literis prodentur. Cum pus autem iam genitum fuerit, quo modo incidendum, quo modoque medendum sit, alio loco scriptis mandabimus. Eadem nobis & de splene scripta sunt: si quando & inflammationis acutæ calamitas eum inuasit.

## Curatio acuti morbi dorsalis Venæ &amp; Ar-

teriæ.

Cap. VII.

**V**enæ concauæ, crassæque arteriæ, quæ secundum dorsum extenduntur, inflammationem ardoris speciem maiores nostri appel-



lauerunt. nam & ardoribus similes affectus in ambabus oriuntur: ignis **E**  
 acutus & acer, fastidium, sitis, anxietas, pulsus palpitans in præcordijs,  
 & in auersa parte quam Græci Metaphrenon vocat: & quotcūq; à me  
 in volumine De signis relata sunt. Nempe & in syncopa tendit ignis,  
 quemadmodum & in ardoribus: siquidem venæ radicatio (vt ita dicā)  
 iecur est: arteriæ verò principium cor. haud ab re igitur existimes eo-  
 rum viscerum supremas partes maximè ad vitam facientes ægrotare.  
 Etenim cor arteriæ calorem impertit, venæ autem sanguinem iecur in-  
 fundit. Amborum verò magnorum viscerum magna sunt germina ip-  
 sæ videlicet phlegmonæ. Venas itaque in cubito protinus cadito, mul-  
 tumque sanguinis, sed non semel totum mittito, immo & bis, & ter, et **F**  
 alio die, quò interim vires instaurentur, repetito. Deinceps cataplasma  
 tis vtitor, & cucurbitulā præcordijs, vbi est arteriæ transitio, necnon et  
 inter scapulas, nam ibi quoq; pulsationes sunt, affigito, liberiusque sca-  
 rificato, et multum sanguinis detrahito: haud enim ita facile ex horum  
 vasorum inanitione in animæ defectum homines cadunt. Verum &  
 alius præter consuetudinem valde suppressa ad lubricitatem per cly-  
 sterum molliores infusiones est reuocanda, acribus autem minimè vti-  
 tor: nam hi facile in febrim incidunt à muria & nitri liquatione. ideo li-  
 ni feminis & fœnigræci succus esto, & radicum maluæ decoctum ad  
 prouocandum, & ad mordendū satis est. Extremas partes, pedes vide- **G**  
 licet & manus gleucino oleo, aut sicyonio, aut ex adarce vngvine ex-  
 calfacito: nam partes istæ in ipsis valde frigescunt. Præterea ante cibos  
 potui dato, quæ lotium euocant, meon, aslarum, absinthium, nitrum  
 quoque inspergito. sed omniū valentissima est cucurbita, & cinnamo-  
 mum, siquis eius copiam habeat. Lac istis & alimēti, & medicinæ vim  
 præbet: etenim refrigeratione indigent, cum in eorum visceribus velu-  
 ti quidam ignis exestuet, & dulci alimento, necnon & multo in parua  
 mole: has nimirum virtutes alimenti lac obtinet: esto autem mulieris,  
 quæ proximè peperit, & duobus lactis cyathis vnus aquæ admisceatur.  
 lac etiam bubulum optimum est: tertio loco caprinum ponitur. Ciba **H**  
 ria concoctu facilia præbeantur, plerique succi, fœniculi radix, & apij se-  
 men: indatur et mel: aqua verò, quæ bibitur, ista habeto. Oportet etiam  
 sudores elicere, & vbique difflationes humidas & fluxas facere. Caput  
 sicut in ardentibus febribus irrigetur. Epithema pectori & sinistrae  
 mammae, quale in syncopa, superdetur. Cubile rectus decubitus: vt om-  
 nia his similia sint, quæ in ardentibus febribus fiunt. Exercitatio modi-  
 ca ad sudores euocandos, necnon & balneum, si iste interius exarde-  
 scit. neque enim iudicationibus huiusmodi vitia soluuntur, & si ardo-  
 ris species sunt.

Curatio



## A Curatio acuti morbi in Renibus. Cap. VIII.

**P**Eracuta sanè in renibus inflammatio exoritur. simul enim inflā-  
mantur à iecore in renes discurrentes venæ: cum illis autem & ie-  
cur: cum haud ita prælongæ sint, sed valde latæ adeo, vt renes proximi  
iecori suspensi esse videantur. Verùm & vrinæ retentio inflammationi  
superuenit, vehementiam inflammationis adaugens: nam renum caua  
lotij non exeuntis alluione replentur. Porro idem & in calculis eue-  
nit, si in renibus calculus vrinæ canalium laxitate maior oriatur, qui nō  
egrediens inhærescit, atque sic & ipse vrinam intercludit. Cæterum de  
**B** calculorum creatione in libro De longis morbis sermonē habebimus:  
quomodo aut ne coalescant, aut iam concreti exterantur, cōminuan-  
turque. De calore autem atque obstructione, quæcunque celeriter ene-  
cant, in præsentia disseremus. Si calculi iam conflati sunt, adestque in-  
flammatio: venam cubiti, nisi ætas præpediat, secato: benè fluidus au-  
tem multusque sanguis exeat: neque enim phlegmonē tantum euacua-  
tione mitigantur, sed etiam calculorum intrusiones vasorum inanitio  
ne laxantur: quin etiam per miētum calculi elabuntur. Postmodum ir-  
rigationibus gleucini aut cyprini olei, & fomentis et cataplasmatibus par-  
ticulæ remittuntur. Artemisia verò herba, & iuncus, & odoratus cala-  
**C** mus in cataplasmatibus esto. Deinde cucurbitulam renibus in regione  
coxendicis adhibeto: maxime nanque ab ea parte euacuatio profuit.  
Alius præterea ducatur per clysteres cum lubricis, & viscidis potius,  
quàm acribus, ex maluæ, aut scenigræci cremoribus. nonnunquam ve-  
rò medicamenta ante cibos vrinam citantia dentur, qualia in vitij i-  
ecoris narrata sunt: pariter & cibaria similia concoctu facilia. cruditas  
enim istis noxam affert. Optimum sanè lac est, maximè quidem asinæ:  
secundo equinum: ouillum autem & caprinum confert, quatenus lac  
est. Si pauperes ægroti sint, eos lauare satius est. sin minus, in decocto  
herbarum desidant umbilico tenus folio repleto. Verùm si ad pus ver-  
**D** gat, quibus cataplasmatibus ac medicamentis vtendum sit, multis in lo-  
cis superius traditum est. At si calculus insisterit, fomentis vtique, & ca-  
taplasmatibus ijsdem vti oportet. calculi verò medicamentis potabilibus  
conterendi sunt, simplicibus quidem sio, & prionite (asplenum puto)  
herbis cum oleo aut aceto esculento decoctis: earum quoque succo po-  
tui dato: compositis autem ea antidoto, quæ Bistimus appellatur, & ea,  
quæ ex viperis constat, & bestia, quæ Coscinos id est Cribrum dicitur,  
& quotcunq; experientia optima esse comprobauit. Gestationes istis,  
& corporis concussiones ad mouendum propellendumque calculum  
bene faciunt: nam calculorum in vesicam transitus ingentes dolores

Q



concitatur. quod si inde exciderint, dolor tollitur, ut neque per somnium **E** dolorem sentire sibi videri soleant. quin etiam tanquam ex inevitabili bus malis animus perterritus soluitur.

### Curatio acutorum Vesicae affectum. Cap. IX.

**E**T Vesicae acuta vitia renalibus similia proueniunt, phlegmonae, & ulcera, & lapides, & grumorum obstructions: a quibus vrinæ suppressio, & stillicidium exoritur. sed in hoc membro acutior dolor est, interitusque celerrimus: vesica enim nervus latus est. At renes veluti concrementum sanguinis iecoris speciem habent: in quibus, & grauissimi, & maxime miserabiles morbi incidunt: unde mors cum **F** maximis cruciatibus miseris mortalibus ingruit. Protinus igitur ventris ea pars laxa, quam Ceneona Graeci vocant, secanda est: multoque oleo cum ruta & anetho vesica est irriganda. Si concretus sanguis doloris, impeditaque vrinæ author sit, oxymel bibere debet: aut calcis parum cum mulla, quod grummi dissoluantur: deinde quæ vrinam mouent, & herbae, & semina exhibenda. Sin ex sanguinis effusione periculum instet, absque vlla cunctatione ei magis, quam cæteris subueniendum: neque enim id leue discrimen est. Nempe medicamina sanguinem coercentia opem ferunt: opem fert autem vesicae refrigeratio, ex rosaceo & vino irrigatio, & cum lanis succidis obuolutio. Epithema **G** bonum est, palmule ex vino cum malo punico, aut succo rhois. Verum si auersatur epithemata graua, & vehementes refrigerationes, (cauendum est enim vesica natura frigida tenuisque, ne ita multum refrigeretur) eam gleucino illinito, aut acacia, aut hypocistide [ex vino. A spongijs vero, nisi valde vrgeat sanguinis eruptio, abstineto. Escæ triticeæ coctu faciles, bonum succum gignent, lotiumque educentes præbeantur, quales à me in capite de renibus comprehensæ sunt. Lac, vinum dulce theræum, aut scybellite. Medicamenta potabilia sunt, vrinaria, bene olentia, fluxilia, & id genus alia. Vtilissimum utique vesicae remedium cicadae sunt tempore suo tostæ pro cibo exhibitæ. extra tempus **H** autem aridae trita cum aqua: sed radicis nardi parum cum cicadis elixetur. in iisdem quoque loco balnei ad vesicae laxamentum æger desadat. Quod si lapillorum interpositio mictum impediat, oriculario specillo lapis amouendus est, vrinæque educenda, nisi adsit phlegmone. in phlegmonis nanque neque meatus instrumentum admittit: præterea oriculario specillo vulnerantur. At si expediri medicatio nequit, homoque doloribus consumitur, locum eum, qui sub glande est, ceruicemque vesicae incidito: ut lapis excidat, atque vrina effundatur, ac deinde potissimum medendum est ad cicatricem vulnus ducendo: sin minus, puris



**A** effluuium, quod Rhæas græce dicitur, factum esse pro futura hominis vita satius est, quam ut tormentis miserrimè cruciatus intereat.

Curatio Vuluæ suffocationis. Cap. X.

**V**ulua in mulieribus membranis extentis hinc atque inde secundum ilia continetur, ac perinde atque animal vitia in olfactu patitur. nam ad bene olentia delectationis causa se recipit, foedè olentia contristantiaque præ molestia refugit. Igitur si aliquid superius triste offeratur, vulua ad naturalia descendit: si extra, ostio naturalium apponatur; retrò sursumque recedit. nonnunquam verò in hoc aut illud

**B** latus ad lienem, aut iecur mouetur. ad recessum eius autem contractio nemque membranulæ, ut in nauibus vela, cedunt, atque consentiunt. Hæc verò illi & propter inflammationem eueniunt. Nā si eius ceruix afficitur, atque intumescit: fit prominentior. Si infundo exoritur inflammatio; sursum repit. Sin ad pedes foras vergat; turpis & immunda res est, dolores afferens & contristans, præterea difficulter ambulare potest, & in latus & supina decumbere, nisi pedes mulieris phlegmone laborent. At si ad superiora vulua recurrerit; quam ocysimè hominem strangulat, vrget autem spiritum comprimens: neque enim prius conqueri & clamare, et opem ab adstantibus petere valet, quod nonnullis,

**C** hisque pluribus respiratio, nonnullis autem vox celerius intercipitur. par est itaque eos, qui his miserijs interfunt, prius quam mulier intereat, medicum accerere. Verum si forte aliquando occurreris; cognita phlegmone venam scindito, præcipue quidem eam, quæ in malleolo: quæ si non bene fluida sit, eam, quæ in cubito est, petito: Sed à vena malleoli sanguinis missionem repetito. Alia verò omnia administrato, quæcunque strangulati & citra inflammationem subueniunt: qualia sunt manuum ac pedum vincula ad torporem usque adstringentia: foedè olentium olfactus, ut liquidæ picis, capillorum, lanæque exustorum, flammæ in lucerna extinctæ nidoris, castorei, quod præter foeditatem odoris nardos etiam refrigeratos calefacit. lotium præterea vetus vel demortui ferè corporis sensum magnoperè suscitatur, & utrum ad inferiores partes abigit. Porro medicamenta odorata naturalibus sunt imponenda: vnguentum verò lene sit & minimè tactum vellicans, nardus, aut baccharægyptium, aut vnguentum ex malabathri indicæ arboris folijs compositum, aut cum aliquo odorato vnguine tusum cinnamomum: atque his muliebres locos oblinito. Quod si ex his fusile medicamentum confletur, illud in vuluam infundito. anum quoque flatuum eductorijs inungito. per clysteres quoque non acres, sed molles, viscidos lubricosque humores indito, ut stercorea solum eiciant, sedesque vtero am-

\* Aliter  
extinctione.

Q ij



pla vacuaque remaneat. id succus althææ, fœnigræciū præstabit: fertu- E  
 lam verò, aut sampsicum cum oleo decoquito. Cæterum si maiore vi,  
 aut depulsione vulua egeat; tunc validæ mulieris aut viri benè tenacis  
 manibus hypochondrium comprimatur, aut fascijs adstringentibus  
 succingatur: quò in angustum locus redigatur, neque iterum sursum  
 versus vulua procurrat. Item naribus apprehensis sternutamenta citen-  
 tur: quibusdam enim sternutamento & cõtentione vulua in propriam  
 sedem redire potest. in nares autem puluis inspiretur ex radice lanarię,  
 aut piperis, aut castoris. Item leues cucurbitulæ in feminibus, ilibus, co-  
 xis, inguinibus attrahendæ vuluæ causâ defigantur. amplius & dorso  
 inter scapulas strangulatu subueniens admoueto. Sin à phlegmone F  
 strangulatus proveniat; vena ad pubem veniens scindenda est, mul-  
 tumque sanguinis fundendum. Item faciei frictiones, capillorum euul-  
 siones, vt mulier ad se redeat, simul benè facient. At si vel parum tole-  
 rare poterit; in decocto aromatum desidat, odoratisque suffumigetur.  
 Ante cibos castorei paulum bibat, & hieræ paulū cum castoreo. Quòd  
 si ferre valet; lauetur, & in tempore ad antiquos vsus reuertatur: detq;  
 operam mulier, vt quàm facillimè menses elabantur.

## Curatio Satyriasis.

## Cap. XI.

**N**eruorum in virilibus inflammatio penis tentiginem facit cum G  
 appetitu contristationeque in actu venereo. fiunt autem disten-  
 siones neruorum cõuulsioni persimiles, nunquam mitigabiles. Quin  
 & ipso concubitu sedari non potest ista calamitas. Mentis quoque alie-  
 natio sequitur. nam primum quidē impudentes euadunt, dum casum  
 suum licentiosè narrat: audaces enim eos coeundi infatietas efficit. Po-  
 stea verò cū affectus iste desierit; tunc ad se redeunt, & mente opti-  
 mē constant. Igitur omnium horum causâ venam in cubito & in talo  
 aperias, & multum cruoris, ac sæpe detrahas. neque enim id temporis  
 intempestium fuerit & ad mentis stupefactionem, et ad inflammatio-  
 nis remissionem, & ad caloris virilium mitigationem faciendam, ani-  
 mæ deliquium afferre. quippe sanguis multus calorem & audaciam H  
 valde accendit, inflammationem alit, mentis perturbationem confu-  
 sionemq; veluti esca ignem procreat. Omne corpus etiam medicamē-  
 to, quod Hieram, id est, sacram vocant, purgato: neque enim purgatio  
 ne solum egent, sed etiam leni medicatione: vtrunque autem præstare  
 hiera potest. Insuper genitalia, & lumbos, & locos inter femina & in-  
 guina (Plechada græci vocant) & locum inter anum & scrotum (Peri-  
 næos græce dicitur) & testiculos lanis ab oue detonsis adhuc sordenti-  
 bus obuoluito. sed lanas rosaceo ac vino perfundito: partesq; istas mul-



- A** ta irrigatione madefacito, ne ab lanis caliditas oriatur: immo natiuus calor à frigida humorum potestate obtundatur. Eiusmodi quoq; cataplasmata superdanda, panis cum plantaginis herbae succo, & solano, et feride, & papaueris folijs, idque genus alijs, quæcunque torporem, frigoraque iniiciunt. necnon & similibus virilia & locos inter inguina & femina, & coxas illinito cicuta ex aqua, vel vino, vel aceto: item mandragora, aut acacia, & spongijs vice lanarum vtitor. Interea subluenda alius est malua decocto, & oleo, & melle: omnia verò acria vitentur. Defigantur in coxa cucurbitulae, aut in abdomine Optimæ sunt autē & hirudines ad sanguinem deorsum attrahendū. Et super vulnera cataplasma imponatur mica panis cum althæa. Postea in aqua desidat, vbi artemisia, saluia, conyzaq; decoctæ sint. At si longiori tempore vitium extrahatur, neque multitudo secundum proportionem minuta fuerit, et neruorum conuulsionis metus adest, (nam facile in his affectibus conuelluntur;) curandi rationem mutare opus est. quippe caleficientia ad mouēda sunt, gleucinum scilicet oleum, aut ficyonium pro rosaceo. lanis autem mundis & cataplasmatibus tepesfacientibus partes illæ contegende: quandoquidem neruorum inflationes nonnunquam huiusmodi curatio mitigauit. amplius & castoreum cum mulsa bibitum. Cibaria parūm nutrientia frigidaque sunt: paucæ triticea: plurima olera, malua, bliton, lactuca, cucurbita elixa, cucumis maturus elixus, pepo suo tempore collectus. A vino, et carnibus, lōgo temporis intervallo abstinetō: siquidem vinum est neruorum calefactio, anime remollitio, voluptatis reuocatio, geniturae creatio, venerisq; excitatio. Hæc à me in acutos morbos remedia scripta sint. Oportet autem & iuuenem medicum ipsum suo Marte aliqua si bi cōparare: neq; omnia ex alienis commentarijs depromere. Hoc sanè pacto acuta vitia fiūt, vt ordine singulis, quæ scripta sunt, aut omnibus vti valeas.

**D**



# ARETAEI CAPPADOCIS

## DIVTVERNORVM MOR- BORVM CVRATIVVS.

### Liber primus.

Prooemium.	Cap. I.
Curatio Cephalææ.	Cap. II.
Curatio Vertiginosorum.	Cap. III.
Curatio Morbi comitialis.	Cap. IIII.
Curatio Melancholicæ.	Cap. V.
Curatio Phthisis seu vlcerum pulmonis.	Cap. VIII.
Curatio Vlcerum iecoris, & effusionis puris.	Cap. XIII.
Curatio Lienis.	Cap. XV.

Cætera capita desiderantur numero octo, vide primum librum  
de signis & causis longorum morborum,

### Prooemium.

### Cap. I.



N longinquis morbis dilatio medelæ mala est: nam ob cunctationem in vitia insanabilia prolabuntur. Inflatio E sanè ita habet, vt non facile recedat, si semel inuaserit: at si & diutius trahitur, temporis spatio vires acquirit: & nonnunquam euenit, vt commoriatur. Exiguos quoq; morbos maiores excipiunt: cumq; priores discrimine vacarent, eorum soboles perniciofa exoritur. Itaque nullo pacto ægrotum filere conuenit, ne morbus deprehendatur, erubescens: neque aufugere, vim curationis metuentem: neque medicum pigrum esse, ignauumq; oportet: vtrunq; enim ad morbum insanabilem efficiendum consentit. Nonnulli autem sunt ægroti, qui præsentium, necnon & futurorum ignoratione ad finem vsque cum morbo degunt. Nam plerique neq; F pereunt, neque futuram mortem suspicantur: quocirca neque se medici fidei committunt. Horum probatio ex cephalæa colligitur: de qua prius sermonem instituam.

### Curatio Cephalææ.

### Cap. II.

C Aput quanto ad vitam magis necessarium est, tanto difficiliore ægritudine laborat. Atque morborum capitis inuasio quidem tolerabilis est: nam parum dolent, aures sonant, grauitas adest: at si intendantur, finis est mortiferus. Igitur exiguos dolores ne spernito: nam



- A** & exiguis medicamentis in quibusdam discussi sunt. Si plus temporis extrahuntur; maiores cruciatus superueniunt. propterea vena cubiti incidenda est: sed duobus ante diebus vinum bibat. tantum autem sanguinis detrahito, quantum eius vires tibi coniectanti ostenderint. verum non semel totum detrahere magnopere expedit. porro quorum vires copiosam sanguinis detractionem patiuntur, his ipsis continuo morbus discutitur: atque id omnibus longis ægritudinibus conuenit. Tribus autē quatuorue diebus interiectis liberalius alendi sunt. Deinceps purgatorium, hieram quod vocant, cum mulsā propinandum: ea enim à capite morbi alimentum maximè abducit. modus verò medicinalis quatuor aut quinque drachmarum pondo esto. Quod si bene purgauerit, tunc lauandus est, & vinum exhibendum, & vires augenda. Postea iterum vena frontis recta scindenda est: hæc enim est opportunissima sanguinis detractio. modus autem esto hemina, aut paulò plus. neque vltra sanguinem mittito, quoniam vasa inanire non expedit. Deinde capillis nouacula detractis cucurbitulam priorem vertici affigito, alteram inter scapulas citra sanguinis effusionem admoueto: et eam, quæ in vertice fixa est, liberius scarificato: quò sanguis vberius attrahatur, & partes profundiores incidantur. remedia nanque ad ossa vsque penetrantia cephalæam iuuant. Quod si vulnera cicatricem ducant, arteriæ secantur: duplices autem sunt, aliquæ post aures paulò vltcrius, proprijsq; motionibus produntur: aliæ verò aurium arteriæ prorsum versus sitæ sunt auribus proximæ: nam instrumento, quod Antitrochon græci nominant, adducuntur. verum hæc quoque proprijs pulsationibus innotescunt. nempe maiores ossibus vicinæ secantur: hæc nanque vtilitatem afferunt. adiacent & aliæ singulis auribus oppidò tenues, quas incidere prorsus inutile est. modum verò incidendi in libris De manuū operationibus exposui. Cæterum post medelam in cephalæa, morbo comitiali, & vertigine, vtque semel dicam, in omnibus capitij vitijs (prius ventre, aut purgatorio, quod deuoretur, aut clysteri, euacuato) pituita euocanda est modo è naribus per sternutatoria, modo ex ore per ducentia pituitam. Species autem sternutamenta citantium sunt piper, radix herbæ lanariæ, fibri testiculus. hæc quidem sunt vulgata & communia. ad læuorem autem terito, & cribrato, & calamo aut crassiore pennæ anserinæ caule inspirato. His efficacius in attrahendo violentiusq; euphorbium est cum aliquo ipsorum admixtum. Quin etiam cum oleis miscetur gleucino scilicet, aut sicyonio, id est, ex cucumere syluatico, aut cum vnguento ex styrace: redditur autem magnopere liquidum, vt fusile sit. infunditur per nasi fistulam: hæc verò geminæ sunt, atque, ab vno canali cognatæ & cohærentes adeo, vt



semel vtrisque infundendum sit. neque enim tolerabilis est alterutrius **E**  
 naris sigillatim dilatatio. nam protinus caput accenditur, & acerbus  
 dolor inuadit. Quæ autem per os pituitam eliciunt, hæc sunt: sinapis,  
 granum cnidium, piper, vua taminia: id præstat vel mixta, vel singula.  
 Cæterum quoniam & ipsa mandere, & expuere assiduum est: iccirco  
 & cum aqua, aut mulsâ, aut posca permixta danda sunt: atque os eluen-  
 dum. ad tonsillas enim impulsio humore extentoq; collo expirationis  
 flatu abluatur. Posteaquàm pituitam, quantam libet, eduxeris, permul-  
 ta aqua calida lauandum caput, atque perfundendum: vt perspirabile  
 atque diffilabile reddatur: ingentes enim obstructions fiunt. Coena fru-  
 galis & simplex esto: in qua & vinum ad stomachi restitutionem suma-  
 tur, siquidè & ipse magno dolore vexatur. Interea verò vbi vires ægri  
 stabilieris, lotionem per clysterem vsitata opus est: in qua nitri multum  
 inspergatur, aut resinæ à terebintho arbore pondo drachmæ duæ eli-  
 quentur. postridie sanguis è nasi interioribus detrahatur: intro enim  
 prælongum instrumentum immittitur, quod Cateiadion vocant, aut  
 illud, cui Storyne nomen est. aut si quis horum copiam non habuerit;  
 pennæ anserinæ caulem crassiore sumere debet, eiusque neruosam  
 partem denticulatim instar ferræ incidere, atque sic in nares vsque ad  
 ossa, quæ ob cribri seu colatorij similitudinē Ethmoeide vocantur, im-  
 mittere: deinde vtraque manu agitare, quò locus à dentibus insculpa-  
 tur, ac vulneretur. Facilis est autem ac copiosus sanguinis cursus: nam **G**  
 graciles venæ hîc desinunt, corporaque hac in parte mollia sunt, & se-  
 ctioni habilia. verum & multos nares vulnerandi modos vulgus no-  
 uit, herbas scilicet asperas, & arida lauri folia naribus imponentes, aut  
 digitis eas fortiter agitantes. cum verò quantum satis sit, euacuaueris,  
 quod erit hemine dimidium; coercendus sanguis est spongijs & posca.  
 aut aliquod aridum, quod sistendi sanguinis vim habeat, naribus inspi-  
 randum, galla, aut scissile alumen, aut balaustium. Verumenimverò  
 post hæc remedia siue dolor capitis perseueret, siue desinat; oportet ad  
 finem huius medicationis peruenire. quoniam id malum sæpe reuerti  
 solet, & in suo vigore consistens plerunque delitescit. Itaque nouacula **H**  
 derafis capillis, (quâdoquidem & hoc capiti prodest,) ferramentis can-  
 dentibus vrendum est: si in superficie, ad musculos vsque peruenias: sin  
 osse tenus penetrare velis, à musculis caueo. nam musculi exusti ner-  
 uorum distentiones cient. quòd si in summa cute vsferis, vinum odora-  
 tum album cum rosaceo infundere satis est: Pittarium verò malefa-  
 ctum per triduum supra crustas extendito. quòd si crustæ altius descen-  
 dant; porri comam cum sale tritam, linteoloque illitam super dato.  
 Tercio die crustis summam cutim tantum occupantibus ceratum ex  
 rosa



- A** rosa: profundioribus autem lentem ex melle imponito. Sed quæ medicamenta cicatrici ducendæ sint, alio loco descripsimus. Nonnulli super frontem ea in parte, ubi futura est, quæ Corona dicitur; cutim ostentenus inciderunt: illudque aut exterentes, aut excidentes usque ad meditullium (quam greci Diploen nominant) ad carnis repletionem perduxerunt. Alij & ossa ad membranam usque perforarunt. Verum id genus remedia temeraria sunt: nihilominus tamen adhibentur, si omnibus alijs tentatis adhuc cephalæa perseverat, & æger est animosus, vel corporis robur excellit. Nempe si paulatim ad sanitatem accessio fiat, exercitationes recto corpore pectori humerisque adhibeantur, manuum fiat gesticulatio, alteres iaciantur, saltu corpus moueatur, atque in his perite corpus torqueatur. primo & postremo crura fricentur, medio tempore caput. picatio assidue picem inspergendo administretur, item caput rubrificandum nonnunquam sinapi cum duplo pane affricando, ne intolerabilis ignis excitetur: nonnunquam medicamenta simul illinendo, quale est illud, quod ex adarce, & euphorbio, & pyrethro componitur. proficit autem & ad dolorem in tempore sedandum, & ad radicem mali extirpandam thapsiæ succus, & medicamina cum ipsa iungenda: quotcunque cutim tumefaciunt, & varis similia tubercula excitant. Vicius ratio in singulis dolorum generibus tenuis esto: exiguus
- C** potus, & aquæ potio ante ullam medelam potissimum adhibeatur: ex toto verò ab acribus temperet, cepis, alijs, et succo laserpitij. à sinapi autem non penitus: siquidem eius acrimonia, præterquam quod stomachi vim roborat, capiti quoque haud ingrata est; pituitam fundens ac diffilans, aut ad inferiora deturbans. Leguminum pessima faba est, & eius species pisæ, & quæ à grecis ochri, & dolichi nuncupantur: illi cicercule folio similes, hi faseoli aut lobi à nonnullis vocitati. secundo loco ponitur lens: quæ nonnullis concoctionis excretionisque virtutibus prædita est: sed caput replet, doloremque concitat: nihilominus cum pipere elixa spernenda non est. Far lotum haud ingratum est cum vino & melle, quantum ad condimentum satis sit: & ex ipso conflata sorbitio, & eius semina in simplici iusculo decocta. utique bona sunt & in condimento, quod greci Caryceam vocant, semina cari, coriandri, anesiapij verò semen ijs anteferendum. mentha herba, & pulegiū præterquam quod bene olent, quandam vim habent, & urinam mouendi, & flatus per inferiora expellendi. Inter carnes vetustæ omnes damnantur: nuper interfecti galli carnes laudantur. Inter aues torquatus palumbus, columbus, & aliæ quęcunque haud ita multum pingues sunt, suum extremitates, lepus assatus. Bubula ouillaque caro crassum succum creat, & caput replet. Hædus non penitus malus. Lac & caseus ca



\* Aliter  
præter.

put dolore vexant. Ex piscibus saxatiles deligēdi, & quotquot in ea regione optimi censentur. Olera elixa quidem ea assuuantur, quæ lotiū & ventrem citant, malua, blitum, beta, asparagi, acris verò & brassica est. At inter cruda lactuca omniū est optima. Radices autē etiam elixæ prauæ sunt. radiculæ, rapæ, pastinacæ urinā mouent, sed caput explent. fīsarum flatus edit, & ventriculum tumefacit. Vinum album tenue dulce admittatur, tantum adstrictionis habens, quod aluum nō remoretur. Omnia bellaria capiti inimica. quā et palmularū omne genus. ficus autem & vua demulcent, & quicquid ea parte anni, quam Horā græci vocant, bonitate præstat. sed quibuscunque vel etiam iuuantibus satari malum est. peior est cruditas: labores minus, quā cruditas nocet: nihilominus & ipsi sunt detrimentosi. Deambulationes matutine aluo prius exonerata citra spiritus difficultatem benè feruntur optimè sunt etiam & à cœna. gestatio longa per loca non ventosa conueniet: atque vbi sol caput non feriat: ei nanque sirius officit. Vfus veneris capiti ac neruis labem accersit. Peregrè proficiscatur egrotus in regiones calidiores ex frigidioribus, & in ficciores ab humidioribus. Cōfert & nauigatio, et in mari vitæ traductio. & si quis sit maris accola, in salsa aqua frigida lauari, & in mari natari, & in arena volutari, victumque ex mari quærere proderit. Doloris verò capitis, quē Eterocraniam græci nominant, eadem medicamina sunt: nam quæ toti capiti remedia conducunt, eadem singulis eius partibus adhibere, bonū est. Quibuscunque verò per hæc morbus depulsus non fuerit, ijs reliquum est, vt veratro vtantur, vtpote vltimo atque valentissimo omnium remedio.

### Curatio Vertiginosorum.

### Cap. III.

**E**T succedit cephalææ vertigo, & ipsa per se proprijs de causis oritur, si profluuium ab hæmorrhoidibus coercetur, si è naribus sanguis non effluat, qui prius effluere consueuerat, si corpus non diffletur aut sudore, aut labore antea fatigatum. Igitur si ab cephalæa ducit originem; ea medendi ratione vti debemus, quæ ad cephalæam supra exposita est. quibus autem violentius cum vltimis remedijs occurrendū fit, posterius explicabo. Sin ab aliqua humorum suppressione morbus inciderit, vsitata excretio mouenda est. naturæ nanque salutare est materię recursus. At si ista tardat, malum verò increscit; in alijs quidem suppressionibus aut sanguinis è naribus manare assueti, aut sudorum, sanguis mittendus est è vena cubiti: Sin ab iccore multis humoribus affluente, aut à liene, aut ab aliquo ex visceribus in medio corpore positis, vertigo prodeat, cucurbitulæ subueniūt. Sed quantum ex vena defluit, tantundem per has sanguinis est detrahendum. sanguis enim est causæ



**A** alimentum:quemadmodum & ventriculus. Deinceps capitis remedia subiungenda, vena cubiti recta, aut nasi arteriæ vtrique in angulis secande: cucurbitula vertici affigenda: caput radendum, rubrumque faciendum: pituita è naribus per sternutatoria, aut ex ore, quemadmodum docui, euacuanda: omnia denique modo in cephalæa narrato administranda. duntaxat adiicitur cyclamini succus, aut anagallidis in nares fundendus. Posteaquàm verò medicaminum capitis ad finem perueneris; deinde quotquot efficaciora ad vertiginosos inueniuntur, ea sunt adhibenda. Vomitus à cœna, necnō vomitus ab esu radicalium vti postea decet: quin etiam ad veratri assumptionem hæc præparatio fuerit. nam præexercendus est stomachus, cum vehementioribus vomitorijs vti volumus. Pituita quoq; impræsentia magis attenuatur, & ad veratrum benè funditur. Veratri exhibēdi modi plures sunt, vt validioribus quidem succurrat, ad magnitudinem amē, idest placentulæ, aut paulo crassius est incidendum: & cum fare loto, aut lente assumitur pondo drachmę duę. imbecillioribus autem & gracilioribus decoctum cum melle propinatur. duarum aut trium mystillarum modus esto. quis verò sit faciendi modus, alio loco declarabitur. Inter singula autem remedia æger cibis reficiendus est: quò ea, quæ interim incidunt, sustinere valeat. In accessionibus quoque sic opitulandum est,

**C** deliganda sunt crura supra talos & genua, & manus brachialia, brachiaque infra humeros propè cubita. ad caput irrigandum facit rosaceum cum aceto. oleo verò incoquito serpyllum, aut spondylium, aut hederam, aut id genus alia. fricentur extrema, & facies. olfaciat acetū, pulegium, mentham, aliaque eiusmodi ex aceto. inter dentes aliquid apertionis causā imponatur. nonnunquam enim maxillæ colliduntur & cohærescunt. in tonsillis fiat titillatio: vomitus citetur. nam interdum reiecta pituita æger à tenebris excitatur. Hactenus ad accessionis leuamen & tenebrarum discursionem dictum sit. At de vniuersa victus ratione tam in curando, quàm post curationem hæc nostra sententia est.

**D** Somnus multus eque, atque insomnietas inimica sunt: multus enim somnus stuporem capitis sensibus inijcit: vaporum exuberantia torpet omnis actio. Hi planè grauitatis, et sonorum in auribus, et splendorem quorundam oculis obuersantium causæ, morbi verò indicia sunt. vigilia verò cruditatem facit, alimentum subtrahit, laborem affert, corpus contristat, mentem labefacit: propterea facile furere, atq; atra bile vexari isti consuerunt. Mediocris autem somnus ad alimenti distributionem, & ad laborum diurnorum leuationem utilis est. Aluo ad excretionem consulendum: nam distillationis causā potior alijs est. Iterum crurum frictio per aspera linteola vsque ad ruborem, deinde

R ij



dorſi & laterum, poſtremò capitis adhibenda. ab his ambulationes cir **E**  
 ca initia & finem leniores, mediæ verò aciores. Quies conſiſtentia ſpi  
 ritus poſt ambulationes eſto. Vocē leniter exercere oportet, grauibus  
 vocibus vtentem ſonum ædere. acutæ nanque voces capitis diſtentio  
 nes, temporum palpitaciones, cerebri pulſationes, oculorum inflatio  
 nes, auriumque tinnitus efficiunt. mediocriter acuta vox edita capiti  
 prodeſt. Poſtea verò geſtationis tempus adeſt ad diſſilandam totam ca  
 pitis grauitatem opportuna. longa ſit autem, verum citra fatigationē,  
 neque in tortuoſis regionis tramitibus, neque aſſiduis itineris flexibus  
 geſtatio fiat: quoniam ſic vertigines oboriuntur. ſed rectæ & longæ &  
 lenes ac ſuperioribus locis geſtationes fiant. Siquidem ita aſſueti ſint;  
 optimum panem ſolum aſſumant, quantus exercitationibus impedi **F**  
 mento ne ſit. prius enim concoctum eſſe oportet. caput & manus exer  
 cendæ, horumque frictions faciendæ. In his verò leniter agendum: vt  
 caliditas excitetur, & caro augeatur, & vires reſtituantur. poſtea ſuum  
 ipſius caput erectum fricato diutius hunc laborem ſuſtinens. Quin &  
 exercitationes ad ceruicis uſus, & ad manuum agilitatem faciunt, ſi  
 ſcienter fiant. ſuſum attollendo caput atque oculos exercere oportet.  
 Manuum exercitatio ſit, aut diſcorum iactu, aut certo cęſtibus, aut  
 pugnis. pila verò parua & magna detrimento eſt. nam capitis & oculo  
 rum circumuolutiones atque intentiones vertigines afferunt. optime  
 faciunt ſaltus & curſus. omnia velocia exercitia cruribus conueniunt, **G**  
 & omnia roborant. Frigida lauatio illuue, illuues autem calida lau  
 atione melior. aſtringere, denſare, ficcare caput frigida lauatio efficacif  
 ſimè poteſt: & hic ſalubris ſtatus eſt. humectare, ſoluere, tenebras offun  
 dere valentiſſimè calida lauatio poteſt: & hæ capitis morborum cauſæ  
 ſunt. tales ſunt & auſtri auditui graues. exercitationibus quies ſucce  
 dat, vt perturbationem ſedet. Capitis preſſiones ad cutim poliēdam fa  
 ciunt. Aquæ, aut aquati vini propinatio eſt res optima & ad manum.  
 coma olerum aſſumatur, quæ ventrem molliunt, maluæ, betæ, bliti. Li  
 quamen bonum ſtomacho, ori ſuaue, aluum leniens, neque graue capi  
 ti, ex thymo, aut thymbra, aut ſinapi cōficitur. Oua hyeme calida, eſta **H**  
 te frigida, putamine ſpoliata, nō toſta præbeantur. Oliuæ, palmulæ, ſal  
 famentum rectè conditum. Alica elota cum aliquo dulci, quantum cō  
 diendi cauſa aſſumi debet. Poſt hæc ſal adhibendus. Ocium & quies ab  
 audiendo & loquendo. ambulationibus vtatur ſub aere perſpirabili. de  
 lectat autem locus aut arboribus cōſitus, aut herbidus. Vtique vertigi  
 noſus cū ad cœnam accedit, maximè iterum in frigida lauatur, parū  
 vnguine corpus ſublinens: ſi nolit, at crura tantum. cœna triticea eſto,  
 quale eſt Itrion, quod eſt placenta genus, aut ſorbitio ex alica, aut ptiſa



**A**na flatu vacans, per elixationem concoctu facilis. Medicamenta verò suauiorem ptisanam reddētia sunt piper, pulegium, mentha, cepæ aut porri paulum, neque tantum, vt innatet. acetum verò acre vtiliter assu-  
**B**mit. Carnes ex pinguibus animalibus non pingues, suum pedes & capi-  
 ta. Volatilia omnia, sed multitudinem cōiectura metiri oportet. lepus  
 & venatio. gallina in promptu habetur, & iuuat. Omnia bellaria caput  
 dolore infestant præter palmulas aut maturas ficus, aut vuas. si flaribus  
 homo vacet, hæc benefacient. In secundis quoque mensis vtiliter ea su-  
 muntur, quæ facile concoquuntur, si nidore vacant, & leuia sunt. Po-  
 stea deambulatio, mentis hilaratio, in quiete ad somnum conuersio

adhibenda.

### Curatio morbi comitalis. Cap. IIII.

**I**ngentibus medicamentis atque valentissimis in morbo comitali  
 opus est. nam quoties eius in mentem venit, non modo laboriosum  
 malum, & periculi plenum; sed etiam generis morbi fœditatem, & ca-  
 lamitatis opprobrium exhorremus. atque ita existimo, si se mutuo in  
 accessionibus spectantes ægroti, quæcunque patiuntur, cernerent; non  
 ultra vitam ducere tolerarent. verum quæ singulis atrocia fœdaque in-  
 sunt, sensus priuatio, intuendique sublata facultas abscondit. Cæterum  
**C**medendi rationem naturæ facilitatem sequi optimum est: quando per  
 ætatis mutationes in longe melius hominem permutat. Quoniam si  
 vñtatus malo victus, in quo morbus alitur, defierit, non vltius homi-  
 nem infestat. simul enim cum priore victus specie morbus recedit. Igi-  
 tur si caput occupauit, inhabitat. quocirca omnia quæ à nobis in capite  
 De cephalæa relata sunt, facere necesse est: detrahendo sanguine, & cor-  
 pore purgando. Venæ autem & quæ in cubito, & frontis recta secandæ  
 sunt: cucurbitula admouenda. nō est autem vsque ad animi deliquium  
 sanguis detrahendus: ciet enim morbum deliquium animæ. Arteriæ  
 omnes, & ante, & post aures incidendæ. inter hæc omnia excellens pur-  
**D**gatio facienda purgatorio, quam hieram vocant, atque his, quæ è capi-  
 te pituitam eliciunt: sed multo valentiora sint medicamenta: siquidem  
 istorum habitus est dolorum patiens. Hilaritas verò & bona spes id ge-  
 nus ægros miseros reddit. Opus est etiam ignem capiti inferre: proficit  
 enim. In primis os perforare vsq; ad secundam laminam oportet: dein-  
 de ceratis cataplasmatisque vti tantisper, donec membrana ab ossibus  
 recesserit. Terebra nuda ossa circuncidere conuenit: ac si paulum resi-  
 stant, vsque ad spontinam auulsionem perseuerandum, quousq; nigra  
 nonnunquam istorum, & crassa membrana inuenta fuerit. Cumq; per  
 putrefactionem vel etiam purgationem audacter curante medico vul



neri cicatrix inducta fuerit; agrotus morbum euasit. Maxime omnium **E**  
 capitis ad ruborem usque frictiones valent usitatae quidem, quaecunque  
 à me superius traditae sunt: valentior est autem, quae fit per cantharides.  
 sed tribus diebus ante, quam his utamur; lac, ut vesica muniatur, bibe-  
 dum est: cantharides enim magnopere vesicam ledunt. Hec abunde sunt,  
 cum caput affectum est. At si mediae corporis partes causam praebent,  
 & ab his morbus exoritur: rarissime autem ista fiunt: potius enim me-  
 diae partes in consensu morbi trahuntur à capite, utpote ab ingenti ma-  
 lo, quod aegritudinis initium est: utcunque igitur res habeat, & in his  
 vena cubiti soluenda est: à visceribus enim materiae cursus est. Quin  
 etiam isti magis, quam alij, purgandi sunt & hiera, & cneoro, quae thy- **F**  
 melaeam vocant, & coccognidio, quae chamelæa dicitur: hæc enim pi-  
 tuitam extrahunt. peropportunum autem ipsis remedium est cucurbi-  
 tula. epithematum vero & cataplasmatum sylvia omnibus perspecta  
 est, & ea ubique scribere superuacuum ducimus: nisi quatenus eorum  
 vim nosse conueniat: quod scilicet ijs extenuare, per halitus digerere,  
 fluxa spirabiliaque corpora reddere oporteat: item concoquentibus me-  
 dicamentis calidis, aridisque, & urinam mouentibus in nutritione, &  
 in medicatione utendum: sed omnibus praestat fibri testiculus sepius in  
 mense ex aqua mulsa potus. praeterea quaecunque ex varijs composita  
 medicamenta idem praestant, adhibenda sunt, ex viperis composita an- **G**  
 tidotus, & mithridatica ex pluribus constans, nec non & Bytini anti-  
 dotus bibenda est: quandoquidem hæ concoquendi facultatem robo-  
 rant, vtilis humores creant, & urinæ mouendae aptae sunt. nam quae-  
 cunque simplicia medicamenta scribere opus esset, hisce continentur  
 antidotis, cinnamomum, casia, folia malabathri, piperis, fefelisque om-  
 nia genera. & quod nam ex valentissimis remedijs in istis compositis  
 non reperies. Fama est & vulturis cerebrum, & crudae fulicae cor, & do-  
 mesticos feles comesos morbum discutere. At ego istorum periculum  
 non feci. nonnullos autem vidi nuper iugulati hominis vulnere fialam  
 subijcientes, atque inde haustum cruorem bibentes. O ingentem neces- **H**  
 sitatem, quempiam sustinere, malum malo piaculo depellere: atqui ex  
 ea ad sanitatem nec ne isti peruenierint, nemo verè mihi affirmare po-  
 test. Quin & quendam autorem legi, qui humanum iecur epulandum  
 apponi precipiebat. sed hæc illis scripta sunt, qui ad hunc usque mise-  
 ria terminum peruenierunt. Praeterea & victu opitulandum est, & sin-  
 gulis remedijs, quae aut ab alijs, aut ab ipsomet agro fieri possunt. utique  
 in hoc casu nihil spernendum est, nihilque temerè faciendum, maxime  
 quaelibet exigua adhibendo, quae penitus profint, nihil verò lædant.  
 Etenim spectacula non spectanda, & sermones, & edulia, & suffimen-



- A**ta plurima morbum patefaciunt. Igitur omnia diligenter consideranda sunt. Somnus multus crassitudo est, ocium nebula sensuū, bonum verò mediocritas. Alui excretio à somno, præcipue flatuum ac pituitæ res optima. Ambulationes longè commodæ sunt, nō flexuosæ bonum spiritum reddunt, sub arboribus myrto, aut lauro, aut inter acres & benè olentes herbas calamentum, pulegium, thymum, mentham, maximè quidem agrestes & sponte nascentes: sin harum copiam non habeat, inter humano cultu procreatas. Inter has quoque gestationes longæ, & ipsæ rectæ fiant. Itinera facere bonum est non secundum fluuiū, ne delabentem aquam intueatur: vertiginem enim aquæ fluxus affert.
- B**neque vllum, qui in orbem voluatur, neque turbinem, qui circum agatur, inspiciat. est enim imbecillior, quàm vt firmum stabiliat spiritum: nam simul cum circulo vertitur: circumuolutio autem vertiginem, et comitalem morbum accersit. Post gestationem lenis deambulatio, postea quies: vt agitatio in gestatione contracta sedetur. Ad hæc exercitationes manuum fiant extremis sudario ex crudis linis confecto intolutis: inunctio non valde pinguis sit: frictio lenta quidem, sed durior densandi causa: tumidi enim & crassi sunt plurimi. in medio verò totius frictionis caput erectum perfricetur. Exercitationes ad ceruices & humeros pertinentes, manuum commotio: omnia, quæcunque à me
- C**de vertiginosis dicta sunt administrentur. satis verò hic ex copia ibi descripta positum est: præterquàm quòd velociore horum exercitationes esse oportet ad sudorem mouendum, caloremq; excitandum: hæc enim omnia extenuant. Verum & in omni vita oportet excandescentiam iracundia vacantem inijcere. Alimenta omnia ex crassis leguminibus mala: triticeï verò panes sicciore præbendi: alica elota, & ex ea forbitiones. sed medicamenta voluptatis causa eadem cum supra positis sunt: nunc autem plura ex acrioribus ponito piper, zingiber, libyficum. Liquamina verò ex aceto & cumino & fnaui sunt & vtilia. A carnibus quidem maximè in totum abstineant, sin minus, in curatione saltem: in refectione verò carnes deligantur, quæcunque sunt natura leues: quales sunt volatiliū, præter anatem, & concoctu faciles, vt lepores, suum pedes, fassamentum. & post hæc sitis utilis est. Vini paulum bibatur albi tenuis odorati quod lotium mouet. Elixorū olerum assumantur quæcunq; facultate acria extenuant, et vrinam citant: qualis est brassica, asparagus, vrtica: crudorum autem lactuca ea parte estatis, quam horam græci medici nominant. Cucumeres autem & pepon viro quidem robusto superuacua, nonnullis verò gustatione tenus præbenda. mala est enim horum multitudo, cum frigida sint, atque humida. Fici viridis & maturæ vix vsus conuenit. Ambulationes, post eas



animi oblectatio molestia carens iuuat. iracundia utique & **ven**us no- **E**  
 xia sunt. Effectus enim morbi similitudinem adducit. At nonnulli me-  
 dici de concubitu falluntur. Nam quoniam naturalis in virum transi-  
 tus aliquantum proficit, puerorū naturā in tempestiuo concubitu vio-  
 larunt, tanquam citius eos roboraturi. sed isti à natura sponte præfinitum  
 tempus, in quo omnia remedia fiunt, ignorant. Hæc enim singu-  
 lis ætatibus propria simul opportunis temporibus creat. in tempore  
 nanque concoctiones feminis, barbe, canorum. Quis igitur medicus  
 naturæ cum mutationem seminum à principio, tum præfinitum singu-  
 lis tempus variauerit. Quin & in morbi naturam impegerūt: nondum  
 enim in tempore quidam veneri dare operam cœperunt, ante immatu- **F**  
 ritate rei noxam accipientes. vitam autē degere oportet in regionibus  
 calidis & siccis. siquidem res frigida atque humida morbus est.

### Curatio Melancholiæ. Cap. V.

**N** Vm sanguinem detrahare expediat, deliberatione indiget in  
 melancholicis. ex quo humore morbus oritur: quin etiam ex  
 non pauca malorum succorum (Cacochymiam græci nominant,) mul-  
 titudine. Itaque si in iuuenili ætate quis morbo corripitur, & veris tem-  
 pore; vena in dextro cubito media cadenda est: ut à iecore sit opportu-  
 num effluuium. id enim viscus sanguinis fons est, & bilis generatio. **G**  
 vtrunq; verò melancholiæ alimentum. cadenda est, inquam, licet sint  
 graciles & sanguinis inopes: sed paulum sanguinis mittendum; quate-  
 nus videlicet venæ sectionem vires sentiant, sed nullam noxam earum  
 tenor accipiat. Nam & si crassus, & biliosus, & concretus, & ater, qua-  
 lis amurca, sanguis est; nihilominus ipse naturæ præhumi est atque ali-  
 mentum. Quocirca si plus, quàm decet, sanguinis effuderis; natura ci-  
 bi penuria de propria sede prolabitur. At si sanguine refertus est ager;  
 plerunque quidem non vsque adeo malus sanguis est, vena tamē utiq;  
 secanda est. verum non eodem die, sed alijs diebus repetendo, quan-  
 tum satis est, sanguinis, detrahatur: eodem verò die modum sanguinis **H**  
 sustinere valeat, liberalius nutriatur. Opus est autem & ventriculo ipsi  
 quoque agrotanti & laboranti opitulari. eum verò si atra bilis vrget;  
 per diem vnum prius tenuiter nutrito agro nigri veratri pondo drach-  
 mæ duæ ex aqua mulsa præbeantur. id enim bilem atram expurgat:  
 necnon & thymi attici coma & ipsa bilem atram educit. commodissi-  
 mum est autem singulorum partem, ut ex utroque duarum drachma-  
 rum pondo fiat, exhibere. post purgationem lauetur, viniq; paulum  
 bibat, & alia in cibis iucunditas concedatur. stomacho enim ac viribus  
 laboriosa



- A** laboriosa purgatio est. posthac iterum ad media faciendus transitus. cum prius verò cataplasmate atq; irrigatione laxaueris; cucurbitulam iecori & ventriculo, aut eius ori admou eas. nanque hæc detractio multo, quàm sectio venæ est opportunior. tergis quoque inter scapulas cucurbitulam affigito: siquidem eo loco stomachus adhærescit. Deinde rursus reficiendus æger. Atque si alimentum vires instaurauerit; caput radendum: cui postea cucurbitula affigenda est. huius enim morbi inter alios prima ac maxima causa in capite est. Porro neque sensus ipsi à noxa immunes sunt: nam inde ipsorum exortus atque initium est. commutantur igitur & ipsi, ægritudinemque participant. utique non
- B** nulli & sensibus delirantibus corruptè sentiunt. At stomacho potissimum succurrendum est: cum & ipse malè habeat, & in ipso bilis atra resideat. Igitur absinthij succum ab exiguo incipiens ad sabæ usq; magnitudinem assidue deuorato. id enim ne bilis gignatur, impedimento est. Benefacit & aloë. nanque ipsa ad inferius intestinum bilem deducit. Nempe si recens malum sit, neque multum homo à naturali statu discesserit; alia huic medela opus non est: sed reliqua victus ratione vtendum, & ad pristinum habitum recuperandum, & ad exactam mali purgationem faciendam, & ad vim corroborandam: quæ omnia, ne iterum morbi reuertantur, efficiant. Victum autem in refectioe conuenientem posterius exponam. Si ab his paulum debilitatus morbus denuò inualescere visus fuerit; vehementiora medicamenta requirit: neq; in aliud tempus differendum est. Verum si ab coercitis mulierum mensibus, aut in viro ab suppresso hæmorrhoidum profluvio morbus creatus est; irritandi sunt loci, & aliquid soliti excrementi profundendum. Si cunctatur, neq; descendit, in aliam quampiam partem sanguine prolapsa, morbus verò exacerbatur; euacuatio facienda est, & à talis incipiendum. Quod si non, quantum satis est, sanguinis, inde manuerit; cubiti quoque vena secetur. Interiectis autem reficiendi causa tribus, aut quatuor diebus, Hieram, id est, Sacram, quæ purgatoriū medicamentum est, potui dato. Ad hæc cucurbitam medijs corporis partibus applicato, iecori videlicet affigēs. Sed maturanda negocia sunt, ac celeritas adhibenda. exiguis enim medicamentis morbus non obsequitur: si magnis autem non vincitur, sed resistit; tunc firma sede melancholia nititur. Quod si penitus totum corpus occupauerit sensus, mentem, sanguinem, bilem, neruos etiam corripuerit; & ipsa insanabilis efficitur, & aliorum morborum corpori sobolem inserit, furoris, neruorum distentionis, resolutionisque. quæ si à melancholia proueniunt, sanationem utiq; accipere nequeunt. Quam ob rem ad hoc malum propulsandum veratro vtendum est. Sed antequàm veratrum ægrotus accipiat, stomachum ad vomendum exerceat, & humores extenuet, &



corpus fluxile reddat. Vomitiones autem hæc præstant nonnunquam **E**  
 ieiuno stomacho, nonnunquam radice prouocati. Docebimus verò et  
 modum & materiam: docebimus & veratri species, & vtendi ratione:  
 item quo pacto singula & distinguere, & ordinare prius oporteat: &  
 quo pacto in vomitionibus subueniendum sit, indicabimus. Incredibi-  
 le est autem nisi ab his funditus cōuulsus est morbus, at multorum sal-  
 tem annorum interuallo non sopiri. plerunq; enim postea melanco-  
 lia rursus suboritur. Quòd si iam firmas radices egit; nihil iam ultra  
 differendum est: sed quæ ad veratrum pertinent, omnia administran-  
 da. Nempè ægroti omnes sanari non possunt: medicus enim Deorum  
 potentiam anteiret. verum dolores sedare, morbos intercipere, atque **F**  
 obscurare, medico fas est. Itaque nimirum his, quæ posuimus, adhibi-  
 tis, medici defatigantur, seque aliud quicquam facturos negant. atque  
 duas causas, aut morbum insanabilem esse, aut omnia se remedia ten-  
 tasse prætexunt. Nihilominus tamen sacram ex aloe medicinam subin-  
 de præbere haud alienum est: siquidem opportunum melancholiæ sub-  
 sidium affert, stomacho & iecori subuenit, bilemque deiciens mirifi-  
 cè prodest. Quin etiam maluæ seminis pondo drachmam ex aqua pro-  
 pinare optimum esse quidam experientia compertum habuit. Infinita  
 præterea sunt simplicia medicamēta: quorum alijs alia vtilia sunt. Post  
 id genus labores demum reficiendus æger est: quibusdam enim, quan-  
 diu medicatio adhibetur; tandiu morbus permanet, quanuis labefacta **G**  
 tus ac debilis: at si homo carnes refarcat, ac vires instauret; simul om-  
 nia morbi vestigia obliterantur. nam potentia naturæ sanitatem, im-  
 becillitas morbum parit. Propterea ad refectionem conuertatur agro-  
 tans in aquis sponte calidis sæpe commorans. medicamenta enim, quæ  
 in his sunt ingenita, opem ferunt, bitumen videlicet, aut sulphur, aut  
 alumen, ac multo his plures aliæ facultates. Bona vtique est humecta-  
 tio morbi squallorem tollēs, & curationis vexationem mitigans. Raræ  
 autem ac molles carnes ad ægritudinis remissionē maximè faciunt: ve-  
 rum siccæ ac densæ melancholia laborātibus carnes sunt. Inunctio pin-  
 guis cum leni frictione adhibeatur. cum multo aut oleo, hæc cōtineat. **H**

Multa de-  
 ficiunt.

panes loti cum vino aliquo dulci theriaco, cretensi, & scybellite, quod  
 Pamphyllum vocant: aut vinum & mel, quæ iam diu permixta fue-  
 rint. oua & frigidiore & calida, putaminibus nudata: non pingues car-  
 nes vim detergendi habentes: porcorum pedes, & capitis partes: auium  
 alæ pingui carentes: venatio, vt leporis, caprearum, damarum car-  
 nes: fructuum autumnalium quisquis optimus fuerit. Stomachi sub-  
 uersioni consulendum est ante cibum, quò minus deuoratus reij-



- A** ciatur. quare ante omnes cibos mulsæ cyathi dimidium dandum est, bibitumque per vomitum reddendum: quò stomachi excrementa purgentur. sic enim cibus in ventriculo firmus residet. At medicamina necessariò educendorum purgatoria sunt pini fructus, & vrticæ: semina coccali & piperis, amygdala amara. mel eis consistentiam præbeat. Sin exicare volueris; optimè proficit myrrha, & iridis radix, & medicamen ex viperis, & Bistini, & Mithridatis antidotus, et id genus alia propè infinita. Exterius apponēda sunt cataplasmata, quorum materia est fertula, & papauer, & terebinthi lachryma, & hyssopum, & oleum ex rosis, aut ex cœnanthe. cera autem hæc omnia
- B** cogantur. Inunctio pinguis, gestationes, deambulationes, & alia, quot quot carnes reficiunt, & vires instaurant, & naturam in antiquum statum reuocant; administrantur.

De curatione Phthisis, seu vlcerū pulmonis. Cap. VIII.  
Carens principio & fine.

- quemadmodum in naui & tranquillitate. nam si recte habuerit ægrotans; in mari gestatio fieri poterit: atque ibi vitam deget. cum vlceribus enim quiddam siccum marina salugo communicat. à gestatione quiete concessa vtendum in præsentia pingui oleo. post frictiones oleum cum aceto infundatur, paulum primò, deinde adiiciendum vsque ad heminas quinque, aut sex, aut multo plus etiam: sin minus, at saltem quantum quis ferre poterit. multoties enim vel id solum pro omni alimento satisfecit. Lac verò assumptu suaue, potu facillimum, nutritu solidum, & qualibet esca à pueritia familiaris est: præterea visui colore delectabile, medicamen arteriam non asperans, guttur læuigans, ad eijciendā pituitam facilem spiritum reddens, inferiorem exitum lubricum efficiens, vlceribus dulce subsidium, et quolibet alio benignius. si quis multum lactis potat, nullo alio eget alimento. in morbo enim bonum medicamen est lac, eiusdem & alimentum effici
- C** tur. nam hominum lacte vescientium nationes frumentum nō edunt. optima verò est cum lacte & puls, & bellaria, & alica lota, & quæcunq; edulia ex lacte fiunt. quòd si et alia esca indigeat; eiusdem generis esto. ptisanæ cremor concoctu facilis, tenuis materiæ est. eatenus verò condiendus erit, quatenus absorptu facillimus sit. siquid etiam saporis iucunditatem afferens capiat; & illud medicamentum esto: qualis est ligustici coma, pulegium, mentha, salis exiguum, acetū, aut mel. si ventriculus non concoquit; huiusmodi exhibenda sunt. At si nihil ventriculo tale exhiberi necesse sit; omnibus ptisana præstantior est. Licet & ptisanam in alicam permutare: minus enim flatuosa, & concoctu facilius est; si quemadmodum & ptisana exterfa deglubitur. In humidiori

Sextū &  
septimū  
caput de  
ficiunt.



bus reiectionibus faba vlcera purgat, sed flatibus redundat. item pisum **E**  
& ochrus, qui & quāto pauciores flatus citant, tantò minus vlcera pur-  
gant. Itaq; medicus coniecturis ductus, prout praesentia postulant, his  
vti debet. istorum quoque condimenta sunt. quotquot de ptisana me-  
morata sunt. At oua ex igne quidem aquea calida, sed ex animalibus  
nuper ædita optima sunt. priusquam eam \*

Reliqua  
huius ca-  
pituli vsq;  
ad. xiiij. ca-  
pitulum defi-  
ciunt.

De curatione vlcera Iecoris, & puris ab eo effusionis\*  
Cap. XIII. Carens principio & fine.

in iecore vlcus perniciosum insit. periculosissimum autem est, qui in **F**  
ventrem fit, saniei confluxus; si stomachum occupet, qui viam supe-  
riora petentibus praebet. Alimentum enim vitae causa est: ipsius verò  
alimenti dux est stomachus. insuper medicamēta intimis corporis par-  
tibus stomachus distribuit. quapropter si ad quālibet deuoranda malè  
se habeat; celerius ægrum morbo atque fame consumi necesse est. Hæ-  
sunt cuiusque loci, quo se pus conuersurum est, inter se differentes no-  
tæ. Nam si per intestina delabatur; tormina vexant, aluus liquida est, pi-  
tuita & bilis fertur: deinde cruentum virus circumfluens, aut humidi-  
tas aquæ similis, in qua crudæ carnes demersæ lotæque fuerint. Si pus in **G**  
vesicam defluit; grauitas in renibus lumbisque sentitur. ac primò lotiū  
multum & bile infectum: postea turbulentum, nullam subsidentiam  
cōtinens, quam græci Hypostasim dicunt, inconstansque decurret: ad  
extremum verò & sedimen album apparebit. Sin ad stomachum sur-  
sum versus pus rapitur; tunc orietur nausea, odium cibi, vomitus pitui-  
tæ, aut bilis, defectus animæ, vertigo vsque eò, donec pus erumpet. Pre-  
cipuum sanè fuerit in aliam partem auertere. praua enim hæc via est.  
Quòd si pus violentius feratur; omnia faciendū sunt, stomachoque suc-  
currendum escis, medicamentis, victusque ratione. Sed omnia leniter  
adhibenda. Medicamētis quidem vt sinus effringatur, studendum est:  
herbam itaque hyssopum cum mulsā potui dato, & marrubij comam **H**  
ipsam quoque cum mulsā & succo absinthij. Hæc vtique, quò humo-  
res extenuentur, & viæ lubricæ reddantur, & purulenta corpora facile  
rumpantur; ante cibos bibere expedit. Dandum est & asininum lac bi-  
lem non generans, benè nutriens, in caseum non spissescens: quæ lactis  
virtus est. Ad hæc ægrotanti gratificandum in cibo & potione: quos, &  
paulo deteriores iuuantibus sunt; nihilominus tamen cōcedito. nam  
stomachus nauseam mouenti & contristanti humori transitus erit. si-  
quidem nonnullos puris exitus offendit. Cauendum est etiam ne ieiun-  
ni sint: cumque aliquid cibi capiunt; illud purum syncerumq; sit. Opus  
est autem & in cæteris effluuijs diligentissimam stomachi curam susci-



**A** pere: quandoquidem ipse omnibus medicamentis iter præbet. Meminisse quoque iecoris oportet, vbi vlcera radix est. Porro si pus in vesicam impetum facit; vrinam citantibus eliciatur: vtpote assari radice, adianto, & meo potabilibus. hæc enim ex mulla potui danda sunt. Bistini vtique varium medicamentum, & quod ex vesicario solano conficitur, & quotquot experimento aliquibus probantur; optima sunt. Verum enim verò si per intestina educere malis; tibi lac eductorium esto, præcipue quidem asine; id si non adsit, capre, aut ouis. Succum autem lubrici & abstergentes præbeantur: qualis est ordeaceus. Obsonia sunt piper, zingiber, lygusticum. vtque semel de omni victus ratione absoluiam, in qualibet puris eruptione alimenta sint boni succi, stomacho vtilia, concoctionem facile admittentia. ea verò sint aut cremores, aut ex lacte pultes, & cibi ex amylo, & bellaria cum lacte \*

## Curatio Lienis.

## Cap. XIII.

**S**cirrhi in liene geniti discusiones non facillimæ sunt. quod si & ab hoc oriundi morbi proueniant, vtpote aqua intercus, aut malus habitus; insanabile malum effectum est. Hac ratione verò scirrhis medicus opem ferre debet: orientes auertere, & nuper incipientes discutere oportet: inflammationibus autem resistendum. Siquidem scirrhii inflammationibus ad diffilationem tendentibus veluti hæreditario iure succedunt: hæc enim inflammationis germina sunt. Porro ijs remedijs vtendum est, quæ à me in sermone De acutis morbis relata fuerunt. Si tibi omnia facienti in inflammatione scirrhus immaneat; igni quoque similibus ad molliendam duritiam vtitor: irrigationibus ex aceto, oleo, et melle. Sed lanæ vice panni lintei complicati accipiantur. Sic vnguentariæ glandis puluis cribratus inspergendus est: & cataplasma quàm mollissimis \*

## De curatione morborum in Articulis &amp; Coxendice

**D** Cap. XII. Secundi Libri De curatione tardarum ægritudinum, Carens principio.

ciborum & raphanorum plerumque; deinde ad veratrum veniendum est. in his victus ratio aliarum affectionum communis est: & post victus rationem inunctio, lauatio in frigida marina præcipue quidem omnibus articularibus vitij communia medicamenta sunt. nam & podagricis veratrum mirifice, sed in primis morbi inuasionibus succurrit. Quod si multis iam annis inueterauit, vel & à maioribus per successionem descendit; ægrotum ad mortem vsque comitatur. Artuum exacerbationibus hoc sanè pacto subueniendum est. lanæ ex oue sordide adhibeantur: irrigationes fiant ex rosaceo & vino: nonnullis & spongia ex posca

Reliqui  
istius libri  
vsque ad  
portionem  
duodeci-  
mi capitis  
secundi li-  
bri de cu-  
ratione tar-  
darum ægri-  
tudinum  
desinit.



profuit. Ad hæc cataplasma fiat, panis sumatur cum refrigerantibus, vt **E** puta, cucurbita & cucumere. Accipiaturs & cucurbitula tenuis, & plantago herba, & rosarum folia. Necnō et sideritis dolorem sedat cum pane & musco: & symphyti radix, & pentaphyllos herba, Quinque foliū romani vocant: & marrubii, quod folijs est tenuibus. huius decoctum quidem infusum dolorē leuat. ex ipsa verò herba cum panis micis, aut cum ordeī farina cataplasma fiat. Malorum quoque citriorum pars nō apta cibo cum polenta magnopere subuenit: Fici aridi & amygdalæ cum aliqua farina. Hæc vtique est refrigerationis materia. Et hoc quidem remediorum genus aliud alium iuuat: & idem interdum alium atq; alium. Nonnullis verò calefacientia remedio sunt: atque idem remedium aliàs alij opitulatur. Peruulgatum est autem & hoc ad dolorē **F** tollendum proficere. Capram oportet herbam iridem ad satietatem depasci: deinde interposito tempore, quantum ad pabulum in ventriculo conficiendum satis sit, capram immolare: atque intra eius ventrem in fimo pedes ægrotantis oculere. Demum infinita sunt medicamenta. ægrotos nanque sibiipsis remedia parare vrgens impellit calamitas. Sed medicorū auxilia in proprijs libris conscribentur.

Curatio Elephantis. Cap. XIII. & vltimum secundi voluminis De curatione longorum morborum.

**M** Orbis, quò dissoluantur, maiorē esse remedia opus est. Sed que nam medela excogitari poterit, quæ elephantem tam ingens malum expugnare digna sit? neq; enim in parte vna, aut viscere vno inhærescit neq; aut intus duntaxat labes occultitur, aut extra prorumpit: sed & in penetralibus totum hominem occupat, & exterius totum amplectitur. Triste profectò, & visu terribile spectaculum. feræ nanq; species est. ac vnà cum his viuere, vnà cibum capere perinde, atque in pestilentia, formidolosum est. etenim per inspirationis communionem facilis infectio est. Quid igitur quispiam in arte medica inueniat, quod huiusce mali dignum remedium contineat? Verum enimuerò omnia cō- **H** ferre simul oportet medicamenta, & victus rationem, & ferramenta, & ignē. Hæcque si nouo & orienti affectui adhibueris, sanationis spes affulget. Sin ad summum suæ creationis ascendat, in visceribusque stabilis sedeat, quando & in faciem inuadit, tunc de ægri salute spes omnino abscissa est. Itaque venas in cubito ambas incidito: incidito & venas in malleolis eodem die: temporis enim interiectio atque separatio fundendo vbertim sanguini, & recreandis viribus aptior est. nam sanguinem sæpe & multum mittere opere præcium est: quippe qui vitij huius alimentum sit. exigua verò ipsius pars est optima, quæ naturæ cibum



præbeat. Idcirco qua ratione prauum inquinatumque detrahatur, atque  
**A** interim corpori familiare ac bonum procreetur; cōiectandum est: quo-  
ad alimenti penuria morbus prius fatigetur. noua enim esca applicata  
corpori spatio temporis antiqua obscurat atque debilitat. Postea medici-  
nam sacram non semel propinato: quin omnia sæpius iteranda sunt, &  
resumptio, & ad priora reditio. Esto & alia medicamētoſa in cibis pur-  
gatio: sicut antea De curatione doloris coxendicis diximus. Lac etiam  
promiscuū atque indiscretum, sed largius ad aluum molliendam potui  
detur. verū quintam aquæ partem, quò lac totum dilabatur, atque de-  
ſcendat; adijcito. At ieiunos primò ad vomitum celerius ducito, dein-  
de à cibis iterum, postea aſumptis raphanis. frequenter autem atque aſſi-  
**B** duè omnia fiant. Veratrum quolibet tempore, sed potius vere atque au-  
tumno diebus alternis exhibeto: atque idem in proximum annum repe-  
tatur. Ceterū si morbus ſualuerit, potabilia medicamēta, quotquot  
quis cognouerit, potanda præcipiat. multa enim ac varia adhibere me-  
dicamēta est operæ precium. Atqui & ego quotquot mihi cognita sunt,  
literis mandabo. Cedriæ cyathum vnum, brasiæ duos miscens dato.  
Aliud, ſideritidis succi cyathus vnus, trifolij cyathus vnus, vini & mel-  
lis cyathi duo. Aliud, dentis elephanti ramētorum drachma cum vini  
cretici cyathis duobus. Quin etiā viperarum reptilium ferarum carnes  
& ipsæ in pastillos conformate bibuntur. oportet autē & caput & cau-  
**C** dam ad quatuor digitorum spatium præcidere, reliquū vsque eò elixare,  
donec spine separētur: carnes verò in pastillos redactas in vmbra frige-  
facere: qui potioni, quemadmodum & scylla, exhibeantur. Ipsæ quoque  
viperae in cœna obſoniò dentur: quas coquere, & cōdire perinde, ac pi-  
ſces, opus est. At si medicaminis illius varij ex viperis cōpositi facultas  
adſit, id pro omnibus, quandoquidem omnia simul continet, bibendū  
est. Præterea corpus detergendum est, tumoresque calefaciendi. Alia itē  
medicamenta sunt innumera Celtarum, quos hac tēpeſtate Gallos vo-  
cant. Nitroſis quoque illis factitijs globis, quibus velaminū sordes expur-  
gant, ſaponemque vocant, illis inquam, globis corpus in balneo deterge-  
**D** re optimum est. Et portulaca, & sedum cum aceto benè facit. Rumicis  
etiam radicum decoctum cum sulphure ignem nō experto summo pe-  
re deterget. Illud item varium ex alcyonio trito, & nitro, & aceti ſecē  
cōbuſta, & alumine fiſſo, & sulphure viuo, & coſto, & iride, & pipere.  
forſitan autem omnia pro ſingulorū viribus miscenda ſunt. Aliquibus  
verò & hoc equis portionibus cōpoſitū inſpergentes perfricabimus.  
Faciei tumoribus ſarmētorum cinerē alicui ferarum adipi admiscens  
illinito, leonis videlicet, aut pantherę, aut vrfi. ſin his careas, animalis,  
quod græcè *χναλῶπινα* vocant: latinè vulpanſerē dicas. quod ge-  
nus auis eſt, ſi per literas *χ* & *η* prima ſyllaba ſcribitur: aut laconicū ca-



## A R E T A E I

nem significat ex vulpe et cane natum, si per *u* & *v* eandem syllabam **E** scripseris. simile enim in dissimili, quemadmodum simia homini, miri-  
ficè prodest. Item ammoniac gutta cum aceto, et plantaginis, aut san-  
guinalis herbę succo, & hypocisthis, & lycium. Si carnes liueant, prius,  
quò locus succulentus reddatur, scarificandus est. At si ab acribus flu-  
ctuationibus exulceratas partes lenire volueris; fœnigræci aut ordeï cre-  
moris decoctū molle absterforium est: item ex oleis rosaceū, aut lenti-  
scinū. Apsidue verò lotiones & ad corporis madefactionē, & ad noxia-  
rum humiditatum difflationem mirè proficiunt. Esca munda esto, bo-  
ni succi creatrix, concoctu facilis, simplex: & victus ratio prorsus rectè  
instituta sit in somno & vigilia, in ambulationibus & locis deligendis. **F**  
Exercitationes adhibeantur, cursus, cōuersiones corporis, perę aut fac-  
culi iactus. omnia hæc citra lassitudinem aptè & cōgruenter intendantur.  
Esto & vocis emissio spiritus opportuna exercitatio. Vestis esto mū-  
da, non modò vt aspectu iucunda sit: sed quoniam etiam sordida cuti  
mordacia sunt. Ieiuni absinthite vinū potent. Oppidò quàm utilis est  
& panis ex ordeo, & fassamētum tempestiuum, & exiguum quid mal-  
uarum, aut brasicæ semicoctum cum cumini liquamine. In cœna sta-  
phylini radix apponatur, & alica cum vino & melle antiquo mixtis: &  
marina quotquot ventrem subducunt, tellinorum iuscula, ostrea, eri-  
nacei, & ex piscibus saxatiles: ex terrestribus feræ lepus, aut sus: inter **G**  
aues perdices omnes, palumbes, columbi, & quęcunque optima in illa  
regione inueniuntur. Inter fructus arboreos illi admittantur, quos græ-  
ci Horęos vocant: quòd ea parte anni maturescant, quam iidem græci  
Horam appellant. Vina dulcia vinosis meliora. Balnea spòte calida sul-  
phureosa iuuant. vita in aquis diu ducenda est: & mare, & nauigatio cō-  
ueniunt. Præterea per veratrum purgationes fiant. Album quidem su-  
periozem ventrem, atrum verò inferiorem purgat. Quin & album ve-  
ratrum non vomitum tantum molitur; sed etiam omnium simul pur-  
gantium medicamentorum efficacissimum est, nò multitudine & va-  
rietate excrementorum: id enim & affectus ille, qui Cholera dicitur, **H**  
pręstare solet: nò distentionibus & violentia in vomēdo (ad hoc enim  
& nausea & mare validiora sunt) sed potentia & qualitate non vitiosa.  
quippe quę laborantibus sanitatem reddit per exiguam purgationem,  
& modicam intentionem. vetustorum præterea morborum omnium  
firmis radicibus inharrentium, si cuncta alia medicamina viribus infe-  
riora sint; id vnicum remedium est. siquidem igni facultate persimile  
est album veratrum: & quod ignis exurens facit, eo plus veratrum in-  
terius discurrens operatur: videlicet facilem spirationem ex difficili, ex  
pallido colore floridum, & ex macie corpulentiam \*

Quę deficiunt quærto quam præstantissimi medici Aretæi.

Ruffi



Iunio Paulo Craffo Patauino Interprete.



**R V F F I E P H E S I I D E C O R P O R I S**  
 humani partium appellationibus  
 Quæ in primo libro continentur.

Vnde cuiusque Artis tradendæ initium sumendum.	cap. i.
Quæ prius, & quomodo docere Autor velit.	cap. ii.
Diuisio Corporis in maximas partes.	cap. iii.
De superioribus Capitis, & Faciei exterioribus partibus.	cap. iiii.
De Oculi exterioribus partibus.	cap. v.
De Faciei infra oculos partibus.	cap. vi.
De reliquis Faciei partibus.	cap. vii.
De Ore, in eoque contentis.	cap. viii.
De Collo, eiusque partibus.	cap. ix.
De Ala, Humero, Brachio, & Manu.	cap. x.
De Thorace, & eius partibus.	cap. xi.
De Genitalibus marium, & eorum partibus.	cap. xii.
De foeminarum Genitalibus.	cap. xiii.
De Dorso ossibus.	cap. xiiii.
De reliquis vsque ad Inguina partibus.	cap. xv.
De partibus ab Inguinibus vsque ad extremos pedes.	cap. xvi.
De Interiorum membrorum appellationibus	cap. xvii.
De Capitis tunicis, ossibus, ac futuris.	cap. xviii.
De quibusdam Capitis ossibus.	cap. xix.
De Musculis quibusdam, & processibus in capite.	cap. xx.
De Foraminibus caluariæ.	cap. xxi.
De Cerebro, Membranis, Neruis, Spinalique medulla.	cap. xxii.
De Oculis.	cap. xxiii.
De prima et secunda colli Vertebra, Osse Ypsiloide, Gula, Tonis, Aspera Arteria, Guttura, & Bronchijs.	cap. xxiiii.
De Cordis partibus, Membranisque pectoris.	cap. xxv.
De Glandulosis carunculis.	cap. xxvi.
De Ventris inferioris partibus.	cap. xxvii.
De Iecore, & in eo contentis	cap. xxviii.
De Liene, renibus, vesica, vrinarijs seminarijsq; vasculis.	cap. xxix.
De Musculis lumborum.	cap. xxx.
De Genitalibus foeminarum locis.	cap. xxxi.
De Testium tunicis, alijsque partibus.	cap. xxxii.
De Venis. cap. xxxiii. De Arterijs.	cap. xxxiii.
De Neruis, Tendonibus, Cartilaginibus, Membranis, Tunicis, Adipe, Carne, & Medulla.	cap. xxxv.
De Humoribus Excrementisque corporis.	cap. xxxvi.
De Foetu, & ad eum pertinentibus.	cap. xxxvii.



## R V F F I E P H E S I I

DE CORPORIS HVMANI

PARTIVM APPELLATIONIBVS

Liber primus.

IVNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

Vnde cuiusque Artis tradendæ initium sumendum sit. Cap. I.

**V**id in arte citharæ pulsatoria primum didicisti? Singulas fides pulsare (credo) atque nominare. Quid in grammatica primum percepisti? Vnumquodq; elementum cognoscere ac nominare. Igitur & alias artes à nominibus docere incipiunt. Et ferrarius faber, & alutarius cerdo, & carpentarius in primis ferri nomen, & instrumenti, & aliorum omnium ad artem facientium nomina tradunt. Quin etiam grauiiores artes nonne & ipsæ à nominibus pari ratione docendi exordium capiunt? Quid enim primum in geometria accepisti? Punctum sanè, et lineam, & planum, & superficiem, & figuram triangulam, & circulum, & aliaque id genus, quid nam sunt, dignoscere, recteq; appellare. Vis ne igitur & medicinalem facultatem à nominibus exorsus perdiscere? ac primum omnium, vt singulas corporis partes appellare cōueniat, deinde et reliqua, quemadmodum sermonis processus, connexioque requireret, agnoscere? Aut tibi satis esse videtur, me ceu mutum, quæcunque doceri postulas; tibi ostendentem explicare? Mihi verò id non melius esse, teque ipsum hoc pacto discere, & alterum docere, haud facile esse videtur. Atque de his quidem sic mea fert opinio.

Quæ prius, &amp; quomodo docere velit, proponit. Cap. II.

**C**Aeterum audiens, & in puerum hunc respiciens, memoriæ, quæ sensui patent, commendato. Ante omnia vt interiora appellanda sint, animal quopiam homini quàm simillimum discicantes; instruere te conabimur: Nihil enim impediet, tametsi non omnia omnibus similia sint; quòminus summam saltem cuiusque doceamus. Verum priscis temporibus in humanis corporibus huiusmodi generosius ostendebant.

T ij



## Diuisio Corporis in maximas partes. Cap. III. E

**M**axime corporis partes he sunt, Caput, Collu, Thorax, Manus & Crura. Thoracem autem non solum eam partem, qua à iugulis ad praeordia usque pertinet, appellamus: verum etiam totum illud, quod intra iugula pudendaque concluditur.

## De superioribus Capitis, &amp; Faciei exterioribus partibus. Cap. IIII.

**C**aput vocatur quod pilis contegitur separatim, & simul cum facie. capillati autem prior pars Synciput, auersa verò occiput nominatur. partes à lateribus syncipitis posita Tempora dicuntur, græcè Corsæ & Crotaphi. quod autem in medio capite est, ubi maximè capilli inuoluuntur, Verticem vocamus: partem sub syncipite, Frontem iuxta tempora pilorum exortus Iuli græcè, latinè Lanugo dicuntur. occipitis autem capilli promissi Crines vocantur. vltimas frontis rugas græci Episcenium vocant, nostri Supratentorium dixerint: quod oculis attrahimus, quando nobiscum aliquid altius cogitamus, aut veremur. alij verò partem sub supercilijs carnosam Episcenium vocauerunt. At supercilia hirsuta frontis extremitates sunt: quorum interstitium Mesophryon græcè, latinè Glabella, quod glabrū sit, dicitur. sub supercilijs Palpebræ, quas etiam Genas vocant, altera supra, altera infra sitæ sunt. **G**ab ijs prodeuntes pili græcè Tarfi & Blepharides, latinè Cilia nominantur. harum extrema, cum nos dormimus, sese cōtingentia, Coronæ & Chelæ hoc est, Ungulæ dicuntur. superioris palpebræ superficie quod super impendit, Cauum: illi autem respondens inferius, Subcauum vocant. Id sanè & in aqua inter cutem, & alioqui in prauo corporis habitu, & in longinquo hæmorrhoidum effluuio, & antiqua mulierū menstrua purgatione, nonnunquam etiam inchoantibus lippitudinibus intumescere cōsuevit. Huiusmodi verò lippitudines mitiores esse videntur: propterea & id genus affectus, quoniam cauæ partis tumor est, græce κοιλιδία dicitur. At cauæ superioris inferiorisque palpebræ extremitates à græcis Canthi, à nostris Anguli nominantur: alter maior ad nasum vergens, minor alter tempori propinquus.

## De Oculis exterioribus partibus. Cap. V.

**O**culi verò quod in medio aspicitur, Visio et Pupilla nūcupatur. Glenam etiam simulacrum in pupilla apparens vocant. Quod autem inter pupillam atque album, continuum interiacet, Iris est: sic vtique, quod colore euariet, nominatur: nam modo nigrum, modo



**A** igneum, modo celsum, modo splendidum id esse conspiciamus. Corona nigrum ambit, & ab albo distinguit: quæ circulus et copula oculi tunicarum est. Earum sanè prima duabus naturis prædita duo quoque nomina gerit: Cornicularis quidem in medio, & usque ad iridem: hæc enim eius particula expolitis cornibus assimulatur. candida verò est altera pars omnis, qualis & aspicitur: nihil mediæ neque natura, neque colore similis. ipsi autè vocata Epidermis super incumbit. qua in iuuenibus & senioribus, & in affectu, qui Chemosis græcè, Vnguis latinè dicitur, abscedente atque elata, rufum: siue igneum cernitur. Aliæ tunicæ quæ sint nomenclatura præditæ; paulo inferius in animalis dissectione explicabitur.

### De Faciei infra oculos partibus. Cap. VI.

**S**ub oculis insurgentia ossa Subocularia nonnulli, alij Hypopia nominant. A superciliorum medio interstitio, quod Glabellâ vocari diximus, deorsum versus nasus protenditur. cuius foramina Rhothonæ, & Nares, atticè quoque Myxæ appellantur. sed Hippocrates pituitosum excrementum per ipsas destillans, Myxam, latini Mucorem vocant, Athenienses verò Coryxam. cartilagineum illud, quod foramina distinguit, nasi Interseptum est. partes ossæ, quæ utrinque ad malas vergunt, nasi Dorsum. extrema verò hinc atque in huiusce ossi fastigij Pinnæ vocatæ sunt. istæ in vehementiori spiritus difficultate, & alioqui cum voluerimus, agitantur. carneum autem illud ante nasi septum in labia descendens Columna, nasi Extremitas, Globulusque appellatur. at sub columna in superiori labro cavitates Philtrum græcè vocatæ est: quasi Amatoriū, siue Amabile dixeris. sed totum sub naso superioris labij Hyporinion græcis est: latino vocabulo caret. deinde labia duo: quorum extrema græcè Prochila, latinè Prolabia dici possunt. qua parte autem committuntur, Prostomion vocant. inferioris labij cavitatem Nympham. Auriū foramen, per quod voces exaudimus, Auditū appellant. partē pendulam latini Fibrā, græci Lobon vocant. quam etiam solam auris particulam nomen habere, cæteras verò nomine carere dixit Aristoteles. cæterum medici illis quoque nomina imposuere. Pinnam quidem supremam partem latam atque decliuem appellauerunt: Helicem totum illud, quod deinde aurium extremam oram ambit: Anthelicem id, quod in medio cavitatem extollit. Concham post anthelicem cauum: oppositam verò conchæ eminentiam iuxta temporis fines Tragum, latine Hircum dixeris: helicis finem, qui subbrevis est, Antilobida vocant.



## Dereliquis Faciei partibus.

## Cap. VII.

E

**T**Ota capitis prior pars Facies dicitur. Mala sub oculis faciei eminentiae sunt vbi pudoris sedes est: maximeque ibi rubor ostenditur. post malas autem Maxillae habentur: quarum altera superior, altera inferior est. inferiorisque maxillae acies Mentum est. sub eadem inferiore maxilla carnosam partem Mentum, Leucaniam verò cauum iugulo proximum appellauerunt. Barbæ prima sub temporibus germinatio Iulus à grecis, a nostris Lanugo dicta est. primus eius in superiori labro exortus græcè Propogonium: latinè Probarbium, si fingere liceat, dicitur. qui pili postea adacti Mystaces appellantur. sed in summo mento pili Pappus, sub mento autem Hypena græcis vocibus dicuntur: latina nomina deficiunt.

## De Ore, in eoq; contentis. Cap. VIII.

**P**Rima labiorum diuisura, & interior vsque ad fauces inanitas Os est. in ore autem alia sunt, & Dentes, quos nonnulli Cranteras appellant. horum primores quatuor Incisores, Caninos autem sequentes vtrinque singulos. Molares verò, & Maxillares post caninos vtraque ex parte quinos vocare consueuimus: Sophronisteras, hoc est, moderatores horum intimos atque vltimos græci vocant: quòd eo tempore, quo moderatos temperantesque esse oportet, oriri incipiunt. Ab vtraque parte vnus est, Genuinos latini appellat. totidem & superioris maxillae, eademque nomina fortiti sunt dentes. Maxillarum colligatio Habena, Mensae summitates latae molarium, Mortariola & maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, appellantur. Gingivæ circa radices dentium carunculae sunt. Linguae radix, vnde ipsa exoritur, nominatur. pars eius musculosa ore contenta Lingua est. Ceruix, quæ sequitur. Parasyra autem, quæ ab utroque linguae latere sunt, græci nominant: Hypoglossida partem linguae inferiorem; Epiglossida verò, quod intimum est gutturi operculum quoddam impositum; ne cum deuoramus, quippiam in pulmones irruat. sed, cum spiritus ducitur, ne transeuntem aerem impediatur, sublimis attollitur. Cœlum verò, et Palatum concava est superioris maxillae pars. Columna et Gurgulio quidam ex palato processus, quem Aristoteles Vuiferum nominauit: quoniam ea parte inflammata vix quiddam simile pendere videtur. Vuam enim non partem, sed affectum nominari oportet. Fauces omnis ea capacitas, quæ inter deuorandum dilatamus, vocata est. propterea & Homerus dixit. Fauibus erupit vinumque humanaque membra.



**A** Neque enim ex arteria aspera, & pulmone cibum potumque Cyclops euomit. id enim mirum in modum rude, fatuumque fuisset. Paristhmiā dicuntur, & Antiades, & Mala, latinè Tonsillæ, carnosæ quædā glandulosæque partes vtrinque à lateribus faucium positæ. Hæ numero quatuor sunt, duæ in summo gutture vtrinque, reliquæ inferius locatæ.

De Collo, eiusque partibus. Cap. IX.

**I**nfra caput est Collum, quod & Ceruicē vocant. Hypodiris græco vocabulo est in priori parte colli postremū. in priori item colli parte Bronchus est, & Aspera arteria, per quam spiritus ducitur. Bronchi summitas Guttur est, At posteriore colli parte Tendones sunt. iugulis proximum cauum Homerus Leucaniā vocauit. sed medici Anticardion, quasi cordi oppositum, & Iugulationem appellant. Quæ autem à tendonibus ad humeros pertinent, Epomidas vocat. Humerus verò brachij caput est, quod lato scapularum ossi inferitur, & cum toto etiā articulo copulatur. At humeri Acetabulum est lati scapularū ossis cavitatis. lata scapularū ossa à græcis Omoplatæ vocata ea sunt, quæ tergo incumbunt: quorum intermediæ eminentiæ ipsorum Dorsum dicitur. Acromion iuguli, scapularumque ossis copula est. Eudemus verò ossiculum perexiguū esse dixit Acromion. Claues, quæ & Iugula dicuntur, sub imo collo ossa sunt cum pectoris ossē commissa; humeros scapulasque, ne in pectus cadant, vt alijs contingit animalibus, prohibentia. nam cætera animalia iugulis priuata sunt. quocirca & latissimi pectoris homo est.

De Ala, Humero, Brachio, & Manu. Cap. X.

**A**la sub humeri articulo cavitatis est, in quam sæpe humerus luxatione delabitur. Malam verò appellare haud græci sermonis est. aliquid autem sub ala calantem ferre, sub mala habere dicunt. Humerus illud etiam à latinis dicitur, quod exit ab humero, sed à græcis Brachium. Huius apud humerum rotunditas Caput humeri est. Interior iuxta cubitum excessus, quem nonnullos imperitè Processum autuma re dixit Hippocrates, et ipse alterum humeri Caput est. post humerum totus articulus, acutumque illud, cui reclinati incumbimus, Ancon à quibusdam, ab alijs Olecranon vocatur. Dores autē Siciliam incolentes, Cubitum, vt nunc apud latinos in vsu est, appellant. Quin Epicharmus cubito ferire *χυβιτίζειν*, hoc est cubitiffare, verbum ē verbo trāsfereudo, appellat. ossium verò brachij quod subijcitur Cubitus, supra positum Radius est. hæc ad Brachiale protenduntur. post quod lata pars & compacta, Palma latinè, græcè Metacarpion, Tarsusque nomi-



natur. sequuntur Digiti. Manus totum illud est, quod ab humero pendet, & extremum, quo apprehendimus. Ex digitis Magnus Pollexque est ab alijs summotus: alter Index inter quatuor primus. tertius Medius vocatur, quartus Anularis, ultimus Paruus. ipsorum ossa Scuticulae, & Phalanges, & Internodia. primi articuli Procondyli graeco vocabulo, (latino enim carent:) medij, Condyli: postremi, Metacondyli. vnguium initia Radices vnguium vocantur. internae digitorum summitates Acini & Vertices. carnosae pollicis pars sub manus cauo insurgens Stethos graeco nominatur, quod apud latinos Pectus sonat. spatium, quod inter indicem, pollicemque intercedit, carnosumque est, sub quo manus in cauum subsidet; Thenar dicunt: Hypothenar verò, quod sub quatuor digitis est. sed omnem manus interiorem latitudinem Thenar Hippocrates vocasse visus est. id apud latinos Vola significat.

## De Thorace, &amp; eius partibus. Cap. XI.

**A**ngulis pectus in priore parte est. medium autem, in quod costae subeunt, Sternon vocant graeci, latini Os pectoris. ab auersa colli parte ad metaphrenon vocatum usque, Tergum est. Metaphrenon inter tergum lumbosque, ubi renes adherescunt, locatum est. Lumbi verò dorsi ultima pars sunt. carneque in pectore eminentiae Mammae, atque Vbera vocantur. mammae extrema pars, Papilla primum verò in pubescendo incrementum, Faba dicitur. totum autem tumorem graeci Ascoma vocant: latine Vtrem, siue Vber dicito. sed in mulieribus magis proprie. Latus, illud totum quod sub ala est, appellatur. ossa verò Costae: inter ipsas spatia, Intercoastalia nominantur. Spuriae costae sunt, quae ad pectorale os non perueniunt. Sub pectore cauum Ventriculi os dicitur: quod alij Procardion, quasi latine Praecordium, nonnulli verò Cor appellant: doloresque ibi orientes, cordis morsus, cordisque dolores esse dixerunt. Spuriarum costarum extremitates Cartilagines sunt. Musculosae autem partes sub cartilaginibus collocatae Hypochondria graeco, ac si dicas Subcartilaginea, latine Praecordia à quibusdam vocantur. Alius ac venter deinceps locatur. Epigastrium graeco super ventrem posita cutis appellatur. Eius media cauitas Umbilicus est, venarum, per quas infans alitur, segmentum. umbilici pars media, Acromphalon à graecis vocatur. cutis umbilicum ambiens, quoniam corrugata senectutem significat, Vetula appellatur. sub umbilico Abdomen est, & Aquiliculus. huic continua usque ad pudenda pars Pecten atque Pubes dicitur; alij Ephebeon vocant.

De



## A De genitalibus marium, &amp; eorum partibus. Cap. XII.

**G**enitalium porro membrorum, quæ in maribus sunt, propendens particula Colis, ac Stema est: quæ autem non pendet, Sedimentum, Collumque vesicæ. lineam per medium discurrentem apud græcos alij Trammida, alij Orrhon appellarūt. colis extremitas Glans est. cutis eam regens Preputium: præputijq; extremum Summum præputij. cauernula verò, per quam semen, vrinaq; profunditur, Vrethra Vrinariumq; iter nominatur. Vretera autem ne dicito: Vreteres enim alij sunt: per quos scilicet à renibus in vesicam vrina delabitur. Scrotū ea cutis est, qua Gemini inuoluuntur. Geminos aut, aut Testes appellare nihil interest. Geminorū quod supra est, Caput: quod infra, Fundū vocatur. pars scroti laxior Laccopedon græcè, à quibusdā Achichadaron, ab Atheniensibus Laccoschea nominatur. inter scrotū, & sedimentum, & femur locū Plichada vocant. Et transire græci διαπλίσσειν, & id, quod est circum, Amphiplex enunciat. Sophocles verò & in Draconibus hoc verbo vitur dicens, cardinem circum comprehendentem. perinde ac si dixisset, circumplexum cardinem.

## De muliebribus Genitalibus. Cap. XIII.

**M**uliebribus autē pudendi quod supra est, Pecten dicimus. id triangulum est, & imi ventris terminus. ab alijs Epision appellatur. pudendi rima Schisma à græcis dicitur, Scissurā latinè interpretamur. musculosa in medio caruncula Nympha et Myrton, ab aliquibus Hypodermis, ab alijs Clitoris nominatur. lasciueq; eam tractare λισσέειν dicunt. Myrtochilas verò utrinque posita carnosā corpora. cæterum hæc Euripho & Cremnos, id est Rupes vocat. Sed nostræ ætatis medici Myrtochilas Pterigomata (quasi alas dixeris,) appellant, Myrton verò Nympham.

## D De Dorſi ossibus. Cap. XIII.

**D**orſi ossa vertebræ sunt: quas etiam Homerus Astragalos, id est, talos vocat. tota autem vertebrarum compago Spinam constituit. Extremum lumborum Os Sacrum est. id ab aliquibus etiā Hyposphondylon, quod Subvertebrum latinè verteris, dicitur. Eius vltimum ossiculum Coccyx, id est Cuculus est.

## De Reliquis usque ad Inguina partibus. Cap. XV.

**S**vb costis molles partes à græcis Laparæ & Ceneones, à latinis Ilia vocantur. Deinde ilium ossa, quorum excauata capita Heminæ &



Acetabula. Clunes autem ac Sédilia post lumbos carnosæ partes: quoniam illis sedendo nitimur; ab alijs Nates dictæ sunt. Sub quibus Hypo glutides idest Subnatales vocatæ iacent.

De partibus ab Inguinibus usque ad extremos pedes. Cap. XVI.

**I**nguina femorum priores partes sunt propè pubem posita. nervus autem ad acetabulum pertinens, ac totus articulus Coxendix dicitur. Femorum internæ partes Parameria græcis, Femina latinis sunt. Inter femina autem loca Mesomeria græce, Interfeminia latinè dicitur. Musculi genibus inhaerentes Epigunides, quasi Genuculares dixeris, vocantur. osli autem super genu posito Epigonatis græca appellatio; latina, Patella est: Hippocrates verò Epimylida vocavit. Genu articulus est Femur cruri committens. Poples posterior pars est, in quam genu inflectimus. Gastrocnemia græco nomine magnus mulculus est, latinè sura: unde latus nervus oriens ad calcem tendo factus adhærescit. Ossium verò cruris quod posterius est, Sura quoque dici potest: prius autem, Tibia. Sed Herophilus Suram Radium etiam appellavit. utriusque ossis extrema pedi inserta Malleoli sunt. Tali verò non rectè vocantur. Siquidem & humanus pes Talum sub malleolo abditum, non conspiciendum habet. Calx postremum pedis rotundum est. Planta & Tarsus pars prior & ampla est. Sterhos verò, id est, latinè Pectus, pars inferior post cauum, unde nascuntur digiti, vocatur. Istos autem perinde, ut manus digitos, appellare, aliaque manuum digitis communia recensere, nihil est, quod impediat.

De Interiorum membrorum appellationibus. Cap. XVII.

**I**gitur quæ oculis aperta sunt, o fili, subiectaque his ossa in hunc modum nominare decens est. Modò interiora corporis membra Simiam dissecantes proprijs nominibus illustrare tentabimus. quandoquidem ipsa ossibus, musculis, extis, arterijs, venis, nervis ad naturam hominis proximè accedit: Secundò alia multifida: Tertiò ex bifulcis utrinque dentata. Non utrinque dentata, ac solidipeda longissima ab hominis similitudine summotæ sunt. Quòd si aliquid de membris interioribus exteriora tradentes memoravimus; idem bis repetere ulterius opus non fuerit.

De Capitis tunicis, ossibus, ac futuris. Cap. XVIII.

**A**spice itaque sub calvariae cute tunicam, hanc Pericranion, quod Cranion, hoc est, calvariam obuoluat, græci vocant. Quam verò



**A** alia ossa ambientem tunicam videris, hanc Perioftion, latinè circum offalem verbum verbo reddens appellato. qua ossa caluariæ committuntur, Suturae sunt: quæ duarum ferrarum compagem imitantur. Earum vna quidem rotunda est, synciputque circumcidit: altera occiput: tertia medium verticem diducit, quibusdam etiam hæc syncipitis futuram transiens, frontemque ipsam secans, inter supercilia terminatur. binæ alię in temporum ossibus in squammarum modum totis oris paulatim extenuantur, atque ita inferiora ossa superioribus leniter insidunt. Iphis quidem vetusta nomina defunt, sed nuper à quibusdam Aegyptijs medicis græcam linguam male doctis imposita sunt syncipitis futuram Coronariam, occipitis Lambdoide, idest lambda græcè literę similem, mediam verò Coniungentem appellatibus. temporaneas etiam futuras Lepidoïdes à squammarum similitudine vocauerunt. iidem & aliorum ossium partibus ab antiquis innominatis nomina indidere: quæ ego, vt alijs nostri sæculi medicis innotescant, non prætermittenda iudicaui.

## De quibusdam Capitis ossibus. Cap. XIX.

**I**nter caluariæ ossa meditullium Diploen nominant. vbi verò nascitur initium est, crebra ibi foramina Ithmoïde, hoc est cribri speciem referentia vocantur. per ea indubiè sternutamentum, mucusque propellitur. Nonnulli & hac parte nos in cerebrum spiritum attrahere confirmant. Proxima auribus ossa ob firmitudinem Lapidea nomen habent. ab vtroque enim latere singula ossa dura, subalbidaque sunt, magnitudine caput maximi manus digiti æquantia: per quæ auditoria itinera seruantur. Alij proelues occipitij processus Lapideos appellant, idque non rectè. inanes enim, & cauernosi, & minimè solidi nomini non respondent. Ab auditorijs autem meatibus ad malas pertinentes processus Iugalia ossa nuncupantur.

## De Musculis quibusdam, &amp; processibus in capite. Cap. XX.

**M**usculos caua temporum replentes Temporaneos, qui inferiorem maxillam amplectuntur, Mansores vocant. Tenuis illi, & oblongi, deorsumque versus fauces vergentes processus Stiloïdes à columnæ similitudine dicti sunt. Eudemus autem ipsos gallorum rostris assimulat, ac sine appellatione relinquit.

## De foraminibus caluariæ. Cap. XXI.

**F**oramina permulta caluariam excavant: quæ omnia duobus exceptis, quæ Cœca appellantur, nomine vocat. inter se autem medici

V ij



altereantur, vtra nam hoc nomine appellanda sint: num illa, quæ propè maximum caluariæ foramen adiacent, per quod spinæ medulla in vertebra delabatur: an illa, quæ propè auditorias cauernas, & paulò prius iuxta maxillæ articulos sunt. Sed neq; illa, neque hæc adeo cœca sunt, quin ea in magnū spinalis medullæ cauum peruadant, hæc sub foramina cribrū representantia subeant. ac per ipsa omnia nerui transire cōspiciuntur. de quibus in diuisionibus sermo habebitur. verū ideo ipsi Cœca dixisse visi sunt, quod nō in rectum excauata esse cernantur.

De Cerebro, Membranis, Neruis, Spinaliq; medulla. Cap. XXII.

**I**Ntra caluariam Cerebrū cōtinetur. id Membrana circumuoluunt altera crassior robustiorque osli proxima: tenuior altera, & firma quidem, sed priore minus, quæ cerebrū contingit. Summa cerebri pars Varicosa appellatur: inferior atque posterior Basis: à basi oriens processus Parencephalis græcè, latinè Cerebellū. Ipsi cauerne cerebri Ventricle: ventriculos interius obuoluēs tunica Choroides, hoc est, secundis similis cognominatur. Herophilus autem & membranā Choroides, idest, secundis similem appellat. Germina à cerebro enascētia Nerui sensorij electorijque sunt: per quos sensus, & voluntaria motio fit, omnisque corporis actio perficitur. horum autem neruorum quidam à spinali medulla, & ex ipsam cingente membrana expullulant. Dorsalem verò, spinalemque omnem pariter per vertebra defluentem medullam nominant.

De Oculis. Cap. XXIII.

**O**Culi tunicarum primam inter extima, conspicuaque membram cornicularem superius nominauimus. Secunda Rhagoides atq; Choroides græcis vocabulis dicitur. qua parte corniculari subijcitur, Rhagoides: quod exterius læuore, interius aspritudine vix acino, quæ græci Rhaga dicunt, sit persimilis. qua verò albam tunicā subit, Choroides vocatur: quoniam venulis referta secundas quas vocant, foetui circumdandas representat. Deinde tertia humorē à vitri similitudine Hyaloidea vocatum continet. hæc antiquo vocabulo propter tenuitatem Arachnoides appellata est: latinè Aranealem dicere ausim. at quoniā Herophilus eam reti cōtracto assimulat, nonnulli & Reticularem: alij ab incluso humore, qui vitri gerit similitudinem, Hyaloidea nominant. Quarta membranula guttam quandam humoris Crystalloidea nominatam includit. hæc antiquitus nomine caruit, à posteris Lenticularis ob figurā, Crystalloides ab contento humore cognominata est.



A De prima & secunda colli Vertebra, Osse ypsiloide,  
Gula, Tonis, Aspera Arteria, Guttur, & Bron  
chys. Cap. XXIII.

**P**rimam colli vertebra Dentem appellare mihi videtur Hippo-  
crates. Sub tonsillis osliculum gutturis caput continens quidam  
à figura ypsiloides appellauerunt, quod Ypsilo græco elemēto sit per-  
simile. Ceterum Herophilus, quoniam tonsillis assideat, Assessorē vo-  
cat. Secundę vertebrae processus sursum, ac prorsum versus spectans Py-  
rinoides ab oliuę nucleī similitudine dictus est. Iter illud, per quod ci-  
bi potionesq; in ventriculum descendunt, græcē Stomachus, & Oso-  
phagus, latinē Gula est. Nervi ab utroq; eius latere Toni, ceteraq; sen-  
soria, atque fibrosa pariter Toni dicuntur, Tenores in latinum vertere  
liceat. Asperę arterię summum Guttur est. anuli ad eius plexum creati  
Bronchia, Cauernę, & Aortę nominantur.

De Cordis partibus, mēbranisq; Pectoris. Cap. XXV.

**C**aloris vitę, arteriarumq; motus initium cor est. eius summa  
pars Caput dicitur, infima & acuta Fundum. cauitates ventricu-  
li, crassior & læuus Arteriosus est, tenuior & dexter Venosus, læuo ca-  
paciore. ab utroque autem capitis latere ceu alę prominentes, caue, mol-  
les, & ad totius cordis motum agitabiles, cordis Auriculę sunt. Cor cir-  
cumplexę membranę Pericardios nomen inditum est. Ex membra-  
nis pectoris quę ipsum in duas diducunt partes, Intersepientes appel-  
lantur: quę costas interius vestiunt, Succingentes. Membrana, quę pe-  
ctoris viscera ab inferioribus disiungit, Trāuersum septū, & Phrenes.

De Glandulosīs carunculis. Cap. XXVI.

**E**X glandulosarum carniū genere, quas Adenas græci vocant,  
(multę autem sunt,) aliquę in collo, nonnullę sub alis, quędam  
D in inguinibus, alię in mesaręo vocato reperiuntur. Carnes quędam le-  
niter subpingues ac fragiles sunt. inter has & vocatus Thymus nume-  
ratur: qui in regione capitis cordis locatus est, septimę colli vertebrae  
insidens, asperęque arterię extremo, qua cum pulmone committitur,  
adhærescens. non in omnibus tamen inuentus est.

De Ventrīs inferioris partibus. Cap. XXVII.

**S**ub transuerso septo Venter est. cuius summa pars, primaq; Ven-  
triculi nomen habet. deinde primus intestini exortus Hostiarius  
latinē, seu Ianitor, græcē Pyloros est. postea Ieiunum intestinum sem-



## RV FFI EPHESII

per alimento priuatum: vnde ipsi quoque vocabulum fuit. isti conti- **E**  
nuum Gracile intestinum est. Ex gracili biceps prodit exortus. voca-  
tur autem altera eius pars Cœcum intestinum, quoniã reuera cœcum  
est: altera Colon græcè, & Venter inferior, & Laxum intestinum à lati-  
nis. id Homerus & Nieram appellat. Est autem totum intestinorum  
vinculum ac firmamentum, quod Mesenterion, ac Mesaræon græci vo-  
cant. Arçam verò & ventrem, & omne intestinum vetustissimi græci  
appellabant, ex quo ad hæc vsque tempora hoc nomen Mesaræon de-  
riuatum est, latini Lactes appellasse videntur. Post grande intestinum  
colon appellatum Rectum est iuxta sedem ac principem. Quod ex or-  
biculo ventriculi fundo egerminat, ipsumq; & aliquam cæterorum **F**  
intestinorum partem velat, Epiploon græci, quasi Supernauigās, Omē  
tum latini vocāt. A renibus exoriens membrana, omnibusq; prætenta  
intestinis Peritonæos est. At propè intestini primum exortum posita  
caro præpinguis, glandulisq; interfuncta Pancreas vocata est.

### De Iecore, & in eo contentis. Cap. XXVIII.

**A** Dextra ventriculi Iecur est. Iecoris autem pars Transuersum se-  
ptum, Peritonæumq; attingens conuexa, quæ infra ventricu-  
lo inhaerescit, Caua dicitur. Sub maxima eius fibra bilis vasculum fi-  
tum est, cuius media & angusta particula Ceruix est, infima Fundum. **G**  
Iecoris Porta vena est, per quam alimentum illabitur. Quæ in sacrifi-  
cijs autem aruspices Portas, Mensam, Gladium, & Vnguem appel-  
lant; in homine quoque, sed obscura & atque incerta reperiuntur: ad  
nullumq; medicinæ profectum necessario nominantur.

### De Liene, Renibus, Vesica, Vrinarijs, Seminarijsq; uasculis. Cap. XXIX.

**V** Entriculo à sinistra Lienis incumbit, cuius crassissima summaq;  
pars Caput est. propè vltimas autem costas Renes duo: ex qui-  
bus duo vrinae ductus Vreteres græcè appellati vesicam intrantes pro- **H**  
deunt. Vesica verò conceptaculum est, in quod vrina è renibus per vre-  
teres delabitur, à vesica est Ceruix, Sedimentum, Trans, & reliqua cō-  
memorata superius. At seminaria vascula quatuor sunt, duo varicosa,  
duo Glandulosa: quæ Genitales etiam venæ vocatae sunt. varicosorum  
partes illæ, quæ testibus adiacent Asseffores dicuntur. Quidã verò om-  
nia Asseffores appellari nihil laborant. Cæterum an hæc eadem in fœ-  
minis perinde, vt in maribus, constituta sunt, contemplandum est. Fœ-  
minas varicosis assefforibus carere Herophilus planè existimat, nos ve-  
rò in pecudis vtero è testibus enata vascula, atque vtrinq; varicis instar



**A** reuoluta conspeximus. hæc autem in vteri cauum perforata subibant: e quibus mucosus quidā humor, si quis exprimeret, emanabat, magnaq; erat spes hos seminarios esse canales, & eorū generis, qui varicosi nuncupantur. id autem vt se habeat, dissectiones seorsum declarabunt.

De musculis Lumborum. Cap. XXX.

**I** ntra lumbos musculi Psoæ græco vocabulo nominantur: qui soli etiam in dorso lumbis agnati sunt. Istos aliqui Vterales nervos, alij Vulpes cognominant. atq; in libro Cnidiarum sententiarum nomen istud scriptum est. Si renum autem morbus vexat, notæ hæc sunt, si lottum crassum purulentumq; sit, si dolor lumbos, ilia, inguina, fumenq; torqueat, tum verò & vulpes male habet. Vnde iam constat, quanti ista scire interfit: quò ea, quæ sic cognominantur, agnoscas. Clitharchus exteriores dorsi musculos Psoas, Vterales nervus, ac Vulpes appellari falso opinatur.

De Genitalibus foeminarum Loci. Cap. XXXI.

**G** enitale autem mulieris membrum græcè Metra & Hystera, latine Vterus Vuluaq; vocatur. Hippocrates & Delphyn & Genituram dicit. Eius sursum versus vtrinque processus Cornua et Cirri sunt ipsam exterius sustinentia vasa. medium atq; supremum Fundum est. quæ vtrinque sunt, Humeri: eius extremitas Ceruix, atq; Collum. colli Hostium primus meatus: Hippocrates græcè Amphidion à rotundi ferri, quò præfiguntur aratra, similitudine vocat. deinde cauum, quod sequitur, multis appellatiōibus exprimitur. muliebris enim Sinus dicitur, muliebres loci, Vterus, ac Vulua. Sed totum genitale cum exterioribus Pudendum, obscœniori que vocabulo cunnus.

De testium tunicis, alijsq; partibus. Cap. XXXII.

**A** T circa testes tunicæ sunt latinis carentes nominibus, à græcis autem Erytroides vna, Dartos altera nominatur. nervus quoque cum arteria concavus ad testem peruenit, qui Suspenfor à nostris dici potest: Cremaftera græci nuncupant. venulæ pariter ad testes, vnde nutriuntur: hæque testium Altrices nominantur.

De venis. Cap. XXXIII.

**A** liarum quoque venarum nomina, (vt semel dicam,) hæc sunt. si gracilem tunicam habet, sanguineq; complentur, Venæ sunt. omnes verò magnæ venæ Ventres appellantur. postea inter medicos vsus obtinuit, vt ea vena, quæ à iecore in renes propagines mittit, Caua



diceretur. in ea Praxagoras initium esse febrium affirmavit: solamque **E**eam Cauam ipse nominavit. Caterum alij & eam, quæ sursum in cor per transversum discrimen euadit, alij & hanc, & priorem vnico vocabulo Hepatitin, (latinè Iecorariam dixeris,) vocitat. à liene exeuntem Splenitin, idest, Lienariam. Caterum non, quemadmodum in iecore, ita & in liene sursum versus, deorsumque in sinistra parte discurrens vltra vena reperitur. qui verò id asserunt, impudenter mentiuntur: quandoquidem venulæ in lienem pertinentes & graciles sunt, & ibidem in liene finiuntur. Philistio italus medicus pro doriensium eam partem incolentium more quasdam venas, quæ per tempora in caput ascendant, Aquilas vocat. venas à corde illicò nascentes Dracontidas Hippocrates nominat. Herophilus venam crassissimam grandissimamque **F**ex corde pulmones petentem Arterialem appellavit. in pulmonibus enim contra, atque in alijs, res habet. nam venæ in his validæ sunt, proximæque ad arteriarum naturam accedunt: arteriæ contra imbecillæ, venarumque naturam sapiunt. Omnium autem quos nouerim, primus Dionysius Oxymachi Efflorescentiâ, græcè Epanthismon nomen nouum adinuenit. aitque Eudemus Efflorescentiam venam appellari. Sed mihi quidem Dionysius rem venæ similem efflorescentiam, neque idem venam atque efflorescentiam, sed quoddam aliud aduentitium sanguinis receptaculum vocare visus est: idque ipse ita esse testatus est **G**eodem loco sæpius venam, efflorescentiam, arteriamque inculcans, ac repetens. neque enim, si rem eandem venam efflorescentiamque putaret, ita vnquam locutus esset. nam etsi nihil aliud efflorescentia, quàm vena est: nihilominus ipse aliter sensit, atque appellavit.

## De Arterijs. Cap. XXXIII.

**A**Rterijs præterea vetustissimi græci Venæ nomen imposuerunt: cumque venas micare dicebant, arterias intelligebant. arteriarum enim micare, seu palpitare munus est. Eas etiam tortas, & spirabilia vasa, & cauernas, & inanitates, & neruos appellarunt. Aortam verò eam præcipue Aristoteles vocat, quæ per dorsum omnium maxima fertur. hanc Crassam Praxagoras appellare cōsuevit. Cauas autem per col- **H**lum subeuntes Carotidas, idest, Somniferas antiqui nominarunt: quoniam compressæ hominem sopore grauabant, vocemque adimebant. Caterum nostro sæculo non arteriarum, sed neruorum sensoriorum propè iacentium id vitium esse compertum est. quare si nomen permutare volueris, nihil peccati admiseris.

De



**A** De Neruis Tēdonibus, Cartilaginibus, Mēbranis, Tun-  
nicis, Adipe, Carne, atq; Medulla. Cap. XXXV.

**N** Erui à cerebro, spinæq; medulla prodeuntes Actiui, Sensorij  
Electiui, atque Toni: qui circa artus sunt, Copulatiui dicuntur,  
crassæ autem ex occipitio propagines, quæque ad calcem è musculo na-  
scentes feruntur, Tendonis vocabulum habent. Cartilagines sunt, in  
quas ossa degenerant, neruis duriores. Membranae tenuia sunt velamē-  
ta: Tunicae, crassiores. Adeps pinguisima est alimenti concretio. Caro  
autem in visceribus illud est, quod inter vascula concretum reperitur,  
**B** subtegmen quoddam, ac veluti receptaculorum texturæ factum: quò  
inania eius spatia compleantur. In musculis Caro pars fibrosa ac firma  
est, & quæ in vlceribus, ossiumque cauis recens concrescit. Medulla ve-  
rò in dorso Dorsalis, in vertebriis Spinalis, has etiam ambiens membra-  
nula Spinalis dicitur. Medulla intra caluam cōtenta cerebrum est: Sed  
in alijs ossibus Ossalis vocatur: siue in magnis insit cauis, vt in femore  
atque humero, siue in angustis foraminibus, quas Serangas, id est, ca-  
uernas, vocant: vt in costis ac iugulis.

De Humoribus, Excremētisq; corporis. Ca. XXXVI.

**S**anguis calidissimus est, flauissimusque succus. Pituita album cras-  
sum, ac subsalsum excrementum est: quod cum resiccatur, nigre-  
scit. Bilis flaua amarum est, ac flauum excremētum. Porracea acris est,  
atque subuiridis: Aeruginosa verò est valde mera, atque syncera. Atra-  
bilis autem Sanguinis crassamentum est. Alij nigrum sanguinem atrā  
esse bilem asseuerant. Reliqua excrementa huiusmodi sunt: Salua qui-  
dem oris est humiditas. Mucus falsum est cerebri purgamentum. Su-  
dor est per omne corpus effusa humiditas. Vrina est nitrosus humor in  
vesicam delabens. Flatus est in intestinis superuacuis spiritus. Cypse-  
lis sunt aurium sordes, quas Cerumina, aut Marmorata veteres latini  
**D** appellabant. Menses in mulieribus sunt menstrua per vuluam sangui-  
nis excrementa: quæ cum alba sunt, non menses vltra, sed Profluuium  
nominatur. Lac est in mammis alimenti concoctio. Semen, græcè Sper-  
ma, Thora, et Gonos, hoc est, Genitura idem significant. id verò est spi-  
ritus simul, atq; alimenti genitalis in asessoribus concoctio. Praxago-  
ras peculiari quodam modo succos nominauit, Dulcem, Tempēratū,  
& Vitreum. hos à pituitæ specie sic vocauit: item Acidū, Nitrosum, Sal-  
sum, & Amarum. hos ita, vt gustatus iudicat, appellauit. alios præterea  
Porraceum quidē ex colore, Vitellinū verò ex crassitudine: alios quoq;  
Abraforios, quoniam ad rasuram parant: alios Stagnantes, quòd in ve-



nis inhæreant, neque in carnem subeant, quia tenues, intra venasq; absorpti quiescunt. in summa omne liquidum Praxagoras Chymon appellat. At Mnesitheus quod liquidum est, Chylon, idest, Succum nominat: Sed gustatilem qualitatem, siue in arido, siue in liquido positam Chymon, idest, Saporem vocat. Calorem autem, atq; Spiritum Zeno idem esse censuit. Sed medici distinxerunt, Spiritum, quem spirando trahimus, Calorem autem spiritus elisione appellantes. Alij vitæ quoddam principium calorem esse dixerunt.

### De Foetu, & ad eum pertinentibus. Cap. XXXVII.

**F**oetus membranis inuoluitur: quarum tētiem ac molliorē Amnion vocat Empedocles, Agnina latine dicito. Inde & Hilithya, quæ partui præest, Amnias mihi agnominari visa est: non à Crete, ut alij existimant, quodam portu. Nos hanc tunicam dissecentes, humoris cuiusdam longè illo, qui in secundis continetur, mundioris plenam inuenimus: accurateque æstimantibus veluti quidam foetus fudor videbatur. per vrinaculum verò humorem quendam in secundas instar vrinæ transfundi cognouimus. Sed Amnion interior foetui, secundæ exteriùs vuluæ brevis atque venosa tunica adhærebant, è secundis Umbilicus oritur ex duabus venis totidemque arterijs compositus, & ex quinto appellato Vrinaculo, breui vasculo, vtrinque cauo, è vesicæ fundo in secundas intrante.

Plurima in homine reperta huiusmodi appellationibus insignire oportet. quòd siquid in his omissum fuerit, non ideo tamen plurima ob pauca quædam conuiuentibus oculis præterita aspernari conueniet.

## R V F F I E P H E S I I

### DE CORPORIS HVMANI PARTIVM APPELLATIONIBVS

Quæ in altero libro primo continentur.

Quæ sit libri necessitas.	cap. i.	H
Quæ sint maximæ corporis partes.	cap. ii.	
De Capite eiusque partibus vsque ad nasum.	cap. iii.	
De Naso & alijs faciei partibus vsque ad Labia.	cap. iiii.	
De Oculorum partibus.	cap. v.	
De Malis, Maxillis, & Mento.	cap. vi.	
De Aurium partibus.	cap. vii.	
De Ore, & in eo contentis.	cap. viii.	
De Collo, & eius partibus.	cap. ix.	



De Epomide, Humero, Scapulis, Alis, & reliquis vsque  
ad Extremam manum. cap. x.  
De Pectoris ac Dorſi partibus. cap. xi.  
De Ventris, ſeu Alui partibus. cap. xii.  
De Virilis membri partibus. cap. xiii.  
De Foeminarum locis. cap. xiiii.  
De Dorſi oſibus, extremisq; eius partibus. cap. xv.  
De Inguinibus, Crurisq; totius vsque ad extremum  
pedem partibus. cap. xvi.

R V F F I E P H F S I I

DE CORPORIS HVMANI  
PARTIVM APPELLATIONIBVS

Alter Liber primus.

Iunio Paulo Craſſo Patauino Interprete.

Quæ ſit libri neceſſitas. Cap. I.

A



Iſquis ſidibus canendi artem doceri cupiat, ante omnia  
fides peritè tractare, ſingulasq; proprijs nominibus ap-  
pellare diſcat, neceſſe eſt. Grammatikæ ante legendi,  
ceteraq; doctrinæ ſcientiam, elementorum nomina  
pueros prædocent. nec non in Geometria, quid linea  
ſit, quid ſuperficies, quid planum, quid figura triangula, quid circulus,  
id genusq; alia, quoq; ritè nomine appellentur, prædiſcere opus eſt.  
in alijs itidè artibus prænotiones vocabulorū ſimiliter edocent. Medi-  
cām itaq; artē capere optantibus elemēta prius tradere perquā ne-  
ceſſariū eſſe duxi: vt quæq; videlicet corporis pars rectè nominanda ſit.  
quandoquidè diuiſiſſimus Hippocrates in libro, qui inſcribitur, De lo-  
cis in homine, ita loquitur. Corporis autem natura ſermonis in medici-  
na principium eſt. Nos igitur etiā à ſimplicioribus exteriusq; aspectui  
ſubiectis exorſi eorum prænotionem appellationesq; trademus.

B

Quæ ſunt maximæ corporis partes. Cap. II.

Maximæ corporis partes Caput, Collum, Thorax, Manus, Cru-  
ra; ſunt. Thoracem non ſolum à iugulis ad præcordia vsque,  
ſed totum à iugulis vsque ad genitalia vocamus.

De Capite, eiusq; partibus, vsq; ad Naſum. Cap. III.

Caput, quod capillis inteſtum eſt, ſimul etiam cum facie & alia  
ſic appellantes comprehendimus. prior capillata pars Synciput

X ij



dicitur: in quo & futura est, quoniam ipsi coronas circumponimus, E  
Corona vocata. posterior Occiput. partes ab utraque syncipitis parte  
Tempora: pars media qua maximè conuoluuntur capilli, Vertex: sub  
syncipite Frons sita est. in temporibus pilorum exortus Iuli græco vo-  
cabulo, latine Lanugo: posteriores occipitis pili à græcis Chætæ, à no-  
stris Crines dici possunt. vltimam frontis rugam Episcenion græci di-  
cunt, quod Supertentorium nostris sonat. partes frontis pilis hirtæ Su-  
percilia sunt: horum media intercapedo Mesophryon apud græcos est,  
romanis Glabella. inde Nasus porrigitur.

De Naso & alijs faciei partibus vsq; ad Labia. Ca. I III. F

**N**asi extremum Globulus dicitur. quod nasum in duas cauernu-  
las distinguit, Interseptum. à globulo carnosum quoddam in  
labium descendens Columna est. nasi caua ab utroque intersepti late-  
re, per quæ olfactus præstatur, Nares vocantur. nasi Alæ, seu Pinnae hu-  
iusmodi caua ambientes sunt. sub columna subsidens cauitas supra la-  
bium Philtron græcè, latine Amatorium dicitur. totum verò, quod in  
fra nasum supra labia est, Hyporinion appellat. deinde Labia duo, quo-  
rum summa Prochila græci dicunt. tu Prolabia, si lubet, dicito. quæ cõ-  
mittuntur autem Prostomion est.

De Oculorum partibus. Cap. V. G

**S**ub superciliis Oculi sunt. quæ oculos contegunt, Palpebræ sunt.  
Harum altera supra, altera infra est: quarum in conuiuendo con-  
gressus Tarfos vocant. pili ex palpebris enati Cilia sunt. Tarforum ex-  
trema Anguli magnus naso, exiguus tempori finitimus. Coræ pupillæ  
sunt: Glenæ oculorum media, per quæ videmus. Alij Pupillam id vo-  
cant, quò videmus, Coram autem & Glenam simulacrū in pupilla cõ-  
spicuum. post hæc autem quæ sunt nigra, cæsia, aut splendida, à colore  
nominantur Iris: circulus est prædicta albo continuans. Sub oculis lo-  
ca Hypopia græcè, latine Subocularia sunt. H

De Malis, Maxillis, & Mento. Cap. VI.

**H**is insurgentes eminentiæ subiacent Malæ vocatæ: quæ per pudo-  
rem erubescunt. sub his Maxillæ, seu Mandibulæ. quarum infe-  
rioris extremum in acutum definit, Mentumque est. à quo vsq; ad in-  
ferius labium os fit rotundum, atque prominens. sub mento carnosâ  
pars à græcis Anthereon, seu Leucania dicitur. veràm alij Anthereo-  
na hanc partem, Leucaniam verò cauitatem iuxta iugu-  
lum appellant.



## A De Aurium partibus. Cap. VII.

**A**uriculae eminentiae sunt ab utroque tempore iuxta extrema collocate. quarum cauernulae Meatus Auditorij vocantur: per quos audimus scilicet. harum inferiores carnosaeque partes Fibrae sunt, superiores cartilagineaeque Pinnae. Helices, quae deinde circumferentiam ambiunt: Anthelices vero in medio post helicem extumescences prope canitatem particulae. cavitates ipsae Conchae dicuntur: conchae oppositae prope temporis finem elatio Tragus, id est Hircus vocatur: huic opposita ex crassiore anthelice Antitragus.

## B De Ore, &amp; in eo contentis. Cap. VIII.

**O**es est prima labiorum diuisura, & reliqua omnis usque ad fauces inanitas. in ore & alia quaedam, & Dentes sunt: quorum priores octo Incisores dicuntur. Canini hos sequentes quatuor. reliqui omnes viginti Molares. sunt horum extremi atque interius conditi Sophronistres, id est, Moderatores ac Temperantes nuncupantur: qui tum, cum sapere incipimus, oriuntur. Genuinos latini vocant. dentes circumplexae carunculae Gingivae sunt: quarum commissura Habena dicitur. latera molarum dentium summities Mensae nominantur: maxillarum cavitates, in quibus dentes defixi sunt, Mortariola atque Praesepia. Linguae exitum Radicem vocato: Cervicem, quod sequitur: eius summum Proglotton, quasi Prae linguam dixeris: eius latera Parasira, id est, assequentia. quod est infra linguam Hypoglossis est: Epiglossis, quod interius supra guttur est arteriae asperae tegumentum: quod inter deuorandum nihil in pulmones decidat: inter spirandum vero, ne spiritus ascensum impediatur, extollitur. Quod supra linguam in orbem cauum est, Caelum, Palatum uero dicitur. quae deinde superius pendet caruncula, Columella est: quam alij Gurgulionem, Vnam alij vocitarunt. ipsi subiicitur Arteriae Asperae caput.

## De Collo, &amp; eius partibus. Cap. IX.

**D**einde Collum & Dera graece, cuius prior pars Bronchus, & Aspera Arteria: Circa medium prominentia Guttur: aversa pars Cervix & Occipitium: prope iugula cauum Anticardium & Iugulatio nuncupatur.

## De Epomide, Humero, Scapulis, Alis, &amp; reliquis usque ad Extremam manum. Cap. X.

**A**tendone autem ad humeros pertinentia Epomides nominantur. Humeri capita sunt eorum ossium, quae a graecis Brachiona, a nostris etiam Humeri vocantur. Sceptula operata siue lata scapularum



ossa tergo imposita lata ossa sunt: quorum media eminentia Spina est. **E** iugulorum latorumque scapularum ossium copulae Acromia dicuntur. continenter Claves adsunt, seu Iugula. Ala est sub humeris cavum, in quod frequenter humerus luxatus delabitur. deinde Humerus est, qui Brachion à grecis vocatur. articuli angulus, quo nitimur inclinari. Ancon est, siue Olecranon: latine Cubitus. Quod sequitur, Vlna, siue Lacertus siue Brachium est: quod brachiali terminatur: postea Palma: deinde manus Pectus, alij Hypothenatron vocant, sub pollice est: postea est manus cavitatis, quae Vola nominatur. Ex digitis vnus ab alijs distans Magnus, Pollexque dicitur. Index autem inter alios quatuor primus est, alter Medius, tertius Anularis, vltimus Minimus, horum ossa Scuticulae, aut Phalanges, aut Internodia vocantur. quorum curvatura **F** Condylis, sed primae Procondyli, vltimae Metacondyli, omnes à latinis Nodi vocati sunt. vnguium initia Radices vnguium appellantur: digitorum extrema Acini, aut Cacumina. interstitium anularis ac pollicis, Thenar est. Hippocrates autem totum hunc locum Thenar appellasse visus est: qui apud latinos Volae nomen habet.

De pectoris ac dorsi partibus. **Cap. XI.**

**A** Iugulis autem in parte priori Pectus ac Sternon est. Tergum vero posterius à cervice ponitur. Deinde quod appellant Metaphrenon, hoc est, pars è regione septi posita. sequuntur Lumbi pars dorsifima. in pectore carnosae eminentiae Mammae sunt, quarum summa Papillae: totum, quod sub ala deorsum versus protenditur, Iatus est. ossa Costae & Spathae. quarum primae inter se committuntur ad terminum ossis, quod greci Sternon, Latini Os pectoris nuncupant: quae cor situm est, Septum transversum aliqui Phrenes, aliqui Procardiam, quasi ante cor positum, aliqui Cor nominant. post ipsum est ventriculi Hofium. inter costas spatia Intercoastalia vocant. Spuriae costae sunt, quae non inter se coeunt. Haec in cartilagine degenerant.

De Ventris, seu Alui partibus. **Cap. XII.**

**M** Vsculosae partes sub cartilaginibus Hypochondria graece, Subcartilaginea latine, à quibusdam Praecordia dicta sunt. Deinde Aluus est: quem alij Ventrè nominant. quod in medio est, Epigastrium graeci vocant: super ventrè scilicet cutem. media cavitatis Umbilicus est, ei circumdata cutis Vetula vocatur: quod ea corrugata senectate adesse significat. quod sub umbilico ponitur, Abdomen ac Sumen est. quod postea ad genitalia usque pertinet, Epifision, Pubes, ac Pecten dicitur.



A De Virilis membri partibus. Cap. XIII.

**G** Enitalium maris quod pendulū est, Sterna græcè, Coles latinè, Penisq; dicitur. quod nō pendet, Hypostema hoc est, Sedimentum, aut Perinæus. eius extremum Præputium est. Scrotum quo testes continentur, appellatur. eorum superior pars Caput est, inferior Fundum. partem laxiorem scroti Laccopedon dicunt.

De Fœminarum locis. Cap. XIII.

**M** Vliebrium locorum pars superior Pecten est: Fissum verò prima diuisio. in medio sita musculosa caruncula Myrton, aut Nympha est. Myrtorchila verò à lateribus collocata pinna.

De dorsi ossibus, extremisq; eius partibus. Cap. XV.

**D** Orti ossa Vertebrę sunt. vniuersa vertebrarum compago Spina dicitur: cuius infima pars Lumbi: postremumque dorsi Sacrum os est: quod aliqui Hypospondylon, idest, Subvertebrum, vt verbum verbo reddatur, appellarunt. Huius extremum Coccyx est, latinè Cuculus. à lumborum lateribus Nates sunt. post lumbos carnosę partes Clunēs appellatę sitę sunt: quę & Ephedrana, quod sedendo commodę sunt, à græcis nominantur.

De Inguinibus, crurisq; totius, vsq; ad extremum pedem partibus. Cap. XVI.

**I** Nguna sunt femorum principia. femorum partes interiores Femina sunt, quę partes inter has perinæumque sunt, Plichades à græcis dicuntur. Musculi ad gentia tendentes Epigunides græco nomine vocantur: ossa superiacētia Epigunatides. hæc Hippocrates Molas vocat, latini Patellas. Genu est femoris cum crurē connexio: sub quo Poples est. Sura est posterior magnus cruris musculus: vnde Latus Nerus ad calcem tendit: ossium verò posterius item Suram, prius Tibiam dicito: extrema pedibus propinqua Malleoli, à nonnullis Tali, sed non rectè, dicuntur. Tali tamen & ipsi adsunt, sed non oculis conspicui. Calx posterior est pedis rotunda pars: postquam Canum pedis est. post hoc verò Planta, seu Vestigium. cui oppositum supremum Tarsus est. totum verò pedis situm Pezam græci vocant. Pedum digiti manuum digitis appellationibus respondent.



# R V F F I E P H E S I I

## DE CORPORIS HVMANI

### APPELLATIONIBVS

#### Liber Secundus que contineat.

Libri continuatio, atque propositum.	cap. i.
De Cerebro, eiusque tunicis, & enatis.	cap. ii.
De Oculi partibus.	cap. iii.
De eis, quæ ore continentur.	cap. iiii.
De Pharynge, idest Aspera Arteria, et Gula, et Pulmone.	cap. v.
De Iecore, Bilis conceptaculo, & Venis Portis vocatis.	cap. vi.
De Liene.	cap. vii.
De Corde, ab eoque enatis, & adiacentibus.	cap. viii.
De Pectoris partibus, & Septo transuerso.	cap. ix.
De Gula, & Ventriculo.	cap. x.
De Intestinis, & Lactibus.	cap. xi.
De Renibus, Vrinarijsque meatibus.	cap. xii.
De Omento.	cap. xiii.
De Seminarijs conceptaculis, & Semine.	cap. xiiii.
De Scroto, Testibus, eorumque membranis.	cap. xv.
De Vtero.	cap. xvi.
De Venis, Arterijs, multisq; alijs corporis particulis.	cap. xvii.

# R V F F I E P H E S I I

## DE PARTIVM CORPORIS

### HVMANI APPELLATIONIBVS

#### Liber secundus

#### Iunio Paulo Crasso Patauino Interprete.

#### Libri continuatio, atq; propositum. Cap. I.



Ostea quàm extimarum corporis humani partium ap-  
pellationes exposuimus, deinceps continuata serie ad  
latentium, internarumque notitiam transeamus: quip-  
pe cum à viris sapientibus homo exiguus quidam mun-  
dus appelletur, cœlestis ordinis emulus, in membrorū  
fabrica, actionibusque præstandis varium effectuum artificium possi-  
dens.



**A** dens. quemadmodum igitur reliqua medicinae praecepta, ita & quae ad dissectionis artē faciunt, referenda sunt. Quam ob rem artis principia, ac veluti fundamenta illustrioris doctrinae causa iacentes, quem situm membris natura tribuerit, eorumque simul nomina explicabimus.

### De Cerebro, eiusque tunicis, & enatis. Cap. II.

**I** Taque in capite intra calvariae concavum suis cum velaminibus cerebrum includitur: proque corporis mole longè maius in homine quam in ceteris animantibus reperitur. eius substantia pulcrae similis est, viscida atque praecandida. Post id in occipitio vocatum Cerebellum collocatur. Tunicarum prima calvariae ossibus affixa est: quae pulsatario etiam motu cietur: altera cerebro circumdata ipsum dissipabilem conferuat, eiusque fragile corpus in unum cogit ac retinet: utraque nervosa membranosaque est, exiguo intersitorum vasculorum sensu praedita. interius condita motu caret, exterior mobilis atque crassior est. A cerebro medullae processus exoritur per calvariae foramen in occipitio erumpens: per vertebrarumque omnium caua ad extremam usque delabitur. neque propria tamen cerebri substantia est, sed emanatio, quae Spinalis medulla vocatur. Meatum vero processus sunt à cerebro nervosi ad singula sensoria, ut ad aures naresque, & huiusmodi alia propagati. unus autem à basi prorsum versus in duos diuisus progreditur, et ad utrumque oculum pergit: qua parte vocata Peluis est, atque instar foueae iuxta utranque nares faciei cauitas: ubi tunicarum oculum componentium plexus efficitur.

### De Oculi partibus. Cap. III.

**E** Arum tunicarum prima nimirum ab ordine Prima, à colore vero Candida vocata est: quemadmodum & cicatrices eius candelae indicantes ostendunt. Tunica igitur prima Candida vocatur: & Cornicularis, siue Cornea: aut propter firmitatem, aut quoniam interius conditus humor per hanc, tanquam per corniculum pellucet, aut quod instar cornu in corpuscula Ctedonas vocata, id est, fibras aut filamenta resoluitur. Secunda vero primae per appensionem usque ad vocatam coronam adnexa est. quae media dehiscit, atque orbiculari cauo perforatur: cauatum autem corpusculum exterius, qua cornicularem attingit, leue tersumque est: in auersa parte asperum, (ut inquit Herophilus) quale vuae acini corium esse solet, vasculis perplexa haec tunica est: quae Secunda ab ordine, Perforata à structura, à similitudine Rhagoides, latine Acinalis, aut Vualis: Choroides etiam, quod instar secunda-



rum, quas Chorion græci vocant, vasculis sit multis irrigata, nominatur. Tertia ab eodem meatu progressa tunica humorem oui albo similem, Vitreumque appellatum includit. est hæc prætenuis, vocaturque ab humoris concretionem Vitrea, à tenuitate Aranealis, à vasculorum contextu figuraque; Reticularis: quippe quæ ex angusto in latum diffunditur, sinuaturque: quò Quartam tunicam humorem crystallo similem continentem inuoluat, cuius dimidium prominet secundæ tunicæ foramini contiguum, dimidium cum araneali committitur. Hæc igitur tunica Discoides, id est, disco similis, aut Lenticularis à figura vocatur, aut à concreto humore Crystalloides. nempe quidam hanc neque; Tunicam appellandam esse censent: nam membranofam quandam congelationem esse dixerunt.

De his, quæ ore continentur. Cap. IIII.

**D**Einceps ad ea, quæ in ore latent, descendamus. Lingua primum turbinata figura consideretur, à lato in angustum gracilescens, à faucibus radices ducens, carnosio & quodammodo nervoso corpore, in cibis atterendis deuorandisque mobilis: præterea & ad articulatæ vocis creationem emissum aerem secundum animi inclinationem conformans, gustatoriumque sensum participans. In huius basi Epiglottis vocata exoritur, ceu quædam exigua lingua supra eius latitudinem affurgens, in faucibus ex latiore basi in angustum finiens, cartilaginea materia constans, faucibusque cognata. hæc asperæ arteriæ operculum, & ciborum in gulam descensus iter quoddam est. Supra epiglottida autem supernè Columella dependet, ex palati partibus secundum eius foramina exoriens. hæc & Vua ab extremitatis rotunditate vocatur, nullam magni faciendam vtilitatem afferens. vnde fit, vt ea recisa nulla corporis actio vitietur. In penitioribus autem ab vtraque linguæ parte affixæ Tonillæ sunt, numero sex, corpore gládulosæ, figura subrotundæ, natura facilè mutabiles, atque dissipabiles, membranulis quibusdā alius infertis cōuolutæ. ex his quatuor ab utroque latere cernuntur, duæ vero cerni vix queunt. Has græci vocant Paristhmia, quòd in angusto meatu sitæ sint. veteres enim græci locorū angustias isthmus appellabāt. Antias verò, quasi cōtrarias dicas, iccirco etiā nominabant; quoniā ore aperto inter se cōtrariæ, præsertim quum inflammatae sunt, appareant.

De Pharynge, id est, Aspera Arteria, & Gula, & Pulmone. Cap. V.

**I**Nde à palati ac linguæ partibus duo itinera patefiunt. horum prius Pharynx græcum vocabulum habet. inter hoc & colli vertebrae



- A** Gula est. Pharynx cartilagineus est, atque in orbem patens, superius latior, infra verò angustior. per iugula autem, appellatumque Antisternum non, id est, spinam dorsum, quæ pectori opponitur, descendens in medios pulmones inseritur: ipsosque anulis, quæ Bronchia vocant, intexit. huiusmodi membrum Aspera Arteria, quod istis anulis asperata sit, dici meruit. Bronchus etiam à quibusdam vocatur, ad aeris inspirando ducti transitum, vocemque edendam à natura constitutus. De ipso Pulmo suspenditur rarus ac peruius, pectoris inanitate conclusus: Idem globosus est, murisque caudæ figura speciem representans. in fibras quinque diducitur, colore cinereo atque subalbido. assidua motione
- B** concutitur, follis morem in spiritus transitu retinens. quippe spiritus per asperam arteriam in bronchia tractus per pulmonis spiramenta intra pectoris cauum elabatur: atque iterum foras ab hoc per naturalia foramina propellitur.

De Iecore, Bilis conceptaculo, & uenis Portis uocatis.

## Cap. VI.

- A** B utrisque præcordijs Lienis Iecurque iacent. sub pulmone à dextris Iecur est, transuerso discrimini magis appensum, posteriori parte in gibbum assurgens. in quatuor, aut quinque fibras dirimitur, colore lentis, ad rubicundius tamen vergit, venoso corpore iuxta, atque sanguineo. Venas autem, quæ caue per interseptum ad cor tendenti committuntur, Ora Portasque vetusti scriptores nuncuparunt. Sub conuexa parte pusillum quoddam Vasculum vesicæ simile defixum est, nervosum, fellisque inibi geniti capax: à quò sanè meatus quidam nerveus per lactes ad intestina contendit: per quem paulatim bilis in intestina delabatur, excrementaque felleo colore suffundit, atque ipsa depellendi cupidinem infert. Hoc intercluso itinere aurigo futura portenditur bile per omne corpus effusa. quocirca albidæ cretaceæque deiectiones exeunt. Est autem præseruidum igneumque iecur plurimum ad se alimenti attrahens, ac finitimis partibus communicans. iccirco sinistris dextræ partes viribus præstant.

De Liene

## Cap. VII.

**A** T Lienis iecori contrarius in sinistris præcordijs iacens opponitur, ad humani vestigij longitudinem protentus, superius rotundus & robustus, infra contractus & gracilis, medius angustior, vini fecis colore perfusus, laxis ac foraminulentus, conceptaculis multis implicatus: signauum membrum, nulloque fungens ministerio.

Y ij



## De Corde, ab eoq; natis, &amp; adiacentibus. Cap. VIII. E

**P**vlmonis fibris Cor circumtegitur, intra pectus sedem habens secundum medium, magis tamen ad sinistram declinans, & sub sinistra mamma collocatur, pinei nuclei effigiem adeptus, & à lata base in mucronem instar turbinis acuminatum, musculosum natura atque neruofum, pullatorio semper motu percitum, medium inane, duobus manifestis finibus concauum, altero in dextris, qui Sanguineus, quòd multitudine sanguinis affluat, appellatur: altero in sinistris Spirituoso, quoniam spirituum copia redundat, nuncupato. inde fit etiam, vt spirituum agitatione moueatur. Membranis præterea vtrunque latioribus Auricularibus vocatis cor præcingitur: quoniam ad aurium imaginem cordis lateribus inhærent, & prominent. Ab ipso verò plura conceptacula nascuntur & venæ & arteriæ: è quibus omne corpus vasculis tanquam riuis emanantibus irrigatur. Membrana præterea quadam cor veluti sepimêto vallatur, eam Pericardion græci nominât, neruofam, tenuem, motuque à corde transfuso palpitantem.

## De Pectoris partibus, &amp; Septo transuerso. Cap. IX.

**H**æc omnia complectens Pectus ex cartilaginibus componitur atque ossibus: quæ in costis, pectorali osse, atque dorfi spina reperiuntur. neruorum etiam carniūque particeps extra carnosus, interior neruofum est. qua etiam parte succingente membrana vestitur. Interseptum autem, siue transuersum septum obliquum pectori, qua costæ finiuntur, subtenditur. id ita vocatum est, quòd viscera in pectore abdita ab inferioribus intersepit.

## De Gula, &amp; Ventriculo. Cap. X.

**A**superioribus igitur corporis partibus, quemadmodum supra retulimus, simul cum aspera arteria enascitur, secusque ipsam Gula protenditur, ab eisdem vtiq; partibus incipiens, non similiter autem desinens. Hæc tubæ imagine figuram amplitudine refert, supra angustior, infra verò, qua cum ventriculo cõmittitur, capacior. hoc quippe nomine superior venter natura neruofus vocatus est. munere autem sicci humidique alimenti deuorandi gula fungitur: cuius examen ipsa acutissimo sensu prædita facit. Ventriculus itaque à gula exoriens sub medio intersepto ad læuam magis reflexus collocatur ab angusto ore in latam capedinem sinuatus, cuius conuexum extra in abdomen vergit, simum verò dorsum respicit. longè, quàm gula, neruofior ven-



**A**trichulus est atque amplior. ipse nimirum intus accepta colliquans non magnopere se dilatat: sed cibi ingressui cedens eius descensum se constringendo insequitur: cū ad alimenta suscipienda à natura creatus sit.

De Intestinis, & Lactibus. Cap. XI.

**A**Ventriculo intestina in plures orbēs implicita ad cibaria, quæ ab eo delabuntur, excipienda formata prodeunt. horum vnum idemque ab ipso vocato processu ad rectum ac sedem vsque iter pertinet. inter quæ primum est, quod Hostiarius, aut Dodecadactylus dicitur: Hostiarius quidem, quod in ventriculo posita tantisper, dum sunt **B** coacta, custodiat: cū remissa sunt autem, tunc & hostiarius cum intestinis aperitur: quemadmodum ani musculus Sphincter, idest, Adstrictor vocatus remittitur. Dodecadactylus autem à duodecim digitorum longitudine vocabulum accepit: nervosa ipsius crassaque substantia est: hoc appellatum Ieiunum tangit alijs intestinis carnosius, semper ferè alimenti penuria laborans: vnde Ieiuni quoque appellationem adeptum est: quod in ipso videlicet alimentum, vt in ventriculo & intestinis asolet, non inuenitur. postea Gracilia quæ vocantur, intestina prolixa in multas spiras conuoluta, tredecim cubitorum longitudinē æquantia collocantur, & sub vmbilico in abdominis regione ponuntur. **C** Sub his omnibus Cœcum intestinum, & Colon eodem loco exoriantur: Cœcum quidem rectā in dextrum inguen spectans, altera ex parte obstructum: Colon verò, quod Maius intestinum latini vocāt, à dextris enascens, supernè sese circumuoluens, in iecur præcordiaque adductum incidit, deinde lienem sinistrumque ile petens posterius cum Recto intestino coniungitur. id nonnulli & Inferiorem ventriculum nominarunt: in quo etiam plurima cibi pars in stercus vertitur. omnium postremum Rectum est ceteris carnosius, rectamque sedem, vnde & nomen accepit, sortitum est. in Anulum autem & Sphincterā vocatum, idest, Adstrictorem desinit, eum quidem nervosum & durum, hunc autem carneum atque rugosum, infimum omnium collocatum. **D** Inter intestina medijs Lactes sunt, quos græci Mesenterij atque Mesaræi vocabulo insigniunt.

De Renibus, Vrinarijsque meatibus. Cap. XII.

**R**enes circa vltimas dorsi vertebrae siti sunt, numero duo, figura rotundi, colore lenticulæ, & quasi subcinereo. dexter paulo altior grandiorque inuenitur. denso squallidoque corpore constant: fauciat inevitabilem mortem afferunt. In penitis causisque eorum parti-



bus membranulae sunt instar cribri foraminibus plurimis pertusae. unde de meatu duo exeuntes vesicae summitatem intrant: per quos urina in vesicam transfunditur, indeque foras expellitur. hos paulo ante Meatus nominauimus.

De Omento.

Cap. XIII.

**O**mentum intestina contegit prepingue, duplicique membrana contextum. ipsum idcirco natura condidit, ut intestinis superfuitans ea aduersus ambientis peritonaei duritiam remolliret. recisum aut vulneratum vitae discrimine vacat.

De Seminarijs conceptaculis, & Semine. Cap. XIII.

**A**t Seminaria itinera secundum renes quatuor descendunt: bina recta tendentia, quos & Assessores et Glandulosos nonnulli vocant: bina Varicosa, quod varicis more circumflectuntur. intra haec fecundum semen gignitur, grandinosum crassumque: quare et ipsa nonnulli Genitales venas appellare voluerunt. in alteris autem est infecundum dilutumque semen, quod simul cum priore eius nutriendi causa excernitur. verum ab utraque parte coniugata simul utraque a dorso descendunt. sed sterilia vascula cum vesicae ceruice coalescunt: varicosa vero per inguina testiculorum tunicas subeunt. Quapropter eunuchi semen quidem, sed infecundum e glandulosis fistulis eiciunt: et varicosis vero excisis testibus feminis profusio seruari non potuit.

De Scroto, & Testibus, eorumque Membranis. Ca. XV.

**S**croto & tota ea laxitas est, in qua testes continentur, & magis proprie exterior carnosae pars, ex membranis constat exteriore quidem Darto vocata, quae rugosa est, interiore autem Erythroide. Nempe scrotum & dartos communia amborum testium inuolucra eos superioribus partibus suspendunt: sed Erythroides sibi ipsi adnectit, atque in orbem testes amplectitur, priuatim seorsumque singulos inuoluens. Ipsi Testes autem ex pulticulae simili materia constant, humidique admodum nervosa firmaque membrana includuntur.

De Vtero.

Cap. XVI.

**M**ulier autem genitale membrum, quod Vulua atque Vterus vocatur, inter conceptacula eximium est: inter vesicam rectumque intestinum ponitur huic incumbens, illi subditum, medicinalis cucurbitulae figuram aemulans. hoc loco venerei congressus exercentur.



A De Venis, Arterijs, multisq; alijs corporis partibus.  
culis. Cap. XVII.

V Enæ receptacula sanguinem continentia sunt, per quas sanguis in omnes corporis partes diffunditur. Arteriæ spiritus & quodammodo etiam sanguinis receptacula sunt: in quibus motio fit, quæ Pulsus communi vocabulo dicitur, & à corde exclusus spiritus per ipsas in omnem corporis molem dispellitur. Pinguitudo est alba oleosaque concretio, quam Adipem etiam nominant. Glandulosæ carnes, quas græci Adenas vocant, concretiones quædam subpingues atque carnosæ sunt, peculiariter cauis locis insitæ: alis, dico, & inguinibus, necnon & lactibus. Ossa coagumenta quædam sunt solida, sanguine & sensu carentia, per quæ actiua atque electoria motiones perficiuntur. Musculus corpus est firmum ac densum, non simplex, sed ex nervis, venis, arterijsque compositum, sentiendi particeps, officium voluntariæ motionis obiens. Cartilagines autem concretiones sunt mediæ inter ossa nervosque naturæ: ossibus enim molliores, nervis duriores sunt, præcipue ossium extremitatibus coalescentes. Nervus corpus est simplex atque densum, voluntarij motus instrumentum, obtusi, dum inciditur, sensus. Secundum Erasistratum quidem & Herophilum sensorij nervi sunt: Asclepiades autem ipsos sensu vacare testatus est, ceterum secundum Erasistratum cum gemina nervorum natura fit, sensoriorum videlicet, atque mouentium: sensorij, qui caui sunt, in cerebri membranis originem habent; mouentes in cerebro ac cerebello. Dixit autem Herophilus aliquos esse voluntati obedientes nervos, qui & à cerebro spinalique medulla oriuntur: aliquos, qui ab osse orientes in os inseruntur: aliquos à musculo in musculum transeuntes, qui articulos etiam copulant. Medulla substantia est vnguinosa & exanguis, quæ semper in ossium cauis includitur.

D Quæ tertius Ruffi Ephesii liber contineat.

- |   |            |
|---|------------|
| De ossibus Capitis, & futuris, & cauis.                               | cap. i.    |
| De Colli vertebribus, Humeris, Scopulis opertis, & eorum processibus. | cap. ii.   |
| De Iugulo, ossibus Humeri, Brachij, & Manus.                          | cap. iii.  |
| De Dorsi Lumborumque vertebribus, & costis.                           | cap. iiii. |
| De Coxa, Femore, & reliquis vsq; ad extremum pedem ossibus.           | cap. v.    |



R V F F I E P H E S I I  
DE MEMBRORVM HVMANORVM  
APPELLATIONIBVS

Liber tertius.

IYNIO PAVLO CRASSO PATAVINO

INTERPRETE.

De ossibus Capitis, & futuris, & cauis. Cap. I.



Osteaquàm interiorum locorum naturam nominaq; **F**  
pro viribus superius exposuimus; modò de ossibus fer-  
monem subiiciemus. Caluaria igitur, quã partẽ vocata  
Scaphula est, globosa cernitur, in vertice extuberans, in  
syncipite subcrassa aliquantulum, & lata, atq; per ossis  
iniectum duplicata, circa tempora compressa, plerunq; futuris quinq;  
diuisa: Vna in vertice in posteriore partẽ tendẽte, quẽ à literæ lambda  
similitudine Lambdalis nomen habet: Altera autem in syncipite orbi-  
culari, coronæ vnde & dicta est, formam imitante: quẽ ibidem termi-  
nata finitur: Tertiã à lambdali recta verticem partita coronariã vocatẽ  
cõiungitur. Duæ præterea sunt secundum aures in temporum sedibus **G**  
Squammosæ dictæ, non in profundo, vt reliquæ, structuras habentes.  
Priori ex parte cauernæ oculorũ sedes sunt: Pyelidas græci nominant,  
nos Arculas, seu Peluiculas dixerimus. Inter has Nasi os insurgit, intra  
quod Ithmoides à cribri similitudine cognominatum os multis fora-  
minibus cauum reconditur. Facies præterea ossium coagmentationes  
tales habet, infra supercilia vnã, duas ab nasi ossis obliquis lateribus,  
quartã inferiorem maxillam separantẽ, quintã in palato iugali-  
busque ossibus, duas alias, quæ vix cerni queant in malis. At Caluaria  
ab inferioribus partibus concaua foramina profunda rotundaque ha-  
bet, per quæ spinalis medulla descendit.

De Colli uertebreis, Humèris, Scoptulis opertis, et eo- **H**  
rum processibus. Cap. II.

**C**olli septem vertebrae sunt inter se congruenter insertæ. harum  
prima capiti motũ exhibet, reliquæ immobiles sunt. postea Hu-  
merus est, deinde Scoptula operta figura triagula pectoris costis poste-  
rius ad tabellæ imaginem incumbunt. & qua parte latiora sunt, ibi etiã  
tenuissima: qua vero angustiora, ibi & crassiora et robustiora in sinum



**A** quendam subsidientia: in quæ humeri caput conijcitur. Ab eo sinu processus exigitur, ceu spina quædam ab anchoræ hamiq; similitudine Ancyroides & Ancistroides græcè nuncupatus. cum quo iuguli extremum per cartilaginem coalescens committitur.

### De Iugulo, Ossibusq; humeri, brachij, & manus. Ca. III

**A**t Iugulum in tribuli formam effigiatum instrumēto illi, quod Cathetera masculinum græci vocant, persimile est, cum osse autem pectoris, cumq; lato scapularum osse connectitur. ipsa verò iugulorum media pars sigma græcæ literæ similis cum prima dorsi vertebra coniungitur. Humerus prælongus ac teres est, superiori q; parte, quæ humeri Caput dicitur, tumidior. id dimidiū in verticillato scapularū osse reconditur. At inferius, qua cubito deligatur, inæqualis est, duosq; vtrinque processus pugillis similes habet, medium cauum: à prioribus quidem partibus minus, à posterioribus autem magis contractus est. Brachium ex ossibus duobus constat. Cubito ac Radio. Radius, quam Cercida græci appellant, superior breuior q; & primo tenuior rotundo & leniter cauo capite exiguum humeri exteriusq; tuberculum recipit. Cubitus inferior longior q; & primo plenior est, atque in manus articulo brachialis extremum admittit. Radius vtiq; qua brachiali adnectitur, duobus sinibus cauus est, altero recto, quo firmatur articulus, altero à latere, in quo rotundum cubiti caput inseritur. Porro Brachiale ad figuram turbinis ex octo ossiculis coagmentatur. Post hæc Phalanges sunt, prælonga ossa digiti formam habentia. Deinde ossa digitorū Scythalides à græcis, id est Scuticulæ, à latinis Internodia nominata, in singulis digitis terna inter se inæqualia præter pollicem: quippe qui à basi duobus tantum ossibus nititur.

### De reliquis Vertebis, & Costis. Cap. IIII.

**D**Post septem colli vertebrae sunt dorsi duodecim, lumborum quinque vertebrae: ut omnes quatuor & viginti sint. Ita verò instructæ paratæque sunt, ut introrsum versus, qua viscera contingunt, leues ac circumductiles, exterius asperæ spinosæque sint, carne ingenita obrutæ, à lateribus in mensæ formam explanatæ, omnes in medio concauæ, vnicum in suo corpore cochleæ instar foramē habentes, per quod (ut supra diximus,) spinalis medulla demittitur. in transuersis præterea processibus parum desidentes sinus habent, qui costarum extrema recipiunt. Nempe costarum aliæ superius inflexæ instar fornicis, inter se deinde in interiora leniter flexæ committuntur: aliæ oblique occurrant.



tes, postea cartilagineę factę Spinę, Spurięq; costę nominatur: et maior, quàm in superioribus, circuitum ex concursu minorem faciunt. Reliquis omnibus vertebris vltima præstat, quod & Sacrum os secundum antiquorum consuetudinem appellamus: qui omnia magna Sacra nominabant.

De Coxa, Femore, & reliquis usque ad extremum pedem ossibus. Cap. V.

**A** Bvtroque autem huius vertebrę latere Coxarum ossa posterior extenduntur, suisq; extremis ossi pubis, cui Pectini nomen est, cartilagine coalescentia deligantur. Hęc figura lata sunt ac subrotunda, interdum etiam angusta ac crassiore. Id genus ossa sinus verticillatos, nõ exacte penetrantes, sed profundos hebet: quos gręci Cotylas, latini Acetabula vocant. in eos femorum capita coniunguntur. At Femora prælonga valentiaq; ossa sunt, à coxis ad genua vsque pertinentia, tereti figura, atque in exteriori parte gibba. ab inferioribus autem, qua genua attingunt, tuberosis globis intumescunt adeo, vt vtrinque in rotunda capita consurgant: media verò sinuata sunt, quò facilius excipi à tibijs possint. quę triangulę, & in summo capite latecentes leniter in sinus defident, in quos extuberantes femoris eminentias recipiunt: ipsius verò tibię prominentia in sinum femoris inseritur. At ab exteriori parte os alterum, quod Sura recte nominatur, appositum est, tibia gracilius, non proximum femori, infra breuius, qua etiam parte tumidius est. eamque nonnulli vulgares Talum vocari asseuerant. vtrunq; os autem Sura, videlicet, ac tibia in fine multa cartilagine vnita cõtinentur. Sed tibię femorisque commissurę os incumbit, quod gręci Epigomati da, latini Patellam, seu Molam vocant. Hoc disci figuram representat, & superfluitans medium situm est. verum in curuado crure ad tibiam magis accedit: cum autem extenditur, super vtrunque os cadit. In partibus malleolo proximis Tibia paulum gracilescit, atq; in extremo ad sigma gręcæ literę speciem ita equaliter distat; vt processus duos alterum oblongum, alterum breuiorem habeat. at maioris processus caput interius est, alterius enata carne occultitur. cum surę autem extremo coniungitur, quod vltius procedens exteriorem, vt modo dixi, tumorem ostendit. Quapropter huiusmodi ossa ad sigma literę formã media dehiscunt: in quo hiatu Talus delitescit. Hic secundum partem Quatrimonem Allachium vocatam sursum vergit, & ea quidem imis tibiae suręque processibus adiacet. verum os ἐπι τριῶν vocatum super imposito illis surę ossi, quod à figura Cubicum nominatur, ad cauita-



**A**tes incumbit: vt ossis ἐπιτελών quod vocant, inæqualitates occludantur, cartilagineque circumnata deligentur. Anterior autem ipsius rotunda particula in cavitatem cuiusdam ossis quod ex illis est, quæ Tarsus vocatum constituunt, & à cavitare Nauiculare dictum fuit, insertur. Ex octo autem ossiculis inæqualibus angulis Tarsus instruitur. Ipsa Planta subijcitur è quinque ossibus composita in medio tenuibus, in summo crassescens, sursum versus exurgentibus: vnde & à terra caua cernuntur. Post hæc deinde sunt ossa digitorum, quæ Scytalidas græci, Latini vocat Internodia, ad eorum, quæ in manu sunt, similitudinem comparata. Ossium figura, situs, & nomina pro viribus à nobis explicata sunt.







# INDICES DVO LOCVPLETISS.

prior eorum quæ in A R E T A E I, posterior  
eorum quæ in R V F F I libris scitu ac me-  
moriam digna continentur.



Abcessus in colo. 21.	Angina species duæ. 3.B.49.B
F.35.D.	Angina species in solo spiritu. 3.C
Abcessus quibus rum- pendus. 70.G	Angina species peior. 49.B
Abcessus iecoris. uide Iecur.	Angina signa. 3.F
Abcessus lienis. uide Lienis.	Angina canina signa. 3.E
Abcessus renum. uide Renes.	Angina cum phlegmone symptoma. 3.B
Abstine hij succi quantum dandum & eius uires. 69.B	Angina cause. 3.H
Abstinebite uinū elephantis bonū. 72.F	Angina mutatio. 3.G
Acetabulum. 38.A	Angina canina mutatio salubris aut per- nitiosa. 3.F
Adarce, Limnestis. 46.G.57.H	Angina obnoxij canes, & sepe linguam exerunt. 3.C
Adenes. 30.E	Angina medendi regula. 3.G
Adeps Leonis. 72.D	Angina ab ebrietate curatio. 49.B
Adeps Pantheræ. 72.D	Angina clysteres qui & quando. 49.B
Adeps Vrsi. 72.D	Angina sectio uenæ q̄lis conueniat. 49.C
Aegritudines diuturnas quæ incommoda sequantur. 15.D	Angina sectio uenarū ligæ pdest. 49.D
Aegritudo longa tabidos facit. 25.D	Angina defectus animæ nocet. 49.C
Aeger cum medico aduersus morbum con- spirare debet. 15.E	Angina quæ ligaturæ conueniant. 49.C
Aegrotantibus gratificandum. 54.G	Anginam quæ purgatoria leuent. 49.D
Aegri omnes curari non possunt. 69.E	Angina q̄les cōueniūt irrigatiōes. 49.D
Aegyptus quos cibos & potus ferat. 4.G	Angina cataplasmata qualia. 49.E
Aegyptia & syriaca ulcera. 4.G	Angina quibus ad pus ducenda. 49.E
Aestatis damna. 33.E	Angina collutiones. 49.F
Alimenti iter ad iecur & in omne corpus differens est. 59.H	Angina illitiones. 49.F
Aloes uires. 69.B	Angina crustosis ulceribus gargarismi utiles. 49.F
Alui irritationis utilitates. 43.C	Angina cū coincidentia curatio. 49.G
Alui subluiones quātum prosint. 44.D	Anginam cum cōcidentia quid præcipue tollat. 49.G
Ama. 66.B	in Angina curāda error medicorū. 49.H
Amyli facultates. 55.D	Anhelitus, Asthma. 22.H
Anæsthesia. 19.B	Anhelitus cause. 23.A
Anagoge, Sanguinis reiectio. 7.B	Anhelitus indicia. 23.B
Angina, Synanche. 3.C	Anhelitus mitescentis nota. 23.D
Angina canina, Cynanche. 3.C	Anhelitū mulieres facile patiuntur. 23.A
	Anhelitum pueri cur facile euadūt. 23.A
	Anhelitu uix capti uiri citi p̄reūt. 23.A

\*



# A R E T A E I

- Anhelantibus quō differt interitus. 23. B  
 Antitrochus. 64. B  
 Animalia ob quæ uiuant præcipue. 6. C  
 Animi perturbationes immodicæ quam  
 sint noxæ. 20. A  
 Antidoti ex multis constantes quas facul-  
 tates habent. 67. G  
 Anus & uestica inter se coherent; mu-  
 tuoq; afficiuntur. 31. H  
 Aphthæ. 4. D  
 Apij semen capiti conueniens. 65. D  
 Apoplexia quid. 19. B  
 Apoplexion. 19. B  
 Apoplexiæ magna uis. 19. B  
 Apoplexia morbus planè ualidus. 45. A  
 Apoplexia senibus letalis. 46. A  
 Apoplexiæ plerunq; cā saturitas. 46. C  
 Apoplectico quæ uena soluenda. 46. B  
 Apoplectico à quo latere sanguis mitten-  
 dus. 46. C  
 Apoplectico qñ non scindēda uena. 46. C  
 Apoplectici clysteres quales. 46. D  
 Apoplecticus quando & quibus purgan-  
 dus. 46. E  
 Apoplectico utiles uomitus. 46. E  
 Apoplectici inunctiones quales. 46. F  
 Apoplecticis conueniens inunctio. 46. F  
 Apoplecticis conuenientia cataplasmata.  
 folio. 46. G  
 Apoplecticks cucurbitulæ ubi & quando  
 affigendæ. 47. A  
 Apoplexiæ remedia conueniunt Epilep-  
 siæ. 47. E  
 Apoptematiæ. 21. E  
 Aqua frigida epota qñ uomendum. 12. F  
 Aqua ex colo. 35. D  
 Aquæ fluxus inspectus uertiginem affert.  
 folio. 68. A  
 Aquæ sponte natæ melancholicis utiles.  
 folio. 69. G  
 Aquaintercus, Hydrops. 28. A. uide Hy-  
 drops.  
 Arancorum telæ. 60. B  
 Ardoris uenæ causæ & arteriæ crassæ si-  
 gna. 60. E  
 Ardori uenæ magnæ et arteriæ quomodo  
 uenæ sectio conueniat. 60. E  
 Ardore uenæ & arteriæ laboranti quo-  
 modo cucurbitula admouenda. 60. F  
 Ardori uenæ causæ & arteriæ clysteres  
 quales conueniunt. 60. F  
 Ardori uenæ causæ & arteriæ uexato ex-  
 tremâ quibus illinenda et quare. 60. G  
 Ardori uenæ causæ & arteriæ urinaria re-  
 media quæ & qñ conueniant. 60. G  
 Ardori uenæ causæ & arteriæ lac compe-  
 tit. 60. G  
 Ardoris uenæ causæ & arteriæ cibaria.  
 folio. 60. H  
 Ardori uenæ causæ & arteriæ sudoris euo-  
 catio confert. 60. H  
 Ardor uenæ causæ & arteriæ ut febris ar-  
 dens curatur. 60. H  
 Ardor uenæ causæ & arteriæ per crisi-  
 m non soluantur. 60. H  
 Arenulæ calculorum indicia & materiæ.  
 folio. 30. H  
 Arquatus. 25. E  
 Arquatus à quibus mēbris gignitur. 25. E  
 Arquatus quomodo à iecore fit. 25. E  
 Arquati à iecore facti signa. 25. F  
 Arquati ab liene signa. 25. F  
 Arquatus à colo & uentriculo. 25. G  
 Arquatus à quolibet uiscere oriri potest.  
 folio. 25. H  
 Arquati ab habitu totius corpis cā. 25. H  
 Arquati species duæ. 26. B  
 Arquati specierū diuersarū, causæ. 26. C  
 Arquati nigri signa. 26. D  
 Arquati albidioris notæ. 26. E  
 Arquatus qñ salubris, qñ letalis. 26. F  
 Arquatus in acutis morbis malū est. 25. E  
 Arquatus quas ætates infestet. 26. G  
 ab Arteria sanguis quo differt à sangui-  
 ne à uena. 8. A  
 Arteriæ asperæ sanguinem emittentis  
 notæ. 8. B  
 Arteriæ secundum dorsum porrectæ in-  
 flammatio. 12. C  
 Arteriæ exasperatæ remedia. 55. H



# I N D E X A

**A**rterie magnæ principium cor. 60.E  
 Arterie magnæ Ardor. uide Ardor  
 in Articulo ulcus difficile est. 32.C  
 Arthritis. 37.E  
 Articulorum doloris duplex ortus. 37.E  
 Articularis morbi uarietas. 37.H  
 Articularis morbi initium. 38.A  
 Articularis morbus cur sit insanabilis.  
 folio. 38.B  
 Articularis morbus omnem osium com=  
 pagem occupat. 38.C  
 Articularis morbi causæ. 38.D  
 in Articulis tofi. 38.D  
 Articulari morbo quid in principio quid  
 in fine conducat. 38.E  
 Articularibus omnibus morbis lauatio in  
 frigida marina prodest. 71.D  
 Articulis dolētibus quæ imponēda. 71.D  
 Asinini lactis uires. 70.H  
 Asthma, Anhelitus. 22.H. 38. G. uide  
 Anhelitus.  
 Atræ bilis effectus uarij. 16.H  
 Atram bilem educit thymi coma. 68.H  
 Auditui Austri graues. 66.G  
 Aurium temporumq; palpatio quantum  
 ualeat. 42.G  
 Austri auditui graues. 66.G  
 Autumno Phthoræ abundant. 8.G

## B

**B**Alnea sponte calida sulphurea ele  
 phantem iuuant. 72.G  
 Bellaria omnia capiti inimica. 65.E  
 Bellaria omnia capiti nocent præter pul=  
 mulas, ficus, & uuas. 67.A  
 Besasa. 49.F  
 Bilis in iecore creatur. 25.E. 68.F  
 Bilis uariæ species. 26.B  
 Bistinus. 61.D  
 Bonus habitus corporis quæ præstat. 26.H  
 Brabila. 54.G  
 Brassica elephanticis utilis. 72.B  
 Brassica semicocta elephanticis bona. 72.F  
 Bronchia. 22.G  
 Bubones iecoris soboles. 9.B  
 Bubula caro qualis. 65.D

## C

**C**Achexia. i. Malus habitus. 27.A  
 uide Malus Habitus.  
 Cacoehymia. 27.A. 68.F  
 Caligo sensuū est somni principiu. 42.G  
 Calculi ubi nascuntur. 30.G  
 Calculorum indicia & materiæ arenulæ.  
 folio. 30.H  
 Calculi notæ. 31.H  
 Calculi renum notæ. 30.H  
 Calculi in uestica notæ. 31.A  
 Calculi exitus difficilis per colem. 31.A  
 Calculi in uesticam transitus magno dolo=  
 re sit. 61.D  
 Calculi uarie figurati. 31.B  
 Calculi oblongi & inæqualis crassitudi=  
 nis. 30.G  
 Calculi qui in senibus et qui i pueris. 31.B  
 Calculi causæ in senibus. 31.D  
 Calculi causæ in pueris. 31.C  
 Calculis ulcera non sanescunt. 31.F  
 Calculi uesticæ difficultas. 31.F  
 Calculi parui citra noxā excindunt. 31.G  
 Calculo renum uenæ sectio quā pfit. 61.B  
 Calculo renū quales clysteres pñunt. 61.C  
 Calculo renum urinam citantia & cibaria  
 quæ prosint. 61.C  
 Calculo renum lauatio & infusiones uti=  
 les. 61.C  
 Calculos extirpantia potabilia medicami=  
 na. 61.D  
 Calculo renū agitatio corporis pdest. 61.D  
 Calculus miētum impediens quomodo re=  
 mouendus. 61.H  
 Calculus uesticæ quomodo sectione extra=  
 hendus & uulneri medendum. 61.H  
 Calculosis renibus q̄ extra iponēda. 61.B  
 Calculosos renes cruditas lēdit. 61.C  
 Calor cōcoquens in oī corpe institus. 26.A  
 Calor igneus humores omnes in bilem uer=  
 tit. 26.A  
 Calor sanguinem elicit. 55.G  
 Cancer uteri. 37.B  
 Cancer ulceratus non ulcerato longe im=  
 probior. 37.B

\* ij



# A R E T A E I

Canes anginae obnoxij. & sepius linguam  
exerunt. 3.C  
Canis rabiosi potentia. 3.D  
Canina angina, uide Angina.  
Canina conuulso, uide Conuulso.  
Cantbarides uesticam ledunt. 67.E  
Caput sensus neruorumq; originis locus  
est. 42.A  
Caput neruos & musculos ubiq; hēt. 38.C  
Caput difficiles aggritudines patit. 63.F  
Capitis parte una lesa cur oppositi nerui  
ledantur. 19.E  
Capitis morborum initia leuia, fines mor-  
tiferi. 63.F  
Caput uexant lac & caseus. 65.D  
Capiti inimica bellaria omnia. 65.E  
Capiti nocent bellaria omnia præter pal-  
mulas, ficus, & uuas. 67.A  
Caput quæ radices replent. 65.E  
Capiti nocet cruditas. 65.F  
Capiti obsunt labores. 65.F  
Capiti & neruis uenus inimica. 65.F  
Capiti quā noceat uocē acutā adere. 66.E  
Capiti pdest uox mediocriter acuta. 66.E  
Capitis omnibus longis morbis missio san-  
guinis prodest. 64.A  
Caput purgat hiera. 64.A  
Capitis omnibus uitijis quando proffit &  
quomodo pituitæ euacuatio. 64.C  
Capiti conueniens semen apij. 65.D  
Capitis dolor sepe redire solet, & præ-  
sens delitescit. 64.G  
Capitis dolores parui non sunt spernen-  
di. 63.F  
Caput dolenti sol officit. 65.F  
Caput dolenti sanguis ē qua uena & quan-  
tus mittendus. 64.A  
Caput dolenti uena frontis opportuni si-  
me scinditur. 64.B  
Caput dolenti quomodo sanguis ē naribus  
mittendus. 64.F  
Caput dolenti uasa inanire non expe-  
dit. 64.B  
Caput dolentes quando purgandi. 64.A  
Caput dolenti cucurbitulæ ubi & quomo-

do affigendæ. 64.B  
Caput dolenti ueratrum quando dan-  
dum. 65.G  
Caput dolenti quando & qui clysteres  
profsint. 64.F  
Caput dolenti quando & quomodo cor-  
pus exercendum. 65.A  
Caput dolenti ambulationes quando &  
quales profunt. 65.F  
Caput dolenti peregrinatio qualis conue-  
nit & nauigatio. 65.F  
Caput dolenti quā inuuet mare. 65.F  
Caput dolenti abrasio capillorum pro-  
dest. 64.H  
Caput dolentes os quō eluere debēt. 64.E  
Caput dolenti ratio uictus quæ. 65.B  
Caput dolenti cœna frugalis esto, & uinū  
conceditur debili stomacho. 64.E  
Caput dolenti quando uinū danādū. 64.A  
post purgationem dandum. 64.B  
quale uinum dandum. 65.E  
Caput dolenti quæ olera profunt. 65.E  
ē Capite manantis sanguinis signa. 7.C  
ē Capite manātis sanguinis curatio. 7.E  
Cardialgia. 33.C  
Cardiogmos. 33.E  
Capræ ad podagricos remedium. 71.F  
Caro bubula & ouilla quales. 65.D  
Caro leporum concoctu facilis. 68.D  
Carnium raritas & mollicies melancholi-  
cos ualde inuat. 69.G  
Carotides uenæ somniferæ. 13.H  
Cartilagine frigidæ sunt. 22.D  
Caseus & lac caput dolore uexant. 65.D  
Castorei uires. 45.B  
Castoreum quomodo proffit catocho & ue-  
terno 45.H  
Castoreum medetur neruis. 45.C  
Castoreum calefacit neruos. 62.C  
Castoreum quam sit utile resolutis. 46.F  
Castoreum tetanicis salutare. 48.G  
Castoreo in tetano quomodo utēdū. 48.G  
Cataplasma ex millio. 43.B  
Catiadium. 64.F  
Catochus ueterno similis. 45.H



# I N D E X A

Causus febris syncopæ causa.	9.E	aut incidendum.	65.A
Causi signa.	9.F	Cephalea uexatis quomodo quidā caput	
Causi conuersio in contrarium.	9.G	incidebant.	65.A
Causi in syncopam conuersi symptoma=		Cephalea uexato caput quomodo urēdū,	
ta.	9.G	et crustis quæ imponenda.	64.H
Causi mirum symptoma.	9.H	Cephalea uexatum quæ capiti applican=	
Causus quo tempore anni et quibus etat=		da iuuent.	65.B
tibus uiget.	12.D	Cephalea thapsia prodest.	65.B
Causo laborātes quoto die pierūt.	12.D	Cephaleam gestatio qualis leuet.	65.F
Causus qui sine periculo sed longior.	12.D	Cerebrum uulturis.	67.G
Causo subuenit frigida potus.	12.E	Cerumina, Aurium sordes.	
Causum habenti quomodo sanguis detra=		Chamelea.	67.F
hendus et quantum.	56.E	Charoneorum strangulatus.	3.D
Causi alimenta qualia.	57.B	Chiasmus.	19.F
Causum habenti quando uinum largius cō=		Chiragra.	37.E
cedendum.	57.C	Cholera deffinitio.	10.A
Causo uexatis uini potio quando obest et		Cholera symptomata.	10.B
quando prodest.	56.F	Cholera quo anni tempore uiget.	10.D
Causo qñ cucurbitula conuenit.	56.F	Cholera cui etati plus minusue infesta.	
Causo clysteres quid prosint.	56.G	folio.	10.D
Causum habenti caput qualibus irrigan=		Cholades.	34.E
dum.	56.G	Cholerici excretiones non reprimen=	
Causum quæ exteriora iuuent.	56.G	da.	58.C
Causo quibus succurrendum crisis tempo=		Cholerico quando et quibus uomitus ci=	
re uirtute debili.	57.A	tandus.	58.C
in Causo cordi sup dāda epithemata.	57.E	Cholerici torminibus et pedum frigori	
Causo laborans quæ loca inhabitare de=		quæ et quandiu adhibenda.	58.C
bet.	57.F	Cholerico quando frigida aqua propinan=	
Causum habēs quibus operiendum.	57.F	da.	58.D
Casum qñ in tabem uerti metus est.	58.B	Cholerico quando uinum concedendū qua=	
Causus ne in tabem desinat, quibus probi=		le et quantum.	58.E
bendum.	58.B	Cholerico extreme laboranti quomodo	
Cedmata.	12.A	succurrendum.	58.F
Celta.	72.C	Cholerico uomitus qñ sistendus.	58.G
Cephalalgia.	15.F	Cholerico afflatus auræ interdum utilis.	
Cephalea.	15.F	folio.	58.G
Cephalea uariæ species.	15.F	Cholerici uentri et pectori quæ imponen=	
Caphalea cause.	15.C	da et quando.	58.G
Caphalea qui pisces apti.	65.E	Cholerici pedes et musculi quando et qui=	
Cephaleam remedia iuuant ad ossa pene=		bus inungendi.	58.H
trantia.	64.B	Cholerici mēbra inungēda diuersa.	58.H
Cephaleam arteria quæ et quomodo inci=		Chordapsus.	10.E
se iuuant.	64.B	Cibi animum demulcent.	41.F
Cephalea uexatis qñ caput lauādū.	64.E	Cibus humidus omnibus febrientibus ido=	
Cephalea uexatis quando caput urendum		neus.	42.B



# A R E T A E I

Cibigratiores, licet paulo deteriores, æ-  
 gris concedendi. 56.H.70.H  
 Cicadæ uesticæ laboranti utiles. 61.G  
 Circumolutio uertiginem & epilepsiam  
 accersit. 68.B  
 Citria mala podagræ conferunt. 71.E  
 Cneorum. 49.D.67.F  
 Coagulum parce exhibendum. 55.C  
 Coccus cnidius. 67.F  
 Coeliacus affectus. 33.F  
 Coeliacus morbus non solum coctionis sed  
 etiam digestionis uitium est. 33.H  
 Coeliaci crescentis signa. 33.H  
 Coeliacus quibus accidat. 34.A  
 Coeliacus quando uigeat. 34.A  
 Coeliaci causæ. 33.E.34.B  
 Coeliacus difficilis morbus est. 34.A  
 Colon, Laxius intestinum. 10.H.34.C  
 Coli intestini magnitudo. 11.A  
 in Colo intestino uoluulus cur minus pe-  
 riculosus. 11.B  
 Colum uim concoquendi habet. 25.G  
 à Colo icterus. 25.G  
 Coli cruditas bilem efficit. 25.H  
 in Colo intestino uoluuli signa. 11.A  
 Colici doloris signa. 34.B  
 à Colico nascentes morbi. 34.D  
 Colici morbi causæ. 34.D  
 Coli abscessus. 35.D  
 ex Colo intestino aqua. 35.D  
 Colliquati, Syntectici. 24.G  
 Colliquationes habitus corporis malæ. 22.E  
 Columna. 3.H.4.A.50.A  
 Collumellæ affectus. 3.H  
 Columellæ conuulsio. 20.D  
 Columellæ uitia uaria egent curatione.  
 folio. 50.A  
 Columnæ & uuæ celerrime succurren-  
 dum. 50.A  
 Columnæ & uuæ uenæ sectio qualis con-  
 uenit. 50.A  
 Columnæ & uuæ conuenientes clysteres.  
 folio. 50.B  
 Colūnæ et uuæ cōueniētes ligaturæ. 50.B  
 Columnæ & uuæ quando & ubi cucurbi-

tula conueniat. 50.B  
 Columnæ & uuæ adstringentia quæ con-  
 ueniant. 50.C  
 Columnæ ulcerosæ quæ conueniant. 50.C  
 Columbinus finus. 49.E  
 Coma, Sopor. 6.G.33.B  
 Comitialis morbus. uide Epilepsia.  
 Concoctioni uentriculus destinatus. 33.F  
 Concoctionis uentriculi imperfectæ si-  
 gna. 33.G  
 Consentiunt oīa principiorū uitij. 2.C  
 Contentio laborum. 20.C  
 Conuulsionis species tres. 2.C  
 Conuulsionis causæ. 2.D  
 Conuulsionis communes notæ. 2.E  
 Conuulsio quo tempore anni plus minus-  
 ue infestet. 2.D  
 Conuulsio mulieres sæpius uexat sed le-  
 uius. 2.D  
 Conuulsio quas ætates plus minusue læ-  
 dat. 2.E  
 Conuulsiones mitiores quæ. 2.E  
 Conuulsio letalis à uulnere. 2.D  
 Conuulsio ex abortu letalis. 2.D  
 Conuulsio canina. 19.C  
 Conuulsionis caninæ notæ. 20.C  
 Conuulsio canina quomodo spectantibus  
 imponit. 20.D  
 Conuulsione canina affectæ partes quo-  
 modo distinguantur à sanis. 20.E  
 Conuulsio lingue. 20.C  
 Conuulsio columellæ. 20.D  
 Copiosum & subitum naturā uitiat. 56.E  
 Cor oīum principatum tenet. 33.B  
 Cor animæ domicilium. 9.D  
 Cor uitæ speradiq; principū. 6.D.23.A  
 Cor arteriæ magnæ principium. 60.E  
 Cor arteriæ calorem impertit. 60.E  
 Cor attrahit aerem. 6.D  
 Corde affecto breuis est uita. 6.D.23.A  
 Cor graui malo oppressum nunquam sa-  
 nescit. 43.C  
 Cordis & uitæ ægritudo est syncopa. 9.B  
 Cordis laborantis proprietates. 9.D  
 Cordis affecti notæ. 9.C



# INDEX

<i>Cordi noxas impertit stomachus.</i>	9.C	<i>Docilitas &amp; in morbis inuat.</i>	18.C
<i>Cor à stomacho non laeso laeditur.</i>	9.C	<i>Dolichi.</i>	65.C
<i>Cor stomacho contiguum quos morbos excitet.</i>	33.C	<i>Dolor est res aspera sensui.</i>	37.G
<i>Cordi supradada epithemata in causo.</i>	57.E	<i>Dolores unde proueniunt.</i>	37.H
<i>Cor Fulicæ.</i>	67.G	<i>Dolor capitis. uide Caput, &amp; Cephalæa.</i>	
<i>Corallium.</i>	55.B	<i>Dysenteria.</i>	34.E
<i>Costæ qñ suo loco pelluntur.</i>	21.G	<i>Dysenteria causæ.</i>	34.F
<i>Cotyla.</i>	38. A/B	<i>Dysenteria quo tempore anni &amp; qua ætate proueniat.</i>	34.A
<i>Crassædon.</i>	4.B		
<i>Crassædi causæ.</i>	4.B	<b>E</b>	
<i>Crassantia sanguinem &amp; spiritum.</i>	54.H	<i>Bur elephantis utile.</i>	72.B
<i>Cremasteres.</i>	11.B.34.D	<i>Eclegma pleuriticis.</i>	52.E
<i>Cristis p lotium cur optima.</i>	24.D	<i>Eclegma ad melancholicos.</i>	70.A
<i>Cruditas capiti nocet.</i>	65.F	<i>Elaterium.</i>	49.D
<i>Crusta, Eschara.</i>	4.D	<i>Elephas quale animal.</i>	38.H
<i>Crustæ accidentia.</i>	4.D	<i>Elephantis cornua.</i>	39.A
<i>Cyceon.</i>	34.G	<i>Elephantis dentium magnitudo.</i>	39.B
<i>Cynanche, Angina canina.</i>	3.C	<i>Elephantis proboscis.</i>	39.B
<i>Cypselis, aurium sordes.</i>	26.A	<i>Elephas quo cibo uescitur.</i>	39.C
		<i>Elephas quomodo bibit.</i>	39.D
<b>D</b>		<i>Elephas morbus unde sic noatus.</i>	40.D
<i>Debiles &amp; assumpto cibo ualde laborant.</i>	57.D	<i>Elephas morbus cur leoninus dñ.</i>	40.C
<i>Deliquium animæ.</i>	19.C	<i>Elephantis morbi causæ.</i>	39.F
<i>Deliquium animi strangulatū auget.</i>	53.A	<i>Elephantis morbi signa.</i>	39.G
<i>Densum cur indolens.</i>	37.G	<i>Elephantis morbi initium latet.</i>	39.F
<i>Densa qñ sentiunt &amp; dolent.</i>	37.G	<i>Elephas morbus à quo mēbro icipit.</i>	39.G
<i>inter Dextram &amp; leuam partem corporis differentia.</i>	19.D	<i>Elephantis membra singula corrum- puntur.</i>	40.D
<i>Diabetes quid.</i>	29.H	<i>Elephas intus &amp; extra totum corpus occupat.</i>	71.G
<i>Diabetes unde dictus.</i>	30.B	<i>Elephas ut pestilentia cōtagiosum.</i>	71.G
<i>Diabetis causæ.</i>	29.H	<i>Elephas morbus oīum pñitiosissimus.</i>	39.F
<i>Diabetis causæ.</i>	30.C	<i>Elephas oriens tolli potest, iam factus minime.</i>	71.H
<i>Diabetis præsentis indicia.</i>	29.H	<i>Elephas morbus cur incurabilis sit.</i>	39.G
<i>Diabetis futuri notæ.</i>	30.A	<i>Elephantis corū ulcera insanabilia.</i>	40.D
<i>Diabetes perniciosus.</i>	29.H	<i>Elephantis quæ uenæ secandæ quomodo &amp; quantum sanguinis mittendū.</i>	71.H
<i>Diabete affecti non diu durant.</i>	30.C	<i>Elephantis alimentū sanguis malus.</i>	71.H
<i>Diarrhœa.</i>	33.F	<i>Elephātico sanguinis paulū bonū ē.</i>	71.H
<i>Diarrhœa unde.</i>	36.H	<i>Elephantis hiera non semel dāda.</i>	72.A
<i>Dij soli auertunt magnas noxas.</i>	28.A	<i>Elephantis lac quomodo dandum.</i>	72.A
<i>Diploe caluæ medietullium.</i>	65.A	<i>Elephantis omnia remedia sæpius iteranda.</i>	72.A
<i>Dipsas.</i>	30.D	<i>Elephantis ueratrum quo anni tempore</i>	
<i>Diuturnas ægri tudines quæ incommoda sequuntur.</i>	15.D		
<i>Diuturna ægri tudo tabidos facit.</i>	25.D		



# A R E T A E I

quoties exhibendum.	72.B	Epilepsia interdum à capite, interdum ab inferioribus oritur.	1.D
Elephantice uaria adhibenda remedia.	72.B	Epileptici quando futuram accessionem præsentunt.	1.E
folio.	72.B	Epilepsie inuasionis notæ.	1.F
Elephantice brassica utilis.	72.C	Epilepsie accessionis remittentis signa.	1.H
semicocta.	72.F	Epilepsie inuasionis sedata quales sint.	2.B
Elephantice ebur utile.	72.B	Epilepsie paroxysmi & eius finis triste spectaculum.	1.E
Elephantice uiperarum carnes quomodo parandæ.	72.B	Epilepsia laborantium in intermissione symptomata.	16.F
Elephantice theriaca omnium remediorum utilissima.	72.C	Epilepsie originis opinio quorundam.	16.E
Elephantici corpus quibus in balneo detergendum.	72.C	Epilepsie causæ.	16.G
Elephantice sapo gallicus bonus.	72.C	Epilepsiam mouet deliquit animæ.	67.B
Elephantici in facie tumores quibus illi inendi.	72.D	Epilepsiam Gagates lapsus concitat.	1.D
Elephantice quado scarificandi.	72.E	Epilepsiam circunvolutio accersit.	68.B
Elephantice ulcerum quibus lenienda.	72.E	Epilepsia non facile recedit.	16.D
Elephantice lotiones assidue benefaciunt.	72.E	Epilepsia cur interdum acutus morbus dicitur.	47.E
Elephantice quomodo exercendi.	72.F	Epilepsia quoniam longus morbus efficit.	47.E
Elephantice uestes munda sint.	72.F	Epilepsia interdum mutatione ætatis abigitur.	16.D. 67.C
Elephantice cibi quales.	72.E	Epilepsia confirmata curationem non suscipit.	16.E
Elephantice uinum absinthite bonum.	72.F	Epileptici plerique humidi & crassi.	68.B
Elephantice uina qualia danda.	72.G	Epilepsie conueniunt remedia apoplexiæ.	47.E
Elephantice qui pisces conueniant.	72.G	Epileptice uinum puerorum auxilia.	47.F
Elephantice quæ carnes dandæ.	72.G	Epileptici conuulsis membris quomodo succurrendum.	47.F
Elephantice qui arborum fructus dandi.	72.G	Epilepticum puerum iuuat crepitum emisso.	47.G
Elephantice balnea sponte calida sulphurea iuuant.	72.G	Epileptice pueris utilia pharmaca in paroxysmo.	47.G
Elephantice uitam in aquis & mari ducit.	72.G	Epileptice iuuenibus in paroxysmo utilia.	47.H
Emplastra irrigandis potiora.	54.E	Epilepsia magna medicamenta & ualentissima requirit.	67.B
Emprosthotonus.	2.C	Epilepsie in capite ortæ curatio conuenit quæ & cephalæ.	67.B
Emprosthotoni signa.	2.G	Epileptico quæ uena secanda.	67.B
Empyema.	7.F	Epileptico quæ arteria incidenda.	67.B
Empyi.	20.F. 21.E	Epilepticus quibus & quomodo purgandus.	67.B
Entera.	36.B	Epilepticos hilaritas & bona spes miseros	
Epiglottis.	47.B		
Epilepsia, Morbus comitalis.	16.D		
Epilepsia cur facit morbus dicitur.	16.E		
Epilepsia caput obsidet.	9.B		
Epilepsiam antecedentia signa.	1.C		
Epilepsie accessionis appropinquantis signa.	1.C		



- ros reddit. 67.D  
 Epileptico caput quomodo uendū &  
 secandum. 67.D  
 Epileptico caput qualiter fricandū. 67.E  
 Epilepsia raro ab inferioribus oriū. 67.E  
 Epilepsie ab inferioribus partibus ortæ  
 curatio qualis. 67.E  
 Epileptici ab inferioribus fortius purgā-  
 di. 67.F  
 Epilepsie ab inferioribus ortæ cucurbitu-  
 la perutilis. 67.F  
 Epilepsiam lotium ducentia iuuant. 67.F  
 Epilepsie prodest fibri testiculus. 67.F  
 Epilepsiam iuuantia antidota. 67.F/G  
 Epilepticis omnia adhibenda, quæ iuuare  
 aliquid, nihil uero ledere possunt. 67.H  
 Epilepticis prodest à somno flatuū ac pi-  
 tuitæ excretio. 68.A  
 Epileptici ambulationes & gestationes  
 quales & ubi. 68.A  
 Epileptici exercitia uelociora sint quàm  
 uertiginosi. 68.C  
 Epileptico quales adhibendæ frictiones.  
 folio. 68.B  
 Epileptico quæ non inspicienda. 68.A  
 Epileptici ad iram lacessendi. 68.C  
 Epilepticorum cibi quales. 68.C  
 Epileptico plura in cibis acria ponenda.  
 folio. 68.C  
 Epilepticis liquamen ex aceto & cumino  
 bonum. 68.C  
 Epilepticis carnes quando & quæ conce-  
 dendæ. 68.C  
 Epileptico quale uinum dandum. 68.D  
 Epileptico qualia olera danda. 68.D  
 Epileptico noxiæ iracūdia et uen⁹. 68.E  
 Epilepsia locis calidis & siccis iuuatur,  
 cum frigida & humida sit. 68.F  
 Epilepsie similitudinē adducit uen⁹. 68.E  
 Episcenium. 39.E  
 Erosioni uenarum congelatio sanguinis  
 & calor succurrit. 55.A  
 Erosionibus uenarū quæ applicanda. 55.C  
 Error medicorum. 34.D  
 Error quorundā medicorū. 47.B. 68.E  
 Error medicorū in curāda angina. 49.G  
 Error medicorū i curāda pleuritide. 52.F  
 Error quorundam de uenis cubiti. 54.C  
 Esca, uide Cibus.  
 Eschara, Crusta. 4.D. 35.D  
 Eterocrania. 15.G  
 Eterocrania quæ mala iterdū ferat. 15.G  
 Eterocranie debilioris symptomata. 15.H  
 Eterocranie curatio eadem quæ & ce-  
 phalæ. 65.F  
 Eunuchi quales. 32.F  
 Exanthemata. 4.E  
 Experientia bonus magister. 45.F  
 Extrema frigida quibus illinenda. 97.H  
 F  
 Faba leguminum pessima. 65.C  
 Faba ulcera purgat, sed flatibus re-  
 dundat. 70.E  
 Facultates ubi sint. 9.C  
 Fæcoli. 65.C  
 Faucium pestilentis morbi quomodo cu-  
 randi. 50.D  
 Fauibus ignis non est adhibendus. 50.B  
 Fauibus ægris ignis similia medicamenta  
 adhibenda. 50.E  
 Faucium ulcera minime cōprimēda. 50.E  
 Faucium ulceribus quomodo applicanda  
 medicamina. 50.F  
 Faucium ulceribus conuulsionem minan-  
 tibus quæ adhibenda. 50.F  
 Febris ardentis signa. 56.C  
 Febris ardens initium syncope. 56.C  
 Febris ardens quando missionem sangui-  
 nis requirit. 56.D  
 Felis domestica. 67.G  
 Ferarum ira quomodo sedatur. 42.G  
 Fibri testiculus epilepsie prodest. 67.F  
 Fimus columbinus. 49.E  
 Fimus caninus. 49.F  
 Flatum euocantia. 59.C  
 Frigidū crassas materias citius cogit. 25.C  
 Fulcæ cor. 67.G  
 Furor quid est. 17.G  
 Furor quo differt à senili delirio. 17.H  
 Furoris causæ. 17.H

\*\*



# ARRECTIAE I

Furoris cessatio quādo nōn tuta est. 17.H  
 Furor quos facile infestet. 18.A  
 Furorē quē uictus ratio concitet. 18.B  
 Furor quas etates uexet. 18.A  
 Furor quas mulieres laedat. 18.B  
 Furunt non facile mulieres, sed ualde a-  
 cerbe. 18.B  
 Furor quē uiris accidat. 18.B  
 Furentes cū uoluptate quales sunt. 18.B  
 Furentes ab ira quales sunt. 18.C  
 Furoris species infinitae. 18.C  
 Furoris modi uarij. 18.G  
 Furoris mira species. 18.H  
 Furoris miri effectus. 18.C  
 Furentium prauae cogitationes. 18.C  
 Furiosi cuiusdam naturae narratio. 18.D  
 Furor in capite et p̄cordijs continet. 18.E  
 Furiosi quales cum morbus increuit. 18.E  
 Furiosi non macrescunt. 18.F  
 Furoris et melancholiae cum phlegmone  
 uiscerum notae. 18.F  
 Furor in summo qualis. 18.G  
 Furor in remissione qualis. 18.H

**G** Agates lapis Epilepsiam concit-  
 tat. 1.D  
 Galli. 72.C  
 Gallicus sapo elephantinis bonus. 72.C  
 Genitura. uide Semen.  
 Glās unguetariae lienis scirrhopdest. 71.C  
 Globuli pleuritico sub lingua tenēdi. 52.D  
 Gonorrhoea muliebris quae et unde. 36.H  
 Gratificandum egrotantibus. 54.G  
 Grummi in intestinis perniciosi. 35.D  
 Gulae quam sanguinis effusionem patia-  
 tur. 8.B  
 Gula uenulas et arterias tenues hēt. 8.C  
 Gulae sanguinē emittentis indicia. 8.C  
 Gula resoluta quae picula instant. 47.A  
 Gurgulio. 3.H  
 Gurgulionis morbi uarij. 4.A  
 Gurgulionis affectus sine nomine. 4.B  
 Gurgulionis affectus notae. 4.B  
 Gurguliois uitia quae quibus etatibus ma-  
 gis accidunt. 4.C

**H** Abitus corporis colliquationes  
 male. 22.E  
 Halica uires. 51.C  
 Halica quomodo pleuritico danda. 51.C  
 Haemorrhagia. 7.B  
 Hercules morbus. 39.F  
 Hiera. 44.D  
 Hiera facultas. 46.E. 49.A. 69.F  
 Hiera caput purgat. 64.A  
 Hiera elephaticis non semel dāda. 72.A  
 Homerus. 39.A  
 Hominis nuper iugulati sanguis. 67.G  
 Hominis iecur. 67.H  
 Horrores ab ulceribus malefici. 48.G  
 Humores in morbis quō explorādi. 20.G  
 Humorum per renes et uescicam transma-  
 tatio optima est. 22.B  
 Humor quō ex pulmone pellitur. 22.F  
 Humores quē ad interiora labūtur. 50.H  
 Hydrocephalus. 29.E  
 Hydrops. 28.A  
 Hydropem creat iecoris scirrhus. 24.E  
 Hydrops per uescicā purgari pōt. 24.E  
 Hydrops per alui effluuium sed cum peri-  
 culo tollitur. 24.F  
 Hydropici p̄ sudorē facilius sanant. 24.F  
 Hydropici aegre sudant. 24.F  
 Hydropici per pauci liberantur. 28.A  
 Hydropicis nulla ps̄ uest noxacarēs. 28.A  
 Hydrops quando adest. 28.E  
 Hydropis causa princeps malus habi-  
 tus. 28.E  
 Hydropis species plures. 28.E  
 Hydrops Tympanias. 28.E  
 Hydrops Ascites. 28.E  
 Hydrops Phlegmatias. 28.F  
 Hydrops Anasarca. 28.F  
 Hydropis specierum mixtio pessima quae  
 sit. 28.F  
 Hydropis quae peior species. 28.F  
 Hydropis Ascite notae. 28.G  
 Hydropis Tympaniae notae. 28.H  
 Hydrops Ascites ex tympania oriū. 28.H  
 Hydropis Leucophlegmatiae notae. 29.A



# I N D E X

- Hydrops Anasarca notæ. 29. A  
 Hydropi communia signa. 29. A  
 Hydropi Anasarca propria. 29. B  
 Hydropi Ascitis et Typania cōia. 29. B  
 Hydropi Anasarca & Phlegmatica com-  
 munia. 29. B  
 Hydropici unde sint fiducia pleni. 29. C  
 Hydropis causa aque gelide potus. 29. C  
 Hydropis cause diuersæ. 29. D  
 Hydropis quæ species quibus magis eue-  
 niat. 29. D  
 Hydrops Leucophlegmatis mitissima  
 est. 29. E  
 Hydrops Anasarca pessima, in qua homo  
 totus permutandus. 29. E  
 Hydrops membri unius. 29. E  
 Hydrops ab utero. 29. E  
 Hydrops à uesculis. 29. F  
 Hypopia. 40. C  
 Hypostasis. 70. G  
 Hyssopi uires. 70. G
- I
- Ichor. 36. E  
 Icterus, Regius morbus, Arquatus,  
 Aurigo. 25. E. uide Arquatus.  
 Icteric tymon. 26. B  
 Ictis. 26. B  
 Iecoris maxima pars sanguinis concre-  
 mentum est. 11. B  
 Iecur intersepto appensum est. 23. H  
 Iecur sanguinis fons et bilis creator. 68. F  
 Iecur sanguinem semper creat, et ad alias  
 partes diffundit. 11. D  
 Iecur uenæ sanguinem infundit. 60. E  
 à Iecore & liene sanguis quo pellit. 7. F  
 in Iecore sanguis creatur. 25. H  
 Iecur principatū alimenti tenet. 23. G  
 Iecur uenæ causæ radicatio. 60. E  
 Iecur uenarum radicatio. 11. C. 23. G  
 Iecoris portæ appetitricis animæ domi-  
 cilium. 11. C  
 Iecoris portæ egrotantes cur cito peri-  
 munt. 11. B  
 Iecoris portarū inflāmatarū notæ. 11. D  
 Iecoris ad lienem cōparatio. 23. G
- Iecur in morbis sanitatem molitur. 23. H  
 Iecur quibus morbis afficitur. 23. H  
 Iecoris morborum causæ. 24. G  
 Iecoris morbos quæ ætas qui sexus ma-  
 gis patiuntur. 24. F  
 Iecur egrotās magno cruciatu pimit. 11. B  
 Iecur sanguinis profluvia maxima pati-  
 tur. 11. C  
 è Iecore profusio sanguinis sisti non po-  
 test. 29. B  
 Iecur quas uomicas patitur. 11. C  
 Iecoris uomica quo omni tempore, & qua  
 ætate plus uiget. 11. G  
 Iecur uomica in hydropem uergentis si-  
 gna. 11. F  
 Iecoris abscessum patientis notæ. 23. H  
 Iecoris abscessum interiora petentem na-  
 tura melius sanat q̃ medicus. 24. B  
 in Iecoris abscessu securior est puris exi-  
 tus per uescam. 24. B  
 Iecoris exterior abscessus nisi secetur, exi-  
 tialis est. 24. B  
 Iecoris abscessus quō incidendus. 24. C  
 Iecoris abscessu reciso q̃ sequatur. 24. C  
 Iecoris abscessus interius effracti sympto-  
 mata. 24. C  
 Iecoris à phlegmone scirrhum patientis  
 notæ. 24. E  
 Iecoris scirrhus hydropem creat. 24. E  
 à Iecore arquatus quomodo fit. 25. E  
 à Iecore arquati facti signa. 25. F  
 Iecoris dolori succurrentia. 43. A  
 Iecoris phlegmonæ cur acutissima. 59. G  
 Iecoris phlegmones pmutatio. 11. F  
 Iecori inflammato quæ uenæ sectio con-  
 ueniat. 59. H  
 Iecori inflammato inedia & cibi paucitas  
 conuenit. 59. H  
 Iecori inflāmato exterius apponēda. 59. H  
 Iecoris inflammati cataplasmata & fo-  
 menta. 60. A  
 Iecori inflammato cucurbitula quando et  
 quō applicanda. 60. A  
 Iecori inflammato hirudines an conue-  
 niant. 60. A

\*\* ij



# A R E T E A I

Iecoris inflammati ceratum. 60. B  
 Iecori inflammato malagmata qualia ap=  
 ponenda. 60. B  
 Iecori inflammato cibi quales conueni=  
 ant. 60. C  
 Iecori expurgando uia per renes cōmo=  
 da. 60. C  
 Iecoris materiæ quomodo in renes tra=  
 henda. 60. C  
 Iecur hominis. 67. H  
 Ignis opera amara & bile infecta. 26. A  
 Ileus, Voluulus. 10. E  
 Inflammationis suppurantis indicia. 22. A  
 Inflammationis proxime rumpendæ si=  
 gna. 22. A  
 Inflammationis effractæ symptomata. 22. B  
 Inflatio facile recedit. 63. E  
 Intestinorum binæ tunica. 35. C  
 Intestinorum tunica. 35. C  
 Intestinorū uulnus perniciosum. 29. G  
 in Intestinis ulcerum species. 34. E  
 Intestinorum ulcerum nota. 34. G. 35. E  
 Intestini tunica interior iterdū exit. 35. C  
 Intestinum inferius solum tunica una pri=  
 uari potest. 35. C  
 Intestini inferioris ulcera cur salubrio=  
 ra. 35. E  
 ab Intestinis sanguinis prfluuium quan=  
 do mortiferum. 35. H  
 in Intestinis grummi sunt pniciosi. 35. H  
 ab Intestinis sanguis erupturi notæ. 36. A  
 ab intestinis prfluui sanguinis cito oc=  
 currendum. 35. H  
 Intestinorum pus suscipientū notæ. 70. F  
 Intestinorum leuitas. uide Leuitas intesti=  
 norum.  
 Inunctiones irrigationibus pstant. 46. F  
 Inusitatum magis lædit. 38. F  
 Ionchi à latinis Vari appellati. 38. D  
 Ira ferarum quomodo sedatur. 42. G  
 Ischias. 37. E  
 Ischiadis initium. 37. H  
 Ischuria. 32. A  
 Itrion. 66. H  
 Iuuenibus laboriosis oculū inimicū. 25. D

**L** Abiorum contentio. 20. C  
 Labores capiti obsunt. 65. F  
 Lactes. 10. F  
 Lactuca inter cruda olera optima. 65. E  
 Lac. 45. H  
 Lac asinæ quale. 58. C. uires. 70. H  
 Lac ardori uenæ causæ & arteriæ com=  
 petit. 60. G  
 Lac & caseus caput dolore uexant. 65. D  
 Lactis uires. 70. C  
 Lacte uescentes nationes frumentum non  
 edunt. 70. D  
 Laconicus canis ex uulpe & cane na=  
 tus. 72. D  
 Laserpitij lachrymæ uires. 48. H  
 Laserpitij lachryma tetanicis quomodo  
 danda. 48. H  
 Lauationis frigide utilitates. 66. G  
 Lauationis calidæ noxæ. 66. G  
 Leuitas intestinorum à cicatrice. 36. B  
 Leuitas intestinorū à debili calore. 36. C  
 Leuitatem intestinorum quando uomitus  
 soluit. 36. C  
 Leuitas intestinorum à malo habitu &  
 hydropē. 36. C  
 Lentis uires. 65. C  
 Leo Morbus. 39. E  
 Leonis adeps. 72. D  
 Lepores concoctu faciles. 68. D  
 Lethargus, uide Veterinus.  
 Lienis rarus & sensu carens in sanitate  
 quoq; est. 25. A  
 Lienis natura dissolubilis est. 25. B  
 Liene & iecore sanguis quo pPELLIT. 7. F  
 Lienem diuantia. 43. A  
 Lienis morbi quas etates uexent. 25. D  
 Lienis uitiorum causæ externa. 25. D  
 Lienosi quales euadant. 25. C  
 Lienosorum ulcera qualia. 25. D  
 Lienosi quomodo percunt. 25. D  
 Lienis quando purulētus fit. 24. G  
 Lienis purulentus tactui cedit. 24. H  
 Lienis suppurantis signa. 25. A  
 Lienis abscessus oriens cur interdum la=



# I N D E X

- tet. 25. A  
 Lienis abscessus effracti notæ. 25. B  
 Lienis integræ ptes iterdū excretæ. 25. B  
 Lienis inflammato eadem conueniunt quæ  
 et iecori. 60. D  
 Lienis scirrhus familiaris est. 24. G  
 Lienis plerunq; lapideam duritiā pa-  
 titur. 24. H  
 Lienis scirrhus sanatu' difficilis. 71. B  
 Lienis scirrhū sequentes morbi insana-  
 biles. 71. B  
 Lienis scirrhus incipiens quomodo tol-  
 lendus. 71. C  
 Lienis scirrhu q̄ exterius adhibēda. 71. C  
 Lienis scirrhu glās unguētaria pdest. 71. C  
 Lienteria. 36. B. uide Leuitas itestinarū.  
 Limnestis, Adarce. 46. G. 57. H  
 Lingua quid sit. 20. D  
 Lingue conuulso. 20. D  
 Liquamen bonum stomacho, aluo, capi-  
 ti. 66. G  
 Liquamen ex aceto et cumino epilepticis  
 bonum. 68. C  
 Lipothimia, Deliquium animæ. 19. C  
 Lobi. 65. C  
 Lorum. 4. A  
 Lotium biliosum est. 44. G  
 Lotij ueteris facultates. 62. D
- M
- M** Adefectio tendonibus ac neruis  
 inimica. 42. E  
 Malabathrus arbor indica. 62. D  
 Malua. 42. B  
 Maluæ semen melancholiæ utile. 69. F  
 Malus habitus quid. 27. A  
 Malus habitus ab omnibus morbis ema-  
 nat. 26. G  
 Malus habitus interdum per se fit. 26. G  
 Malus habitus omnium est in deterius cō-  
 uersio. 27. A  
 Malum habitum sequentes morbi in-  
 sanabiles. 27. A  
 Mali habitus symptomata. 27. A  
 Mali habitus cause. 27. B  
 Mali habitus futuri signa. 27. B  
 Mali habitus præsentis signa. 27. C  
 Malum habitū qui morbi sequunt. 27. E  
 Malus habitus quas etates uexet. 27. E  
 Malus habitus quo tpe anni fit. 27. F  
 Mandragora et altercus amentiam pa-  
 riunt. 17. G  
 Maris salsugo ulcera iterna secat. 70. B  
 Marmorata, Aurium sordes. 26. A  
 Marrubij uires. 70. G  
 Marrubium podagricis utile. 71. E  
 Martes. 26. A  
 Mastiche. 45. F  
 Maxilla ualde hiantibus interdum lu-  
 xatur. 20. C  
 Medicorum error. 34. D  
 Medicorū quorundā error. 47. B. 68. E  
 Medicorū error in curāda angina. 49. G  
 Medicorum error in pleuritide. 52. E  
 Medicus quæ præstare potest. 69. E  
 Medico iuueni consilium. 63. B  
 Medico qñ liceat sopire ægrotum. 59. C  
 Medicatio nonnullis nocet, resectio ui-  
 rium sanat. 69. F  
 Mel quid in cataplasmate prodest, quid so-  
 lum. 43. C  
 Melancholia quid sit. 17. A  
 Melancholia furoris initium atq; ps. 17. A  
 Melancholia quo differt à furore. 17. A  
 Melancholicorum uariæ species. 17. B  
 Melancholicorum altera species. 16. H  
 Melancholicos cur flatuosos antiqui ap-  
 pellabant. 16. H  
 Melancholia quomodo nascitur. 16. H  
 Melancholia qbus mēbris læsis oriū. 17. B  
 Melancholici qui fiant furiosi. 17. C  
 Melancholiæ causa. 17. C  
 Melancholia prima ac maxima causa in  
 capite. 69. A  
 Melancholiæ et furori qui sexus, quæ  
 etates, quæ anni tempora magis subij-  
 ciantur. 17. C  
 Melancholiæ indicia. 17. C  
 Melancholicorū qñ insomnia uera. 17. D  
 Melancholia quos facile corripiat. 18. A  
 Melancholiæ et furoris præcipua sedes. 18. E



# A R E T E A I

Melancholia & furoris cum phlegmone  
uiscerum notæ. 18. G  
Melancholia ex quibus humoribus. 68. F  
Melancholia alimētū sāguis et bilis. 68. G  
Melancholicis carnes sunt sicce ac den=  
sæ. 69. G  
Melancholicis ppria est corpulētia. 18. F  
Melancholicorū sensus utiuntur. 69. A  
Melancholia quando insanabilis. 69. D  
Melancholiam sequentes morbi insana=  
biles. 69. D  
Melancholicis quando & quæ uena se=  
canda. 69. F  
Melancholicis quantum sanguinis mit=  
tendum. 69. G  
Melancholicus à purgatione quomodo  
habendus. 68. H  
Melancholico cucurbitula quando & ubi  
applicanda. 69. A  
Melancholici stomacho præcipue succur=  
dum. 69. B  
Melancholia quando uehementiora me=  
dicamenta requirit. 69. B  
Melancholia paruis medicamentis non  
cedit. 69. D  
Melancholicis ueratrū & qua ratione  
dandū. 69. D  
Melancholia utile malua semen. 69. F  
Melancholicis utiles aq̃ spōte calida. 69. G  
Melancholia humectatio prodest. 69. G  
Melancholicos ualde inuat carniū ra=  
ritas ac mollicies. 69. G  
Melancholicis incunctio & frictio qua=  
lis conuenit. 69. G  
Melancholicorū cibi & potiones qua=  
les. 69. H  
Melancholici ne cibum euomant quomo=  
do succurrendum. 69. H  
ad Melancholicos eclegma. 70. A  
Melancholicis apponēda exterius. 70. A  
Membrana succingentis sanguinem mit=  
tentis notæ. 8. F  
Membrana succingens cur'tanum puris  
contineat. 21. G  
Mentæ uires. 65. D

Metaphrenon. 2. H  
Mictus sanguinis. 31. C  
Mictusāguinis pidioci symptomata. 31. C  
Mictu sanguinis consueto cessante quæ  
sequantur. 31. D  
Mictus sanguinis disruptis renibus. 31. D  
Mictui sanguinis quamprimum succur=  
rendum. 61. F  
Mictum sanguinis supprimētia. 61. F  
ex Milio cataplasma. 43. B  
in Morbis acutis regula. 41. H  
Morbis longis dilatio medelæ nocet. 63. E  
Moretum. 34. F  
Mortis periculo imminēti omnia uel im=  
mitia danda. 55. H  
Motus & uigilia discutiunt. 44. H  
Mulieres humide & frigide sunt. 23. A  
Mulieres non facile, sed ualde acerbe fu=  
runt. 18. B  
Muliebris fluxus qui cui ætati magis no=  
cet. 36. G  
Muliebris gonorrhœa quæ et unde. 36. G  
Mulsā à biliosis facile concoquitur. 42. B  
Mulse uires. 43. C  
Mydriasis. 19. H  
Mytoton. 34. F

## N

Naribus acria quō ifūdēda. 64. D  
Naturæ robustæ potentia. 9. E  
Naturā quō alimenta distribuāt. 26. H  
Naturam copiosum & subitū uitiāt. 56. E  
Naturæ ijsdem circuitibus iudicāt, quibus  
morbi interimunt. 56. F  
Naturæ salutare materiæ recursus. 65. H  
Natura statim temporibus oīa molit. 68. E  
Naturæ potētia sanitatem, debilitas agri=  
tudinem perit. 69. G  
Necrosis. 13. F  
Neruorū capitis progressus et situs. 19. E  
Neruorū è capite fluentium natura. 19. F  
Neruorum in musculis natura. 19. F  
Nerui ex capite oriuntur. 45. C

## O

Chri. 65. C  
Ocium inimicum iuuenibus labo=  
r



# INDEX

riofls.	25. D	Paraplegia species.	19. G
Ocium est nebula sensuum.	68. A	Paralysis.	19. B
Oleum obtundet acria.	45. E	Paralysis in membris quomodo fit.	19. C
Olea quomodo spissanda.	46. F	Paralysis signa.	20. B
Oleum rutaceū intestinis ppitiū.	59. D	Paralysis potissima causa.	20. A
Oleum scyonium.	64. D	Paralysis quibus etatibus, quo anni tem=	
Opisthotonus.	2. C	pore magis noceat.	20. A
Opisthotoni signa.	2. G	Paralysis quos habitus corporis magis	
Orgyia.	39. B	corripit.	20. B
Oris ulcus depascens.	4. E	Paralysis ab iciso neruo insanabilis.	20. A
ab Ore sanguis exit duobus modis.	7. A	Paralysis sananda indolentia pdest.	20. B
ab Ore sanguinis fluentis signa.	7. B	Paresis.	19. C
Oris uentriculi remedia.	43. G	Paresis cause.	19. H
Ordei cremor.	42. C	Pectoris sanguinem fundentis indicia.	8. F
Ordei cremoris facultates.	51. B	Pectoris os, Sternon.	21. E
Ordei grana quando & quomodo pleuri=		Pectori aestuanti cōueniētia auxilia.	43. F
tico danda.	51. D	Pedum manuumq; natura similis.	38. B
Orthopnea.	22. H	Pedes suum concoctu faciles.	68. D
Oryza natura pleuritidi inimica.	51. C	Pepones frigidi & humidi.	68. D
Os pectoris, Sternon.	21. E	Perinæus.	62. H
Ossa maximum dolorem afferunt ipsa		Peripneumonia Pulmonia. 6. E. uide Pul=	
non dolentia.	30. F	monia.	
Ossa cur non dolent.	37. G	Peritonæum.	24. H
Ouilla caro qualis.	65. D	Peritonæi tumor qualis.	24. B
Oua quando & quomodo pleuriticis dan=		Peristrophus.	38. B
da.	51. E	Phagedæna.	37. A
Oua proxime ē gallina edita & adhuc ca=		Phrenitis ubi plerunq; fit.	18. E
lentia pleuritico utilia.	51. B	Phrenitici ex neruis laborant.	41. E
Oua ex animalibus nuper edita absque		Phreniticorum febres quales.	42. A
igne optima.	70. E	Phrenitis facile in syncopam mutat.	41. H
Oxymel quando pleuriticis dandū.	52. E	Phrenitici acute audiunt.	41. B
		Phrenitici parum bibunt.	43. H
		Phrenitici cōclauē quale esse debet.	41. B
		Phrenitici cubile & lectus quales esse de=	
		bent.	41. E
		Phrenitici in tenebris ne an in luce haben	
		di sint.	41. F
		Phreniticis cibi quales quando & quanti	
		sint exhibendi.	41. F
		Phreniticis cur cibi humidi maxime pro=	
		sint.	42. B
		Phreniticis olera conueniunt.	42. B
		Phreniticis qui fructus cōueniant.	42. D
		Phreniticis quando cibus subtrahendus uel	
		augendus.	42. C



# A R R E T T A L E I

Phreniticis qñ uinum conuenit.	43.H	Pleuritidis signa salubria.	5.D
Phreniticis quando & quæ uena secan-		Pleuritidis pessimum signum.	5.B
da.	41.G	Pleuritis quomodo soluitur.	5.D
Phreniticis non multum sanguinis detra-		Pleuritis quando plerūq; sanatur.	5.E
hendum.	41.H	Pleuritis quando terminatur.	5.C
Phreniticis quando & quomodo secanda		Pleuritidis mutatio.	5.C
est uena.	42.A	Pleuritis nonnullis erupit.	51.A
Phreniticis conducit lotij excretio.	42.B	Pleuritis qñ in purulentiam uertitur.	5.C
Phreniticis tonsura crinium quando &		Pleuritidis in purulentiam uergentis si-	
quanta conueniat.	43.E	gna.	5.E. 51.G
Phreniticis capitis irrigationes.	42.D	Pleuritis pulmonie succedens minus ma-	
Phreniticorū capitis irrigadi tpa.	42.E	la.	50.H
Phreniticis caput quando lauandū.	44.B	Pleuritis quo anni tpe plus abundat.	5.E
Phreniticis quando somnus alliciendus.		Pleuritis cui sit etati infestior.	5.F
& quomodo.	42.F	Pleuritida cur senes euadant.	5.F
Phthee.	20.F	Pleuritis in pueros nec frequens nec peri-	
Phthoes signa.	20.F	culosa.	5.F
Phthoe autumno abundant.	8.G	Pleuritidi protinus succurrendum.	50.G
Phthifis.	20.E	Pleuriticis qñ & quæ uena secanda.	50.G
Phthifis sine ulcere pulmonis.	20.H	Pleuriticis quātū sāguinis mittendū.	50.H
Phthificis aluū pturbari letale est.	21.C	Pleuritico sanguis quō mittendus.	50.H
Phthifis cui etati plus minusue noceat.		Pleuriticus quo modo perungendus & ir-	
folio.	21.C	rigandus.	51.A
Phthifis senibus letalis.	7.A	Pleuriticorum Cibi quales.	51.B
Phthifi expositi corporis habitus.	21.D	Pleuritico ptisana quomō paranda.	51.B
Phthifim quæ regio ferat.	21.D	Pleuritico halica quomodo danda.	51.C
Phthificis oleum cū aceto prodest.	70.C	Pleuritidi oryza natura inimica.	51.C
Phthificorum uaria edulia.	70.D	Pleuritico panis quomō præbendus.	51.D
Picerium.	52.D	Pleuritico ordeï grana quando & quo-	
Pictura parietum mentem turbat.	41.E	modo danda.	51.D
Piper & ei similia pleuriticis psunt.	51.E	Pleuriticis oua quādo & quō danda.	51.E
Pisces saxatiles alijs præstātiores.	42.C	Pleuritico oua proximè ē gallina edita &	
Pisces alios alia regio fert.	42.C	adhuc calentia utilia.	51.E
Pisces pleuriticis utiles.	51.F	Pleuriticis piper & ei similia psunt.	51.E
Pituitæ uomitus unde.	36.H	Pleuriticis quæ carnes apponendæ.	51.F
Pituitam per os ducentia.	64.E	Pleuriticis pisces utiles.	51.F
Plantaginis succus qualis.	55.G	Pleuriticis fructus q & quādo dādi.	51.F
Plecas.	14.E	Pleuritici lateri dolenti quæ et quādo im-	
Pleuritis.	5.A	ponenda.	51.G
Pleuritis, lateris uel costarum morbus à		Pleuritici in purulentiam uergentis notæ	
latinis.	5.B	& quæ tunc imponenda.	51.G
Pleuritidis notæ.	5.A	Pleuritico cataplasinata quomodo appli-	
Pleuritidis accidentia.	5.B	canda & alia fomenta.	51.H
Pleuriticus in latus affectum facilius ia-		Pleuritico cucurbitula quando & quomo-	
cet.	5.B	do admouenda.	51.H

Pleuriticis



# INDEX

Pleuriticis cucurbitula ualde utilis. 52. A	Puerorum natura. 4. F
Pleuriticis quid post scarificationes adhibendum. 52. B	Puerorum corpora qualia. 5. F
Pleuriticorum clysteres quales. 52. C	Pueris uentris effluuiū cur assiduū. 34. A
Pleuritico quæ assidue deuoranda. 52. D	Pueris uomitus quomodo curandus. 47. F
Pleuritico globuli sub lingua tenēdi. 52. D	Pulegij uires. 65. D
Pleuritico quo tempore danda medicamina. 52. E	Pulmonis natura. 5. C. 22. F. 50. H
Pleuriticis eclegma utile. 52. E	Pulmo dolore uacat. 21. H
Pleuritidi diurnæ medicamen conueniens. 52. E	Pulmo cur dolore uacat. 6. E
Pleuriticis oxymel quando dandū. 52. E	Pulmo semper ad se humores allicit. 53. E
Pleuritis non uera. 52. F	ex Pulmone quomō humor pellitur. 22. F
Pleuritidi non ueræ aqua frigida pdesse ualet. 52. F	Pulmonis affecti notæ. 6. D
Pleuritidi ueræ etiam frigida spiratio nocet. 52. G	Pulmonis morbi pleuritidi succedentes insalubres. 50. H
Pleuritidis reliquæ cur mature tollende. 52. G	Pulmoni madefactio inimica. 53. H
Podagra. 37. E	Pulmoni qualia medicamenta conueniant. folio. 53. E
Podagræ mutatio. 38. B	Pulmonis sanguinem fundētis notæ. 8. E
Podagræ permutatio. 38. G	Pulmonia, Peripneumonia. 6. E
Podagra sæpe in chiragrā mutatur. 38. B	Pulmonia malum peracutū et letale. 53. A
Podagra raro continua. 38. E	Pulmonia quotidie necat. 6. G
Podagricus in olympicis uictor. 38. E	Pulmonia quando interficit. 22. F
Podagra quibus magis accidat. 38. F	Pulmonia iuuenibus exitialis. 7. A
Podagra cui ætati magis infesta. 38. F	Pulmonia salubris. 22. E
Podagræ symptomata. 38. F	Pulmonia in melius uergentis crisis. 6. G
Podagricorum mores. 38. G	Pulmonia quæ in purulentā uertit. 22. E
Podagricis ueratrum quando utile. 71. D	Pulmonia signa. 6. E
Podagræ quinquifolium bonum. 71. E	Pulmonia sputa qualia. 22. G
Podagricis marrubium utile. 71. E	Pulmonia mira proprietates. 22. G
Podagræ conferunt mala citria. 71. E	Pulmonia pleuritis succedens minus mala. 50. H
Podagricos non idem semper iuuat. 71. E	Pulmonarium. 23. E
ad Podagricos capræ remedium. 71. F	Pulmonarium quādiu duret. 23. E
Præcordijs utilia. 43. A	Pulmonario qui sint obnoxij. 23. E
Principiorū uitij omnia consentiūt. 2. C	Pulmonarij signa. 23. F
Probofci unde dicta. 39. D	Pulmonarium quomodo finit. 23. F
Pruna damascena. 54. G	Pulmonaria undiq; obsidenda impugnant. 53. E
Psoæ. 30. H	Pulmonarijs quæ uena secanda & quantū sanguinis mittendum. 53. A
Ptissana quomō pleuriticis parāda. 51. B	Pulmonarios quādiu uenæ sectio. 53. A
Ptissana quibus condienda. 67. A	Pulmonarijs sedes quibus oblinenda. 53. B
Ptissana cremor coctilis & tenuis matriæ. 70. D	Pulmonarijs acres clysteres quādo & qui conueniunt. 53. B
Ptissanam licet in alicā permutare. 70. D	Pulmonarijs ubi cucurbitulæ affigendæ. folio. 53. E

\*\*\*



# A R E T A E I

Pulmonarijs quæ ore sumenda.  
Pulmonarijs quâdo somnifera danda. 53. F  
Pulmonarijs mēbra laxanda, & spūto euo-  
cando studendum. 53. G  
Pulmonarij pectori quæ imponenda. 53. H  
Pulmonario quibus extra ducendi humo-  
res, calor, & spiritus. 53. H  
Pulmonarijs cibi quales dandi. 53. G  
Pulmonarijs potus qualis & quātus. 53. G  
Pulmonarijs status infesti. 53. G  
Pupillæ amplificatio. 19. H  
Pupillæ phthists. 19. H  
Purgatio stomacho ac uiribus laboriosa.  
folio. 69. A  
Pus bonum. 22. C  
Pus malum. 22. C  
Puris multiplices differentie. 22. C  
Pus internum per quas uias eijcitur. 21. E  
Puris exitus per uesticam securior. 24. B  
Pus per intestina quomō educendū. 71. A  
Pure undelibet erumpente cibi quales dan-  
di. 71. B  
Purulenti. 20. F. 21. E  
Purulentie cause. 21. G  
Purulentie signa. 21. H  
Purulentie salubris signa. 22. D  
Purulentia in offe pectoris qualis. 22. D  
Pyc. 20. E

Q

**Q** Vies exercitationibus succedat.  
folio. 66. G  
Quinquesolium podagræ bo-  
num. 71. E

R

**R** Abiosificans potentia. folio. 3. D  
Radices etiam elixæ prauæ sunt. 65. E  
Rarum cur bene sentit. 37. G  
Rarefactioni & diuisioni uenarū adstri-  
ctio medetur. 54. H  
Rarefactionis uenarum remedia. 55. A  
Regula in morbis acutis. 41. H  
Regula in mittendo sanguine. 46. G  
Remedia morbis maiora esse debēt. 71. G  
Res quando in cōterarium mutantur. 9. G  
Renum descriptio. 30. E

Renum uentres quales. 30. G  
Renum natura. 61. E  
Renum actio quæ. 12. G  
Renum actionem quæ impediunt. 12. G  
Renes non multū periculis expositi. 12. F  
Renes morti inferendæ habiles. 12. G  
Renum qui morbi quo anni tēpore. 31. E  
Renum longi morbi. 30. F  
Renum profluuium sanguineum quando  
mortiferum. 13. B  
Renum ulcerum signa. 31. E  
Renum ulcera egre sanabilia. 30. F  
Renum ulcera uix sanabilia quæ. 31. E  
Renū inflāmatio & iecur inflāmat. 61. A  
Renum inflāmationē quæ sequunt. 61. A  
Renum calculi notæ. 30. H  
Renum calculo et inflāmationi uenæ se-  
ctio quā proficit. 61. B  
Renibus calculosis & inflāmatīs quæ ex-  
tra imponendī. 61. B  
Renum calculo & phlegmone quales cly-  
steres profunt. 61. C  
Renum calculo & phlegmone urinam ci-  
tantia & cibaria quæ profunt. 61. C  
Renes calculosos & inflāmatos cruditas  
lædit. 61. C  
Renum calculo & phlegmone lauatio et  
insestiones utiles. 61. C  
Renum calculo agitatio corporis pro-  
dest. 61. D  
Renibus lac utile. 61. C  
Resolutis quā sit utile castoreum. 46. F  
Resolutorum omnium præcipuum reme-  
dium. 47. D  
Rhei radix. 55. B  
Rheas. 31. G. 62. A  
Rhyteon. 34. G  
Rutaceū oleum intestinis propitiū. 59. D

S

**S** Acrum dicitur omne magnum. fo-  
lio. 16. F  
Sacri ex aloë medicamenti uires. 69. F  
Sal quomodo scarificato loco inspergen-  
dus. 52. A  
Sanguinis fons iecur. 60. F



# INDEX

- Sanguis calidus est. 60. A  
 Sanguis naturæ prædū et alimentū. 68. G  
 Sanguinis natura. 54. A  
 Sanguis et bilis melancholice alimentū. 68. G  
 Sanguis nimius quas noxas affert. 62. H  
 Sanguinem calor elicit. 52. G  
 Sanguine largius effuso natura cibi inopia debilitatur. 68. G  
 Sanguis unde quæq; fluat malum est. 54. A  
 Sanguinis effusionis tres modi. 7. G  
 Sanguinis aliquo loco prius collecti effusio. 7. A  
 Sanguinis effusio quo tempore anni uiget & maxime letalis est. 8. G  
 Sanguinis fluori terræ spēs medētes. 55. D  
 Sanguini sistendo apti globuli sub lingua tenendi. 55. E  
 Sanguini sistendo apti pastilli. 55. E  
 Sanguinem sistētia. 60. B  
 Sanguinē mittēti loco quæ iponenda. 54. E  
 Sanguis in naribus fluēs quomodo sistendus. 64. G  
 Sanguinis sputū uel eruptio, Hæmorrhagia. 7. B  
 Sanguis ab ore duobus modis exit. 7. A  
 Sanguinis ab ore fluentis signa. 7. B  
 Sanguinis ē capite manantis notæ. 7. B  
 Sanguinis ē capite fluentis curatio. 7. E  
 Sanguinis ē palato exeuntis notæ. 7. D  
 Sanguinem spuenti quomodo gratificandum. 55. G  
 Sanguinem spuentibus quæ medela præstantior. 54. H  
 Sanguinis sputum sistētia ore sumenda triplicia. 54. H  
 Sanguinē expuenti deligaturæ quales cōueniant. 54. E  
 Sanguinem spuentibus epithemata uti lia. 54. F  
 Sanguinem spuenti alimēta uaria curanda & qualia. 55. F  
 Sanguinem spuenti dura concoctū neganda. 55. H  
 Sanguinem spuenti cur nimium siccantia & crassantia uitanda. 56. A  
 Sanguinis reiectio, Anagoge. 7. B  
 Sanguinis reiectionem semper comitantia. 8. G  
 Sanguinis reiectio redire facile solet. 56. B  
 Sanguis à uena quo differt à sanguine ab arteria. 8. A  
 Sanguinis ab aspera arteria exeuntis notæ. 8. E  
 Sanguinis quæ effusione gula patiat. 8. B  
 Sanguinis à gula exeuntis signa. 8. C  
 Sanguinis ē pulmone effusi notæ. 8. E  
 Sanguinis ex pulmone reiectio omnium pessima cur minime hominē terreat. 8. H  
 Sanguinis ē pectore prodeūtis notæ. 8. E  
 Sanguinis à membrana costas succingentis notæ. 8. F  
 Sanguinis à uentriculo exeuntis indicia. 8. D  
 Sanguis à iecore & liene quo propellitur. 7. F  
 Sanguinis profluvia maxima iecur patitur. 11. C  
 Sanguinis ē iecore profusio sisti non potest. 24. C  
 Sanguinis ab inferioribus uisceribus reiectio mortifera. 7. E  
 Sanguinis reiectiōi cito succurrēdū. 54. B  
 Sanguinem reiectiōi qualis aer, locus, decubitusq; conueniat. 54. B  
 Sanguinem reiectanti silentium & animi oblectatio prodest. 54. B  
 Sanguini reiectiōi cū febre quæ p̄sint. 55. F  
 Sanguinem reiectanti quando & quæ uena secanda. 54. C  
 Sanguinem reicienti quantus et quomodo sanguis mittendus. 54. D  
 Sanguis si à liene fertur, quæ uena secanda. 54. C  
 Sanguinē reiectanti emplastra quæ conueniant. 54. F  
 Sanguinē reiectatipotus partissimus. 55. H  
 Sanguinem & spiritum crassantia. 55. H  
 Sanguinis reiectione suppressa quid agendum. 56. A  
 Sanguinis erupturi ad intestinis notæ. 35. E

\*\*\* ij



# A R E T E A I

Sanguinis profluuium ab intestinis quan=		Scirrhus iecoris hydropem creat.	24.E
do mortiferum.	35.H	Scirrhus lienis, uide Lienis.	
Sanguinis ab intestinis profluuiio cito oc=		Scirrhi inflammationibus succedūt.	71.C
currendum.	35.D	Sectio uenæ quibus uitij cōpetit.	42.A
Sanguinis mictus, uide Mictus sanguinis.		in Sectione uenæ regula.	46.B
Sanguinis de uestica profluuium.	32.A	Seminis seu genituræ facultates.	32.E
Sanguinis in uestica congelati signū.	31.A	Seminis uitalis facultates.	32.F
Sanguis homines nuper iugulati.	67.G	Seminis profluuij causæ.	32.D
Sanguinis misio usq; ad defectum animæ		Seminis profluuium in mulieribus quæ=	
dolorem sedat.	59.B	le.	32.D
Sanguinis misio, uide Sectio uenæ, &		Seminis profluuij symptomata.	32.E
Venæ sectio.		Seminis profluuium cur paralytim af=	
Satiari qbuslibet uel utilibus malū ē.	65.E	fert.	32.E
Satyrī Dionysio sacri.	14.E	Seminis profluuium satyriasi succedit.	
Satyriasis.	14.E.39.E	folio.	32.G
Satyriasis unde oritur.	62.F	Senectus frigida.	29.D
Satyriasis quæ comitentur.	62.G	Senectæ frigidæ & humida.	2.E
Satyriasi quæ accidunt.	14.E	Senectæ delirium unde fit.	17.H
Satyriasis facile nervos conuellit.	63.B	Senectæ uitium.	33.E
Satyriasis quomodo iterum soluitur.	14.G	Sensuū caligo est somni principiu.	42.G
Satyriasis septimo die hominem consu=		Sensuum nebula oculum est.	68.A
mit.	14.H	Sepiæ atramentum.	10.F
Satyriasis quibus anni temporibus, ætati=		Sicyonium oleum.	64.D
bus, naturis maxime accidat.	14.G	Simia homini mire prodest.	72.E
Satyriasm mulieres pati nequeunt.	14.H	Sinapis uires.	45.F.65.C
Satyriasis curatio.	14.G	inter Sinistram & dextram corporis par	
Satyriasm animæ deliquium leuat.	62.G	tem differentia.	19.D
Satyriasi qualis corporis purgatio com=		Sisarum.	65.E
petit.	62.H	Somni principium sensuum caligo est.	
Satyriasis quæ quibus locis exterius appo=		folio.	42.G
ni requiratur.	62.H	Somnus multus refrigerat, resoluit, stupe	
Satyriasi utilia cataplasmata & alia exte=		facitq; nervos.	14.G
rius applicanda.	62.A	Somnum inuitantia.	42.F
Satyriasm quales clysteres leuent.	63.A	Somniferum quomodo papauer.	42.G
Satyriasm cucurbitulæ ubi posita iu=		Somnum inuitant cuiq; usitata.	42.H
uent.	63.A	Somni mediocris utilitas.	66.D
Satyriasi hirudines quō profunt.	63.A	Somnus multus crassum facit.	68.A
Satyriasis inueterata qua methodo curan=		Sordida cuti mordacia.	72.F
da.	63.B	Spirandi initium in pectore.	3.G
Satyriasi quales cibi utiles.	63.C	Spirandi principium cor.	6.D.23.A
Scarificato loco sal quomodo inspergen=		Spirationis instrumenta.	6.D
das.	52.A	Sputū sanguinis uel eruptio, Hemorrhæ=	
Scarificatio minus uires lædit.	56.E	gia.	7.B
Scotoma.	16.B	Sputum citantia.	52.C
Scirrhus.	23.H	Sternutatoria.	45.C



# INDEX

<i>Sternutatoria quæ.</i>	64.D	<i>Syncopa.</i>	9.A
<i>Sternon, os pectoris.</i>	21.E	<i>Syncopa quid est.</i>	56.C
<i>Stomachi vires.</i>	32.G	<i>Syncopa cordis &amp; uitæ ægritudo est.</i>	9.B
<i>Stomachi munera.</i>	70.F	<i>Syncopæ causa.</i>	9.E
<i>Stomachi delectatione quæ sequat.</i>	32.G	<i>Syncopæ causa causus febris</i>	9.E
<i>Stomachus ieiunus atra bile uexat.</i>	32.G	<i>Syncopæ initium febris ardens.</i>	56.C
<i>Stomachici nonnunquam melancholici sunt.</i>	33.B	<i>in Syncopâ uersi causi symptomata.</i>	9.C
<i>Stomacho laborant literarum studiosi.</i>	33.C	<i>Syncopæ notæ.</i>	9.E
<i>Stomachi læsi notæ.</i>	9.D	<i>Syncopam futurâ, pspicere bonum est.</i>	56.C
<i>Stomachi ægri uaria symptomata.</i>	fo = lio. 32.G/H	<i>Syncopa quando aduenit.</i>	56.F
<i>Stomachus cordi noxas impertit.</i>	9.C	<i>Syncopa iam præsens non facile tollit.</i>	56.C
<i>Stomacho cor contiguum quos morbos excitet.</i>	33.C	<i>Syncopa futura arcenda, aut incipiens repellenda.</i>	56.C
<i>Stomachus si male deuoret, eger, morbo fameque consumitur.</i>	70.F	<i>Syncopa uexatis plusquam alijs gratificandum.</i>	57.A
<i>Stomachi morborum causæ.</i>	33.C	<i>Syncopæ potus &amp; cibus quales.</i>	56.H
<i>Stomachus ante uiolenta uomitoria excrucendus est.</i>	66.B	<i>Syncopæ inedia &amp; fames inimica.</i>	56.H
<i>Stomachus atra bile uexatus quomodo purgandus.</i>	68.H	<i>Syntectici, Colliquati.</i>	24.G
<i>Stomacho ac uiribus laboriosa est purgatio.</i>	68.H	<i>Syria cœle quibus morbis subiecta.</i>	4.G
<i>Stomachum pure occupari exitiosissimum.</i>	70.F	<i>Syriaca &amp; Aegyptia ulcera.</i>	4.G
<i>Stomachi pure occupati notæ.</i>	70.G	<b>T</b>	
<i>Stomacho pus suscipienti quomodo succurrendum.</i>	70.G	<i>Abidos facit ægritudo longa.</i>	fo = lio. 25.D
<i>Stomacho diligenter cauendum in omnibus puris effluuijs.</i>	71.A	<i>Temperantiæ utilitas.</i>	23.F
<i>Storvne.</i>	64.F	<i>Tergentia corpus.</i>	72.D
<i>Strangulatū auget deliquium animi.</i>	53.A	<i>Terræ species fluori sanguinis medentes.</i>	55.D
<i>Stratum durum nervis ingratum.</i>	41.E	<i>Tetanus.</i>	2.C
<i>Strophus.</i>	34.B	<i>Tetanus neruorum labes.</i>	9.B
<i>Succingens membrana cur tantum puris contineat.</i>	21.G. uide Membrana.	<i>Tetanus ad syncopam uergit.</i>	48.A
<i>Sudorem sistens epithema.</i>	57.E	<i>Tetanus quas partes corporis maxime ledat.</i>	48.C
<i>Sudori sistendo uaria remedia.</i>	57.G	<i>Tetani signa.</i>	2.G
<i>Suppurationem quæ partes ægre admittunt.</i>	22.D	<i>Tetanus a uulnere letalis.</i>	48.F
<i>Suppuratio in quibus membris mortifera.</i>	22.E	<i>Tetanus patientis cubiculum quale.</i>	48.A
<i>Suum pedes concoctu faciles.</i>	68.D	<i>Tetanus patientis lectus qualis.</i>	48.A
<i>Synanche, Angina.</i>	3.C	<i>Tetano sectio uenæ quomodo adhibenda.</i>	48.B
		<i>Tetano inedia non conuenit.</i>	48.B
		<i>Tetano cibi conuenientes.</i>	48.B
		<i>Tetano uexati corpus quibus inungendum &amp; oblinendum.</i>	48.C
		<i>Tetani fomenta.</i>	48.C
		<i>Tetani caput quomodo fouendum.</i>	48.D
		<i>Tetanicorum capitis epiplasmata qualia.</i>	48.E



# A R E T A E I

Tetanicis cucurbitula ubi & quomodo affigenda. 48.E  
Tetanicis castoreum salutare. 48.G  
in Tetano quomodo utendum castoreo. 48.G  
Tetanicis laserpitij lachryma quomodo danda. 48.H  
Tetanici anus & uestica quibus illinenda. 49.A  
Tetanico per clysterem quod purgatorium infundendum. 49.A  
Tetani à uulnere curatio. 48.G  
Tetani ulcere cataplasmata qualia. 48.G  
Thapsia cephalæa prodest. 65.B  
Theriaca elephantis omnium remediorum utilissima. 72.C  
Thymelæa. 49.D. 67.F  
Thymi coma atram bilem educit. 68.H  
Tinesmus. 10.D  
Tosi in articulis. 38.D  
Tonus. 2.C  
Tonsillarum ulcera benigna. 4.D  
Tonsillarum ulcera pestifera. 4.D  
Tonsillas ledentia. 4.F  
Tonsillarum morbi cur pueros uexent. 4.F  
Tonsillarum uitia quoniam puellas tentant. 4.G  
Tonsillarum uitia quibus regionibus abundant. 4.G  
Tonsillarum morbos comitantia. 4.G

## V

Vari à grecis Ionthi appellati. folio. 38.D  
Vasculorum erosione rupturæ & rarefactionis curatio quo differt. 8.B  
Venenum in corporibus nostris creat. 3.D  
Venarum radicatio iecur. 11.C. 23.G  
Venæ causæ radicatio iecur. 60.E  
Venæ causæ situs & partes. 11.G  
Venæ causæ inflammatio. 12.B  
Venæ causæ inflammatio signa. 12.B  
Venæ causæ & arteriæ innanatio non facile defectum animi tollit. 60.F  
Venæ causæ & Arteriæ Ardor. uide Ardor.  
Venæ cubiti causæ utilitas. 54.C  
Venarum cubiti quarundam declaratio. 54.C

Vena ad lienem pertinens. 54.D  
Venæ somniferæ carotides. 13.H  
Venarum rarefactioni & diuisioni adstrictio medetur. 54.H  
Venarum rarefactionis remedia. 55.A  
Venarum erosioni congelatio sanguinis & caloris succurrit. 55.A  
Venarum erosionibus quæ applicanda. 55.C  
Venarum uulneris remedia. 55.B  
Venæ sectio quibus uitis conuenit. 42.A  
uide Sectio uenæ. uide Sanguinis missio.  
Venus capiti ac neruis inimica. 65.F  
Venus epilepsiæ similitudinem adducit. folio. 68.E  
Veratri albi facultates. 72.G  
Veratrum album igni simile. 72.H  
Veratri exhibendi uarij modi. 66.B  
Veratrum nigrum quomodo exhibendum. 68.G  
Ventriculus concoctioni destinatus. 33.F  
Ventriculi concoctionis imperfectæ signa. 33.H  
Ventriculi sanguinem effundentis signa. 8.B  
Ventriculi inflammationi succurrentia. folio. 42.H  
Ventriculum tumidum curantia. 42.G  
oris Ventriculi remedia. 44.D  
Vertigo. 16.B  
Vertiginis notæ. 16.C  
Vertiginis causæ. 16.B  
Vertiginis uariæ causæ. 65.G  
Vertiginis causæ alimentum est sanguis & uentriculus. 65.H  
Vertiginis à cephalæa qualis curatio. folio. 65.G  
Vertiginis ab humorum retentione curatio. 65.H  
Vertigine quando sectio uenæ, quando cucurbitula subuenit. 65.H  
Vertiginosis quæ uenæ, quæ arteriæ secantur. 66.A  
Vertiginoso cucurbitula ubi ponenda. folio. 66.A  
Vertiginoso capiti omnia adhibenda quæ



# INDEX

- cephalææ.* 66. A  
*Vertigini prodest cyclamini succus & a=*  
*nagallidis in nares infusus.* 66. A  
*Vertiginosi quando & quibus uomitibus*  
*uti debent.* 66. A  
*Vertiginis accessionibus quomodo succur*  
*rendum.* 66. B  
*Vertiginis accessionem discutientes her=*  
*bæ.* 66. C  
*Vertigini quàm noceat somnus immodi=*  
*cus.* 66. D  
*Vertigini uigilia quæ noxia.* 66. D  
*Vertiginem leuat alui lenitas.* 66. D  
*Vertiginosis frictions & ambulationes*  
*quales conueniant.* 66. D  
*Vertiginosi qualem uocem exercere de=*  
*bent.* 66. E  
*Vertiginosos qualis gestatio iuuat.* 66. E  
*Vertiginoso quomō caput & manus exer*  
*cende & fricande.* 66. F  
*Vertiginosis pilæ ludus detrimento ē.* 66. F  
*Vertiginoso pdest saltus & cursus.* 66. F  
*Vertiginosus quiescat ab audiendo & lo=*  
*quendo.* 66. H  
*Vertiginosi quibus locis ambulare de=*  
*bent.* 66. H  
*Vertiginoso qualis capitis lauatio pro=*  
*dest.* 66. G  
*Vertiginosus ante coenam lauatur.* 66. H  
*Vertiginosis potus & cibus qualis.* 66. G  
*Vertiginosis oua qualia cōueniunt.* 66. H  
*Vertiginosi cœna qualis.* 66. H  
*Vertiginosis quæ carnes sumende.* 66. A  
*Vertiginosis secūde mensæ quales.* 67. A  
*Vertiginosis à cœna quæ facienda.* 66. A  
*Vertiginem affert inspectus aquæ flu=*  
*xus.* 68. A  
*Vertiginem & epilepsiam circūuolutio*  
*accersit.* 68. B  
*Vertex capitis euacuationi commo=*  
*dum.* 44. H  
*Vesicæ locus.* 13. C  
*Vesicæ & anus inter se coherent, mu=*  
*tuosq; afficiuntur.* 31. H  
*Vesicæ munus.* 13. C  
*Vesicæ natura.* 13. C. 32. B  
*Vesicæ uitijs pueri maxime uacant.* 13. F  
*Vesicæ uitia quo tempore quauē atate ui*  
*gent.* 13. F  
*Vesicæ acuti morbi qui accidunt.* 61. E  
*Vesicæ acutorum morborum notæ.* 13. E  
*Vesicam lædentes causæ uenenosæ.* 13. E  
*Vesicam morbi omnes difficiles.* 31. F  
*Vesica morbi laborantium miseria.* 32. C  
*Vesica seuos dolores patitur.* 13. B  
*Vesica oī corpori dolorem ipertit.* 13. B  
*Vesicæ dolor acutior & mors celerrima*  
*sequitur.* 61. E  
*Vesicæ occlusionis frequens causa.* 13. C  
*Vesica occlusa quæ mala inferat.* 13. C  
*de Vesica sanguinis profluuium.* 32. A  
*Vesica qualem sanguinem effundit.* 13. E  
*Vesicæ sanguineum profluuium raro mor*  
*tiferum.* 13. E  
*Vesicæ grummi & phlegmonæ exitiales*  
*sunt.* 13. F  
*Vesicæ grummi quæ sequuntur.* 32. A  
*Vesicæ urinariæ paresis.* 19. F  
*Vesicæ resolutio.* 47. C  
*Vesicæ ulcerum signa.* 32. B  
*Vesicæ uulnus letale.* 32. B  
*Vesicæ calculi, uide Calculi.*  
*Vesicæ pus suscipientis notæ.* 70. F  
*Vesica cur non ualde refrigeranda.* 61. G  
*Vesica laborante quæ pars corporis se=*  
*canda.* 61. F  
*Vesica laborans quibus irriganda.* 61. F  
*Vesicæ ægræ q̄ medicamina potāda.* 61. G  
*Vesicæ laboranti cicadæ utiles.* 61. G  
*Vesicæ laboranti i sefiones q̄ utiles.* 61. H  
*Vesicæ laborāti quales cibi conueniant.*  
*folio.* 61. G  
*Vesicæ grummi quibus dissoluendi.* 61. G  
*Vesicæ inflammationi specillo uti non p=*  
*dest.* 61. H  
*Vesicæ resolutæ curatio.* 47. D  
*Vesicæ pus suscipienti quomodo succur=*  
*rendum.* 70. H  
*Veterno similis est catochus.* 45. H  
*Veternus flatibus abundat.* 44. H



# A R E T A E I

Veternosis quale sit imū ītestinū. 44.D	Viperatum carnes quomodo elephantis parandæ. 72.B
Veternosum excitantia. 44.C	Visio alijs sensibus certior est. 20.G
Veternus phrenitidi succedens quomodo curandus. 44.C	Vitæ principium in præcordijs est. 4.H
Veternus per se incipiens quomodo tollendus. 44.D	Vitæ principium cor. 6.D.33.A
Veternosus quomodo habendus. 44.C	Vita quorū nō possit esse longior. 10.A
Veterno quando & qualis sectio uenæ qñ & qualis purgatio conueniat. 44.D	Viuent ob quæ præcipue animalia. 6.C
Veternoso inedia & cibi multitudo nocet. 44.E	Viuera. 22.B
Veternosorum cibi. 44.E	Vlcera Aegyptia, & Syriaca. 4.G
Veternosorū capitis irrigationes. 44.F	Vlcus in articulo difficile est. 32.C
Veternosorum inunctiones. 44.F	Vlcera intestinorum, uide Intestinum.
Veternosis quando cucurbitula applicanda & ubi. 44.H	Vlcera renum, uide Renes.
Veterni illitiones. 44.H	Vlcera uesticæ, uide Vescica.
Veterni fomenta. 45.A	Volatilium carnes natura leues. 69.C
Veternosis conuenientes potiones. 45.A	Voluulus, ileus. 10.E
Veternosis utilia odoramenta. 45.C	Voluuli causæ. 10.F
Veternosis pedes & genua quibus illinenda. 45.D	Voluulum qñ creat frigida potus. 10.F
Veternosis conueniens cataplasma. 45.E	Voluulus quas ætates plus minusue dit. 10.G
Veternosorum apophlegmatismi. 45.F	Voluulus quo tempore anni plus minusue infestat. 10.G
Veternosis caput cur radendum. 45.G	Voluuli mediocris signa. 10.G
Veternosis qñ lauatio proderit. 45.G	Voluuli maximi signa. 10.G
Veternosis quando prodest lenis corporis agitatio. 45.G	Voluuli in colo intestino signa. 11.A
Veternosis urtica utilis. 45.D	Voluulus in colo cur minus periculo= sus. 11.B
Veterno similis est catochus. 45.H	Voluulus celerrime ac fœdissimè necat. folio. 59.B
Victimæ cacochymæ carnes habent grā= dinosas. 40.B	Voluulo præsentissima remedia adhibenda. 59.B
Vigilia ad exterius mouet ac dissipat. folio. 17.E	Voluulo quādo missio sanguinis larga cō= ueniat. 59.B
Vigilia & motus discutiunt. 44.H	Voluuloso quando non secāda uena. 59.C
Vigilia famem cit. 18.F	Voluulo qñ uomitus conuenit. 59.C
Vini epoti facultates. 44.A	Voluulosis quæ ano adhibenda. 59.C
Vini potus quorum auctor. 63.B	Voluulo conuenientes clysteres. 59.D
Vinū solum refrigeratos restituit. 57.D	Voluuloso quæ exterius uentri adhibenda. 59.D
Vinum sine cibo sumptum lædit mentem. folio. 57.C	Voluuloso cucurbitulæ ubi apponenda. folio. 59.D
Vini potio causo uexatis quando obest, qñ prodest. 56.F	Voluuloso quæ bibēda medicamēta. 59.E
Vinum absinthite elephāticis bonū. 72.F	Voluuloso cibi aluum lenientes dādi. 59.F
Viperæ remedium quō inuentum. 40.F	Voluuloso iura subducentia conueniunt. folio. 59.F
	Voluuloso uinum quando prodest. 59.F

Vox



# INDEX

<i>Vox medioeriter acuta capiti prodest.</i>		<i>Vulturis cerebrum.</i>	67. G
folio.	66. E	<i>Vulvæ situs.</i>	13. G. 62. A
<i>Vocem acutam edere quàm noceat capi-</i>		<i>Vulvæ natura.</i>	62. A
ti.	66. E	<i>Vulva ueluti in animali quoddam ani-</i>	
<i>Vrina interclusa quæ mala inferat.</i>	12. G	mal.	13. G
<i>Vrina interclusa qui pereant, qui libe-</i>		<i>Vulva quibus delectetur &amp; contristetur.</i>	
rentur.	13. A	folio.	13. G
<i>Vreteres, Vrinæ ductus.</i>	13. D	<i>Vulvæ mobilitas.</i>	13. G
<i>Vrinæ canales.</i>	30. E. 31. B	<i>Vulva suapte natura superfluitat.</i>	fo =
<i>Vrethra.</i>	31. B	lio.	14. C
<i>Vrſi adeps.</i>	72. D	<i>Vulvæ ascendentiſ causæ.</i>	14. A
<i>Vrtica eſculenta eſt.</i>	68. D	<i>Vulva ſuperiora petens quantum ledat.</i>	
<i>Vrtica ueternoſis utilis.</i>	45. D	folio.	13. G
<i>Vteri functiones.</i>	36. D	<i>Vulva ſurſum petens celerrime ſtrangu-</i>	
<i>Vteri tunica.</i>	37. D	lat.	62. B
<i>Vteri membranæ.</i>	37. D	<i>Vulvæ ſtrangulatui morbus ſimilis.</i>	13. H
<i>Vteri tunica cur exit.</i>	37. D	<i>Vulvæ ſtrangulatus cauſæ.</i>	14. A
<i>Vteri oſculum quomodo procidit &amp; re-</i>		<i>Vulvæ ſtrangulatus quas ætates uexet.</i>	
dit.	37. D	folio.	14. C
<i>Vteri morbi longi.</i>	36. D	<i>Vulvæ ſtrangulatu affectæ poſt mortem</i>	
<i>Vteri ſtuoris differentiæ ſecundū mate-</i>		magis rubent.	14. D
rias.	36. E	<i>Vulvæ exitus.</i>	37. C
<i>Vteri ſtuoris differentiæ ſecundū circui-</i>		<i>Vulvæ exitus cauſæ.</i>	37. D
tus.	36. E	<i>Vulvæ exitus plerunque mortiferus un-</i>	
<i>Vteri proſtutij ſigna.</i>	36. F	de.	37. C
<i>Vteri proſtutium quod peſſimum.</i>	36. G	<i>Vulvæ morbi communes uiris.</i>	14. D
<i>Vteri proſtutium quod minime malum.</i>		<i>Vulvæ ſanguinis profuſio celeriter ne-</i>	
folio.	36. G	cat.	14. D
<i>Vteri ulcera.</i>	36. H	<i>Vulvæ inflammatæ quæ accidunt.</i>	62. D
<i>Vteri cancer.</i>	37. B	<i>Vulvæ prodeſt ut menſes ferantur.</i>	62. F
<i>Vua.</i>	3. H. 4. A. 50. A	<i>Vulva prodeſt hiera cum caſtoreo.</i>	62. F
<i>Vuæ &amp; columnæ celerrime ſuccurren-</i>		<i>Vulva quomodo uiolentiſ depellenda.</i>	
dum.	50. A	folio.	62. E
<i>Vuæ &amp; columnæ uenæ ſectio qualis con-</i>		<i>Vulvæ ſurſum lapſa inferius quæ appo-</i>	
uenit.	50. A	nenda.	26. D
<i>Vuæ &amp; columnæ conuenientes clyſte-</i>		<i>Vulvæ detrabendæ ubi cucurbitula defi-</i>	
res.	50. B	gantur, ubi ſtrangulatui leuādo.	62. E
<i>Vuæ &amp; columnæ conuenientes ligatu-</i>		<i>Vulvæ ſtrangulatum ſedantia.</i>	62. C
re.	50. B	<i>Vulva infeſtante quibus ad ſe redibit mu-</i>	
<i>Vuæ &amp; columnæ quando &amp; ubi cucur-</i>		lier.	62. F
bitula conueniat.	50. B	<i>Vulvæ inflammatæ ſtrangulatui quæ uena</i>	
<i>Vuæ &amp; columnæ adſtringentia quæ con-</i>		ſecta opituletur.	62. E
ueniant.	50. C	<i>Vulva inflamata quæ uena ſecanda.</i>	62. C
<i>Vuæ ulceratæ quæ adhibenda.</i>	50. C	<i>Vulva inflamata quibus anus inungendus</i>	
<i>Vulpaſer autē ſpecies.</i>	72. D	& quibus clyſteribus utendū.	62. D

\*\*\*



# INDEX EORVM QVAE SVNT

## IN RVFFI LIBRIS.



Bdomen. fol.	Antisternon.	86. A	Bilis atra.	81. C
76. H. 83. H	Antitragus.	83. A	Bilis flava.	81. C
Acetabula.	Anularis digitus.	76. E	Bilis porracea ac rugino=	81. C
77. E. 89. F	83. E		sa.	81. C
Acetabulum humeri.	Anulus.	87. C	Bilis receptaculum seu ua=	
76. B	Aorta.	80. G	sculum.	86. C. 79. G
Achichadaron.	Aortæ.	79. B	Bilis meatus ad intestina.	
77. B	Aqualiculus.	76. H	86. C	
Acini.	Aquila uenæ.	80. E	Bilis usus.	86. C
76. E	Arachnoides tunica.	78. B	Blepharides.	74. G
Acini cacumina.	83. F		Brachiale.	76. D. 89. C
Acinialis tunica oculi	Aranealis tunica.	78. H	Brachium.	76. D. 83. E.
85. D	85. E		89. B	
Acromion.	Arcule.	88. G	Bronchia.	79. B. 86. A
76. B. 83. E	Area.	79. E	Bronchus.	76. A. 83. D
Acromphalon.	Arteriarum munus est mi=		86. A	
76. H	carc.	80. G. 88. A	Bruta iugulis carët.	76. A
Actiui nerui.	Arteriæ ab antiquis uenæ			
81. A	dictæ tortæ, spirabilia			
Adenes qui sint.	uasa, cauerna, inanita=			
88. A	tes, nerui.	80. G		
et ubi.	Arteria crassa.	80. H		
79. C	Arteria aspera.	76. A.		
Adeps.	83. D			
81. A. 88. A	Arteriæ et uenæ pulmonis			
Adstrictor.	quales.	80. F		
87. B	Arterialis uena.	80. F		
Agnina membrana.	Ascoma.	76. G		
81. F	Aspera arteria.	86. A		
Ala.	Assessor os hyoides.	79. A		
76. B. 83. E	Assessores.	79. H. 87. F		
Alæ seu pinnae nasci	Astragali.	77. D		
82. F	Atra bilis.	81. A		
Altrices uenæ testium. fo=	Auditus.	75. C		
lio.	Auditorij meatus.	83. A		
80. D	Auricula.	79. C. 83. A		
Aluus.	Auriculæ cordis.	86. F		
76. H. 83. H	Auriginis ortus.	86. C		
Amatorium.				
82. F				
Amnios membrana.				
81. F				
Amphidion.				
80. B				
Amphiplx.				
77. B				
Anatome humanorum cor				
porum antiquitus fie=				
bat.				
74. D				
Ancon.				
76. D. 83. E				
Ancystroides et Ancyroi=				
des processus.				
89. A				
Anguli oculorum.				
74. H.				
82. G				
Animalia homini similia.				
77. H				
Anthelices.				
75. D. 83. A				
Anthereon.				
82. H				
Antiades.				
76. A. 85. H				
Anticardion.				
76. B. 83. D				
Antilobis.				
75. D				

**B** Asts. folio. 79. F  
Biceps exortus. 79. E

**C** Aeca foramina. folio. 79. D  
Cæcum intestinum. 79. E  
87. C  
Cælum. 83. C  
Calor. 81. E  
Caluariæ foramina in fun= do. 88. G  
Caluaria. 88. F  
Calx. 77. G. 84. D  
Candida oculi tunica. 75. A  
85. C  
Canini dentes. 75. F  
Canthus. 74. H  
Caput. 82. B  
Capitis futura. 78. A  
Caput geminorum. 77. B  
Caput humeri. 76. D  
Caput lienis. 79. G  
Caput scroti. 84. A  
Caro musculorum. 81. B  
Carotides arteriæ. 80. H



# R V F F I I N D E X

Cartilaginee. 81.A.88.B	Collum. 76.A.83.D	Cranteres. 75.F
Caro uiscerum. 81.A	Colli uerterbrae. 88.H	Crassa arteria. 80.H
Cavernae. 79.B.80.G	Collum uteri. 8.C	Cremni. 77.C
Cava uena. 80.D	Collum uesticae. 77.A	Crines. 74.F.82.E
Cavum. 74.G	Colon. 79.E.87.C	Crotaphi. 74.I
Cavum pedis. 84.D	Columella. 83.C.85.G	Crystalloides tunica oculi
Centones. 77.D	Columna. 75.C.H.82.F	78.H.83.E
Cercis. 89.B	Conceptacula cordis. 86.F	Ctedones. 85.I
Cerebellum. 85.A	Concha. 75.D.83.A	Cubicum os. 89.H
Cerebrum. 81.B	Condyl. 76.E	Cubitus 76.D.83.E.89.B
Cerebrum in homine maxi	Conuexum iecoris. 79.F	Cubitissare. 76.D
mum. 85.A	Coniungens sutura. 78.B	Cuculus. 77.D.84.B
Cerebri substantia. 85.A	Copulatiui nerui. 81.A	Cunnu. 80.C
Cerebri uentriculi. 78.F	Cor. 76.G.83.G	Cypselis. 81.C
Cerebri ps uaricosa. 78.F	Cordis auricula. 86.F	
Cerebri membranae. 78.F	Cordis caput. 79.B	
Cerebri pria tunica. 85.B	Cordis conceptacula. 86.F	
Cerebri secunda tunica.	Cordis corpus. 86.E	
85.B	Cordis forma. 86.E	
Cervix. 76.A.80.C.83.	Cordis motus. 86.E	
C.D	Cordis sinus. 86.E	
Cervix linguae. 75.G	Cordis stus. 86.E	
Cerumina. 81.C	Cordis morsus. 76.G	
Cesta. 76.G	Corae Pupille. 82.G	
Chela. 74.G	Cornea oculi tunica. 85.C	
Chemosis. 75.A	Cornicularis tunica. 75.A	
Chet. 82.E	78.G	
Chorion. 85.E	Cornua & Cirri. 80.B	
Choroides tunica cerebri	Corona. 75.A	
78.F	Coronae. 74.G	
Choroides tunica oculi	Corona futura capitis. 82.E	
85.D	Coronaria futura. 78.B	
Chylos. 81.E	88.F	
Chymos. 81.E	Corse. 74.F	
Cilia. 74.G.82.G	Coryza. 75.B	
Circuossalis tunica. 78.A	Coste. 83.G	
Circulus. 82.G	Costarum forma. 89.D	
Cirri. 80.B	Coste spuria. 76.G.83.	
Claues. 83.D	G.89.E	
Clitoris. 77.C	Cotyla. 89.F	
Clunes. 77.E.84.B	Coxe. 89.E	
Coccyx. 77.D.8.B	Coxendix. 77.E	
Coles. 84.A	Cremnaster. 80.D	
Colis. 77.A		

D

**D** Artos. fol.86.D  
87.G

Deiectiones albae. 86.C  
Delphis. 80.B  
Dens uerterbra. 79.A  
Dentes. 75.F.83.B  
Dentes incisores. 83.B  
Dentes genuini. 75.G  
Dera. 83.D  
Dextrae ptes cur sinistris  
ualidiores. 86.D  
Digitorum terna ossa pra  
ter pollicem. 89.C  
Digitus magnus. 76.E  
Digitus medius. 76.E  
Dionysius Oxyrnachi 80.F  
Diploe. 78.B  
Discoides tunica oculi.  
85.E  
Dodecadactylus. 87.B  
Dorsalis medulla. 78.G  
81.B  
Dorsum nati. 75.C  
Dorsum scapularu. 76.B  
Draconitides uena. 80.E

E

**E** Fflorescentia. so=  
lio. 80.F  
\*\*\*\* ij



- Electiui nervi. 81. A  
 Epanthismos. 80. F  
 Ephebron. 76. H  
 Ephedrana. 84. B  
 Epidermis. 75. A  
 Epigastrium. 76. H. 83. H  
 Epiglossis. 75. H. 83. C. 85. F  
 Epigonatis. 77. F. 89. G  
 Epigunides muscoli. 84. C  
 Epimylis. 77. F  
 Epiploon. 79. F  
 Epistemon. 77. C. 83. H  
 Episcenion. 74. F. 82. E  
 Επὶ τοῦ κυβίου os. 89. H  
 Epomides. 76. B. 83. D  
 Erythroides tunica. 80. D  
 87. G  
 Eudemus. 80. F  
 Eunuchi quale semen eij-  
 ciunt. 87. G  
 Exortus biceps. 79. E  
 Extremitas nasi. 75. C  
**F**  
 Aba. folio. 76. G  
 Facies. 75. E  
 Fauces. 75. H  
 Femina. 77. E. 84. E  
 Femora. 89. F  
 Fibra. 75. D. 83. A  
 Fissum. 84. A  
 Flatus. 81. C  
 Flava bilis. 81. C  
 Frons. 74. F. 82. E  
 Fundum cordis. 79. B  
 Fundū scroti. 77. B. 84. A  
 Fundum uteri. 80. C  
**G**  
 Astrocnemia. fo-  
 lio. 77. F  
 Gemini testes. 77. B  
 Geminorum caput. 77. B  
 Genæ. 74. G  
 Genitales uenæ. 79. H.  
 87. F  
 Genitura. 80. B. 81. D  
 Genuini dētes. 75. G. 83. B  
 Genu. 77. F  
 Gingivæ. 75. G. 83. B  
 Glabella. 74. F. 82. E  
 Gladius in iecore pars.  
 79. G  
 Glandulosa (uasa semina-  
 ria). 79. H. uel glandu-  
 losi. 87. F  
 Glandulosa carnes. 89. A  
 Glans. 77. A  
 Glena. 74. H. 82. G  
 Globulus. 75. C. 82. F  
 Gonos. 81. D  
 Gracile intestinum. 79. E  
 Gula. 79. B. 86. A  
 Gula figura. 86. H  
 Gula munus. 86. H  
 Gula situs. 86. G  
 Gurgulatio. 76. B  
 Gurgulio. 75. H. 83. C  
 Guttur. 76. B. 79. B. 83. D  
**H**  
 Abena. fol. 75. G  
 83. B  
 Helicæ. 75. D. 83. A  
 Hemine. 77. D  
 Hepaticis. 80. E  
 Hilithya membrana cur  
 Ammias dicta. 81. F  
 Hircus. 75. D  
 Hō exiguus mundus. 85. A  
 Homo latissimi pectoris  
 est. 76. C  
 Hostiarius. 79. D. 87. A  
 Hostium uentriculi. 83. G  
 Hostium uteri. 80. C  
 Humerus. 76. B. C. 83. E  
 88. H.  
 Humeri brachiorum capi-  
 ta. 83. D  
 Humeri acetabulum. 76. B  
 Humeri caput. 76. D  
 Humeri forma et situs.  
 89. B  
 Humeri uteri. 80. C  
 Humor vitreus. 85. E  
 Humores in tunica foetus.  
 81. F  
 Hyaloides tunica oculi.  
 78. H  
 Hypena. 75. F  
 Hypochondria. 76. G. 83. H  
 Hypodermis. 77. C  
 Hypodirix. 76. A  
 Hypoglossis. 75. H. 83. C  
 Hypoglutides. 77. E  
 Hypopia. 75. B. 82. H  
 Hyporinon. 75. C. 82. F  
 Hypospondylon. 77. D.  
 84. B  
 Hypostema. 84. A  
 Hypothenar. 76. E  
 Hypothenatron. 83. E  
 Hystera. 80. B  
**I**  
 Anitor. folio. 79. D  
 Iecur. 86. B  
 Iecoris conuexum. 79. F  
 Iecoris porta. 79. G  
 Iecoraria uena. 80. E  
 Ieiunum. 79. D. 87. B  
 Ilia. 77. D  
 Ilium ossa. 77. D  
 Inanitates. 80. G  
 Incisores dētes. 75. F. 83. E  
 Index digitus. 76. E. 83. E  
 Inguina. 77. E. 84. C  
 Intercostalia. 76. G. 83. G  
 Interfemina. 77. E  
 Internodia. 76. E. 83. F.  
 89. C. 90. D  
 Inter



# INDEX

- Interseptientes membra  
ne. 79.C  
Interseptum seu Septū trāf  
uersum. 86.G  
Interseptum nasi. 75.B  
82.F  
Intestinum. 79.D  
Intestinum cecum. 79.E  
Intestinum gracile. 79.E  
Intestinorū gracilium om=  
nium longitudo et si=  
tus. 87.B  
Intestinum maius. 87.C  
Intestinum rectum. 87.C  
Intestinum laxum. 79.E  
Intestinorum omnium unū  
et idē forāmen. 87.A  
Iris. 74.C.82.G  
Isthmus. 85.H  
Iter urinarium. 77.A  
Ithmoide foramina. 78.B.  
uel Ithmodes os. 88.G  
Iugalia ossa. 78.C  
Iugula. 76.B.83.D  
Iuguli forma et situs. 89.A  
Iugulatio. 83.D  
Iulus. 75.E. seu Iuli. 47.F.  
82.E
- L**  
Labia. folio. 75.C.  
82.F  
Lac. 81.D  
Laccapedon. 77.B.84.A  
Laccoschea. 77.B  
Lacertus. 83.E  
Lactes. 79.E.87.D  
Lambdalis sutura. 88.F  
Lambdoides sutura. 78.H  
Lanugo. 74.F.75.E.82.E  
Lapara partes. 77.D  
Lapidea ossa. 78.C  
Lata scapularū ossa. 76.B  
Latus. 76.G.83.G
- Laxum intestinum 79.E  
Lenticularis mēbrana ocu=  
li. 78.H.85.C  
Lepidoides sutura. 78.B  
Leucania. 75.E.76.B.  
82.H  
Lienaria uena. 80.E  
Lientis caput. 79.G  
Lientis forma. 86.D  
Lientis uenae quales. 80.E  
Lingua. 75.G.85.F  
Linguae ceruix. 75.G  
Linguae radix. 75.G  
Lobus. 75.D  
Loci muliebres. 80.C  
Lumbi. 76.F.83.G.84.B
- M**  
M Agnus digitus.  
fol. 76.E.83.E  
Maius intestinum. 87.C  
Male. 75.E.82.H  
Malleoli. 77.F.84.D  
Mammae. 76.F.83.G  
Manus. 76.E  
Marmorata. 86.I  
Mandibula. 82.H  
Maxilla. 75.E.82.H  
Maxillares dentes. 75.F  
Meatus auditorij. 83.A  
Meatus bilis ad intestina.  
86.C  
Medius digitus 76.E.83.E  
Medulla. 81.B.88.C  
Medulla dorsalis seu spi=  
nalis. 79.G.81.B.85.B  
39.D  
Medulla ossalis. 81.B  
Membrana. 81.A  
Membranae cerebri. 78.F  
Membranae intersepien=  
tes. 79.C  
Membrana succingens.  
86.G
- Mēbranula spinalis. 81.B  
Mēsa in iecore pars. 79.G  
Mense. 75.G.83.B  
Menses. 81.D  
Mentum. 75.E.82.H  
Mesaraeon. 79.E.87.D  
Mesenterion. 79.E.87.D  
Mesomenia. 77.E  
Mesophryon. 74.F.82.E  
Metacarpion. 76.D  
Metacondyli. 76.E  
Metaphrenon. 76.F.83.F  
Metra. 80.B  
Minimus digitus. 83.E  
Mnesithei opinio q̄ Chylo,  
et Chymo. 81.E  
Mola. 84.C.89.G  
Molares dētes. 75.F.83.B  
Morsus cordis. 76.G  
Mortariola. 75.G.83.B  
Mucor. 75.B  
Mucus. 81.C  
Muliebres loci. 80.C  
Muliebris sinus. 80.C  
Musculus. 88.B  
Musculi tēporarij. 78.D  
Musculorum caro. 81.B  
Myrtachile. 77.C.84.B  
Myrton. 77.C.84.B  
Mystaces. 75.F  
Myxa. 75.B
- N**  
Nares. fol. 82.F  
Nasus 75.B.82.E  
Nasi dorsum. 75.C  
Nasi extremitas. 75.C  
Nasi interseptum. 75.B  
Nasi pinna. 75.C  
Nates. 75.B.77.E.84.B  
Nauiculare os. 90.A  
Neruus. 88.B  
Neruorum origo. 78.F  
Neruorum natura duplex  
\*\*\*\* iij



- secūdum Brasistratum. 76.G  
 SS.C  
 Nerviū facultates. 75.F  
 Nervi triplices secūdū He-  
 rophilum. 88.C  
 Nervi actiui, electiui, sen-  
 sorij. 78.F.81.A  
 Nervi copulatiui. 81.A  
 Nervi uisorij. 85.C  
 Nervi latus. 84.C  
 Nervi arterie ab antiquis  
 uocabantur. 80.G  
 Niera. 79.E  
 Nodi. 83.F  
 Noia prius in qualibet fa-  
 cultate discenda. 82.A  
 Nympha. 75.C.77.C.  
 84.B  
 O  
 Occipitium. fo-  
 lio.83.D  
 Occiput. 74.F.82.E  
 Oculi tunica prima. 75.A  
 85.C  
 Oculi tunica secūda. 85.D  
 Oculi tunica tertia. 85.E  
 Oculi tunica quarta. 85.E  
 Oculorum anguli. 82.G  
 Oesophagus. 79.B  
 Olecranon. 76.D.83.E  
 Omentum. 79.F  
 Omenti usus. 87.E  
 Omenti uulnus periculo na-  
 cat. 87.E  
 Omoplate. 76.E  
 Opinio Mnesitheii de chy-  
 mo, & chymo. 85.E  
 Opinio Zenonis de calore  
 & spiritu. 81.E  
 Opinio Praxagoræ de suc-  
 cis. 81.D  
 Orrhos. 77.A  
 Os. 75.F.83.B  
 Os uentriculi. 76.G  
 Offa. 88.B  
 Os cubicū ἐν τριῶν. 89.H  
 Os nasi. 88.G  
 Os naiculare. 90.A  
 Os pectoris. 76.F.83.G  
 Offa ilium. 77.D  
 Offa iugalia. 78.C  
 Offa lapidea. 78.C  
 Os sacrum. 77.D.84.B.  
 89.E  
 Offa scapularū lata. 76.B  
 Offalis medulla. 81.B  
 P  
 Alatum. folio. 75.  
 H.83.C  
 Palma. 76.D.83.E  
 Palpebra. 74.G.82.G  
 Pancreas. 79.F  
 Papilla. 76.F.83.G  
 Pappus. 75.F  
 Parameria. 77.E  
 Parastira. 75.G.83.C  
 Parencephalis. 78.F  
 Paristhnia. 76.A.85.H  
 Patella. 77.F.84.C.89.G  
 Pecten. 76.H.77.C.83.  
 H.84.A.89.E  
 Pectus. 76.F.77.G.83.F  
 Pectus manus. 83.E  
 Peluis. 85.C. seu peluicu-  
 la. 88.G  
 Penis. 84.A  
 Perforata oculi tunica. 85.D  
 Pericardios mēbrana. 79.  
 C.86.F  
 Pericranios tunica. 77.H  
 Perineus. 84.A  
 Perioftios tunica. 78.A  
 Peritonæos. 79.F  
 Feza. 84.D  
 Phalanges. 76.E.83.F  
 89.C  
 Pharynx. 85.H.86.A  
 Philistio Italus medicus  
 80.E  
 Philtron. 75.C.82.F  
 Phrenes. 79.C  
 Pinguetudo. 88.A  
 Pinnae auriū. 75.D.83.A  
 Pinnae nasi. 75.C  
 Pituita. 81.C  
 Plāta. 77.G.84.D.90.A  
 Plicas. 77.B.84.C  
 Pollex. 76.E.83.E  
 Poples. 77.F.84.C  
 Porracea ac ruginosa bilis  
 81.C  
 Portæ Mensa, Gladius, Vn-  
 guis in iecore. 79.G  
 Porta iecoris. 79.G  
 Præcordia. 76.G.83.H  
 Præcordium. 76.G  
 Praxagoræ opinio de Suc-  
 cis. 81.D  
 Prælinguium. 83.C  
 Præputium. 77.A.84.A  
 Præputij summum. 77.A  
 Præsepia. 83.B  
 Princeps intestinū. 79.E  
 Probarbium. 75.F  
 Procardia. 83.G  
 Procardion. 76.G  
 Prochyla. 75.C.82.F  
 Procondyli. 76.E.83.F  
 Profluium. 81.D  
 Proglosson. 83.C  
 Prolabia. 75.C.82.F  
 Propogonium. 75.F  
 Prostomion. 75.C.82.F  
 Pterigomata. 77.C  
 Pusæ. 80.A  
 Pubes. 76.B.83.H  
 Pudenda. 80.C  
 Pulmo. 86.A  
 Pulmonis uena & arteria



# INDEX

- Q**uales. 80.F  
 Pulsus. 88.A  
 Pupilla. 74.H  
 Pylides. 88.G  
 Pyloros. 79.D  
 Pyrinoidea uertebra. 79.A  
**R** Vatrio Alla. 89.H  
 chius. folio. 89.H  
**R** Adius. fol. 89.H  
 Radij sinus duo. 89.C  
 Radices unguis. 83.F  
 Radix lingue. 83.C  
 Rectum intestinum. 87.C  
 Renes. 79.G  
 Renum cribra. 87.D  
 Renum meatus. 87.E  
 Ren dexter altior et maior sinistro. 87.D  
 Renum uulnus mortiferum. 87.D  
**S** Acrum os. fol. 77.  
 D. 89.E  
 Sacra ueteres omnia magna nominabant. 89.E  
 Salua. 81.C  
 Sanguis. 81.C  
 Sanguineus sinus. 86.E  
 Scaphula. 88.F  
 Scapularum ossa lata. 76.B  
 Schisma. 77.C  
 Scissura. 77.C  
 Sceptula aperta. 83.D.  
 88.H  
 Scrotum. 77.A. 88.A  
 Scroti caput. 84.A  
 Scroti fundus. 77.B. 84.A  
 Scuticula. 76.E. 83.F  
 Scytades. 89.C  
 Secunda. 81.F  
 Sedes. 79.E  
 Sedilia. 77.E  
 Sedimentum. 77.A. 84.A  
 Semen. 81.D  
 Semen fecundum. 87.F  
 Semen infecundum. 87.F  
 Seminaria uasa glandulosa. 79.H  
 Seminaria uasa uaricosa. 79.H. 87.F  
 Seminaria uasa et in foeminis sunt. 79.H  
 Sensorij nerui. 81.A  
 Septum transversum. 79.C  
 83.G. 86.G  
 Seranges. 81.B  
 Sinus muliebris. 80.C  
 Sinus spirituosus. 86.E  
 Sinus sanguineus. 86.E  
 Sophronisteres. 75.G.  
 83.B  
 Spatula. 83.G  
 Sperma. 81.D  
 Sphincter. 87.B.C  
 Spina. 77.D. 83.D. 84.B. 89.E  
 Spinalis medulla. 78.G.  
 81.B. 85.B. 89.D  
 Spinalis membranula. 81.B  
 Spiritus. 81.E  
 Spirabilia uasa. 80.G  
 Spirituosus sinus. 86.E  
 Splenitis. 80.E  
 Spuria costae. 76.G  
 Squamose suturae. 88.G  
 Stema. 77.A. 82.A  
 Sternon. 77.F. 89.G  
 Stethos. 76.E. 77.G  
 Stiloides processus. 78.D  
 Stomachus. 29.A  
 Subcartilaginea. 83.H  
 Subcauum. 74.G  
 Subcaui tumor. 74.G  
 Sub mala habere. 76.G  
 Subnatales. 77.E  
 Subocularia ossa. 75.B.  
 82.H  
 Succingens membrana. 79.C. 86.G  
 Sudor. 81.C  
 Sumen. 83.H  
 Sura. 77.F. 84.C.D.  
 89.G  
 Supercilia. 74.F. 82.E  
 Supertentorium. 74.F.  
 82.E  
 Suspendor. 80.D  
 Suturae capitis. 77.H.  
 88.F  
 Suturae squamosae. 88.G  
 Suturae in facie. 88.G  
 Synciput. 74.F. 82.B  
 Scytalides. 90.A  
**T** Alus. folio. 77.F  
 89.H  
 Tarsus, idest Cilia oculorum  
 74.G. 82.G  
 Tarsus Os pedis. 77.G.  
 84.D. 90.A  
 Tempora. 74.F. 82.E  
 Temporarij musculi. folio.  
 73.D  
 Tendones. 76.B. 81.A  
 Tenores. 79.B  
 Tergum. 83.F  
 Testes gemini. 77.B  
 Testium altrices uenae. folio.  
 80.D  
 Testium materia. 87.H  
 Thenar. 76.E. 83.F  
 Thora. 81.D



# R V F F I I N D E X

Thorax.	74.E.82.B	lio.79.H.87.F	Visto.	74.B	
Thymus.	79.D	Vasculorum seminis exi=	Visorij nerui.	85.C	
Tibia. fol.77.F.84.D.		tus.	87.F	Vitreaticuna.	85.E
89.G		Vasculum bilis.	79.G	Vitreus humor.	85.E
Tibiae processus.	89.H	Vber.	76.G	Vlna.	83.E
Toni.	79.B.81.A	Vbera.	76.F	Vmbilicus.	76.H.81.F.
Tonsilla.	76.A.85.G	Venarum officium.	88.A	83.H	
Tragus.]	75.D.83.A	Venæ aquila.	80.E	Vnguis.	75.A
Trammis.	77.A	Venæ arteriales.	80.F	Vnguium radices.	76.E.
Transuersum septum. fo=		Venæ draconitides.	80.E	83.F	
lio.	79.C	Venæ uel arteria pulmo=		Vnguis in icore.	79.G
Tunica.	81.A	nis quales.	80.F	Vngula.	74.G
Tunica prima cerebri. fo=		Venæ genitales.	79.H.	Vola.	76.F.83.E.F
lio.	85.B	87.F		Vreteres.	77.A.79.H
Tunica secūda cerebri. fo=		Venæ lienis quales.	80.E	Vrethra.	77.A
lio.	85.B	Venter. fol.76.H.79.D.		Vrina.	81.C
Tunica aranealis.	85.E	83.H		Vrinaculum.	81.F
Tunica candida.	85.C	Venter inferior.	79.E	Vrinarium iter.	77.A
Tunica cornicularis.	78.G	Ventriculus.	79.D.86.H	Vter.	76.G
Tunica oculi cornea.	85.C	Ventriculi forma.	86.H	Vterus.	80.B.C
Tunica vitrea.	85.E	Ventriculi natura.	87.A	Vteri figura.	87.H
Tunica reticularis.	85.E	Ventriculi situs.	86.H	Vteri situs.	87.H
Tunica oculi prima.	85.C	Ventriculi os.	76.G	Vterales nerui.	80.A
Tunica oculi secūda.	85.D	Ventriculi cerebri.	78.F	Vua.	75.H.83.C.85.G
Tunica oculi tertia.	85.E	Ventriculi cordis.	79.B	Vualis tunica.	85.D
Tunica oculi quarta.	85.E	Vertex.	74.F.82.E	Vuifer processus.	75.H
Tunica oculi perforata.		Vertebra.	77.D.84.B	Vulpes.	80.A
85.D		Vertebrarum structura et		Vulua.	80.B.C
		forma.	89.D		
V		Vertebra omnes quatuor		Y	
V Aricosa pars cere		& uiginti.	89.D	Y Psiloides oficu=	
bri. folio.78.F		Vertebra colli.	88.H	lum. folio.79.A	
Varicosa seminis uasa. fo=		Vertices.	76.E	Z	
lio.	79.H.87.F	Vesica.	79.H	Z Enonis opinio de	
Vasa seminis.	79.H	Vestigium.	84.D	Calore & Spiritu.	
Vasa seminis uaricosa. fo=		Vetula.	76.H.83.H	folio.81.E	

FINIS TABVLAE.



Errores sic corrigito.

Prior numerus significat folium . a priorem paginam . b  
posteriorem . posterior numerus lineam indicat .

2. a 10. effertu. lege effertur. b 1. etates. lege etates. 6. b 13.  
præcipua. lege præcipue. b 38. continue. lege continuo. 11. a 18. ægro=  
taut. lege ægotant. b 19. circa lege citra. 13. a 4. plegmone. lege phleg=  
mone a 11. continentur. lege continenter. a 34. legendum. Sed mors  
ab ulceribus sanè quàm celerrima inuadit. 16. a 20. melancholica. lege  
melancholie. 26. a 22. staturata. lege saturata. 29. a 17. euidenter.  
lege euidentes. 38. b 27. medicabilis. lege immedicabilis. 40. a 12.  
fastidio. lege fastigio. 44. a 38. nico. lege cnico. 45. a 6. rype. lege  
ryte. 48. b 19. totibus. lege fotibus. 52. a 36. Picarium. lege Pi=  
cerium. 55. b 9. electro. lege Electro. 58. a 9. lege plane concocta  
erunt. 62. a 1. Rheas. lege Rhœas. 63. b Cap. xiiij. & xv. lege  
xiiij. & xiiij. 64. b 37. malefactum. lege madesfactum. 67. a 7. flari=  
bus. lege flatibus. 6. b 28. reperia. lege cum interrogatione. 71. b 22.  
maiore. lege maiora. 74. b 36. lege. De oculi. 75. a 19. Coryxam.  
lege coryzam. 78. a 40. uocant. lege uacant. 79. a 11. Osophagus.  
lege Oesophagus. 80. a 14. neruus. lege nervos. a 16. loci. lege lock.  
b 16. Efflorescentiam. lege Eflorescentiam. 82. b 38. ueràm. lege ue=  
rùm. 89. b 26. Epigomatida. lege Eptigonatida.

Reliquos tum ad orthographiam, tum ad alia, si qui sint, spectantes, facile sibi  
unusquisque corrigit.



Registrum.

\* A B C D E F G H I K L M N O P

Q R S T V X Y.

\*, \*\*, \*\*\*, \*\*\*\*, Duerniones omnes preter

Y & \*\*\*\*, Terniones.



VENETIIS APVD IVENTAS.

M D L I I



*Index librorum Anneti Cappadocis librorum index*

De Causis et Signis acutorum morborum liber primus

De Pleuritide cap. 1.  
De Leptogastro cap. 2.  
De Tabo cap. 3.  
De Apoplexia cap. 4.

desunt quatuor  
Eae capita.

De Accessionibus epilepsiae cap. v. pagina

De Tetano seu rigore cap. 6. pag.

De Angina cap. 7. pag.

De Affectibus Glumellae pag.

De Coniunctis alienibus

De Pleuritide

Ex libro 2. de Causis et Signis acutorum.

De Pulmonum

De Sanguinis spatu

De Synocha

De Cautio seu febre ardente

De Cholera

De Neco seu Volvulo

De tuncis Ictericis affectibus

De vera causa acuto morbo

De Renis acutis affectibus

De Acutis in vesiculae agnitionibus

De Vulva strangulata

De Labrynti

De Acutis morborum Curatione liber primus.

Curatio Pleuriticoz pag.

Tetanicorum

Tabis

Apoplexia

Convulsivae accessionis

Tetani seu Rigoris

Angina

Glumella

Pestilentialis in faucibus morborum curatio

Pleuritidis

1.

2.

3.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

9.

10.

10.

11.

11.

12.

13.

13.

14.

41.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

49.

50.

50.



Ex libro de de Causis Auctor morboz

Causa Pulmonaria	pag. 53.
Sputi sanguinis	54
Syncope	56.
Colera	58.
Voluti	59.
Auctor. Iecoris vitioz	59.
Acuti morbi dorsalis vena, et Arteria curatio	60.
In Renibus acuti morbi curatio	61.
Vesica auctor affectus	67
Pulua suffocationis	62
Satyrasis	62

De Dinturnoz Morboz Causis et Signis  
Liber Primus.

De Cephalaa	pag. 15.
De Vertigine	16.
Comitiali morbo	16.
Melancholia	16.
Iurere	17.
Nervoz resolutione	19.
Phlegm	20.
Pumulentis	21.
Pulmonis abuectibus	22.
Acute	22.
Pulmonarij	23.
Iecore	23.
Liene	24.
Regio morbo	25.
Cachexia	26.

Ex 2<sup>do</sup> de Causis et Signis Dinturnoz.

De Aqua inter uterum	pag. 20.
Diabete	29.
Renis affectibus	30.
Vesica affectibus	31



De seminis profluvio	pag.	32
Stomachi affectibus		32.
Ventriculi affectu		33.
Cobitis		34.
Dysenteria		34.
Lenitate intestines		35.
Vteri morbis		36.
Arteritide et Ischiade		37.
Clephantiasi		38.


De Diuturnis morborum Curatione liber primus.

De Cephalae curatione	pag.	63.
Vertiginis		65.
Comitialis		67.
Melancholia		68.
Pneumonia		70.
Jecoris ulcus, et puris effusionis ab eo		70.
Lienis curatio		71.
Articulos, et Concrevis morborum curatio		71.
Clephantis curatio		71.
















005664807